



11-12-04

1652

PTO/SB/21 (04-04)

Approved for use through 07/31/2006. OMB 0651-0031

U.S. Patent and Trademark Office; U.S. DEPARTMENT OF COMMERCE

Under the Paperwork Reduction Act of 1995, no persons are required to respond to a collection of information unless it displays a valid OMB control number.

**TRANSMITTAL  
FORM**

(to be used for all correspondence after initial filing)

Total Number of Pages in This Submission

Application Number	09/604,231-Conf. #4162
Filing Date	June 27, 2000
First Named Inventor	Markus POMPEJUS
Art Unit	1652
Examiner Name	Maryam Monshipouri
Attorney Docket Number	BGI-122CPRCE

**ENCLOSURES (Check all that apply)**☐ Fee Transmittal Form☐ Fee Attached☐ Amendment/Reply☐ After Final☐ Affidavits/declaration(s)☐ Extension of Time Request☐ Express Abandonment Request☐ Information Disclosure Statement☐ Certified Copy of Priority Document(s)☐ Response to Missing Parts/  
Incomplete Application☐ Response to Missing Parts  
under 37 CFR 1.52 or 1.53☐ Drawing(s)☐ Licensing-related Papers☐ Petition☐ Petition to Convert to a  
Provisional Application☐ Power of Attorney, Revocation  
Change of Correspondence Address☐ Terminal Disclaimer☐ Request for Refund☐ CD, Number of CD(s) \_\_\_\_\_☐ After Allowance communication  
to Technology Center (TC)☐ Appeal Communication to Board of  
Appeals and Interferences☐ Appeal Communication to TC  
(Appeal Notice, Brief, Reply Brief)☐ Proprietary Information☐ Status Letter☒ Other Enclosure(s) (please  
Identify below):**Transmittal For Certified Copies  
Of Priority Documents Under 37  
CFR 1.55(a)(2); Certified Copies  
of Priority Documents (total 2);  
Return Receipt Postcard**

Remarks

**SIGNATURE OF APPLICANT, ATTORNEY, OR AGENT**Firm  
or  
Individual nameLAHIVE & COCKFIELD, LLP  
Elizabeth A. Hanley - 33,505

Signature

Date

November 9, 2004

I hereby certify that this correspondence is being deposited with the U.S. Postal Service as Express Mail, Airbill No. EL 982 739 594 US, in an envelope addressed to: Commissioner for Patents, P.O. Box 1450, Alexandria, VA 22313-1450, on the date shown below.

Dated: November 9, 2004

Signature: \_\_\_\_\_

(Elizabeth A. Hanley)

I hereby certify that this correspondence is being deposited with the U.S. Postal Service as Express Mail, Airbill No. EL 982 739 594 US, in an envelope addressed to: Commissioner for Patents, P.O. Box 1450, Alexandria, VA 22313-1450, on the date shown below.

Dated: November 9, 2004

Signature: \_\_\_\_\_

(Elizabeth A. Hanley)

Docket No.: BGI-122CPRCE  
(PATENT)

**IN THE UNITED STATES PATENT AND TRADEMARK OFFICE**

In re Patent Application of: Markus Pompejus *et al.*

Application No.: 09/604,231

Confirmation No.: 4162

Filed: June 27, 2000

Art Unit: 1652

For: CORYNEBACTERIUM GLUTAMICUM GENES  
ENCODING PHOSPHOENOLPYRUVATE:  
SUGAR PHOSPHOTRANSFERASE SYSTEM  
PROTEINS

Examiner: Maryam Monshipouri

Commissioner for Patents  
P.O. Box 1450  
Alexandria, VA 22313-1450

Dear Sir:

**TRANSMITTAL FOR CERTIFIED COPIES  
OF PRIORITY DOCUMENTS UNDER 37 CFR 1.55(a)(2)**

Dear Sir:

Pursuant to 37 CFR 1.55(a)(2), Applicants submit herewith certified copies of the following priority documents. These documents are submitted in support of Applicants' claim for the benefit of the filing dates of the following prior foreign applications under 35 USC §119(a):

Country	Application No.	Date
Germany	19942097.1	September 3, 1999
Germany	19942095.5	September 3, 1999

Accordingly, Applicants are entitled to the benefit of the filing dates of the above-identified foreign applications under 35 USC §119(a).

No costs are believed due in connection with the filing of these priority documents. However, if there are any associated costs, please charge them to our Deposit Order Account No. 12-0080. We enclose a duplicate of this letter for that purpose.

Dated: November 9, 2004

Respectfully submitted,

By \_\_\_\_\_

Elizabeth A. Hanley

Registration No.: 33,505

LAHIVE & COCKFIELD, LLP

28 State Street

Boston, Massachusetts 02109


(617) 227-7400

(617) 742-4214 (Fax)

Attorney/Agent For Applicants

I hereby certify that this correspondence is being deposited with the U.S. Postal Service as Express Mail, Airbill No. EL 982 739 594 US, in an envelope addressed to: Commissioner for Patents, P.O. Box 1450, Alexandria, VA 22313-1450, on the date shown below.

Dated: November 9, 2004

Signature:   
(Elizabeth A. Hanley)

Docket No.: BGI-122CPRCE  
(PATENT)

IN THE UNITED STATES PATENT AND TRADEMARK OFFICE

In re Patent Application of: Markus Pompejus *et al.*

Application No.: 09/604,231

Confirmation No.: 4162

Filed: June 27, 2000

Art Unit: 1652

For: CORYNEBACTERIUM GLUTAMICUM GENES  
ENCODING PHOSPHOENOLPYRUVATE:  
SUGAR PHOSPHOTRANSFERASE SYSTEM  
PROTEINS

Examiner: Maryam Monshipouri

Commissioner for Patents  
P.O. Box 1450  
Alexandria, VA 22313-1450

Dear Sir:

**TRANSMITTAL FOR CERTIFIED COPIES  
OF PRIORITY DOCUMENTS UNDER 37 CFR 1.55(a)(2)**

Dear Sir:

Pursuant to 37 CFR 1.55(a)(2), Applicants submit herewith certified copies of the following priority documents. These documents are submitted in support of Applicants' claim for the benefit of the filing dates of the following prior foreign applications under 35 USC §119(a):


Country	Application No.	Date
Germany	19942097.1	September 3, 1999
Germany	19942095.5	September 3, 1999

Accordingly, Applicants are entitled to the benefit of the filing dates of the above-identified foreign applications under 35 USC §119(a).

No costs are believed due in connection with the filing of these priority documents. However, if there are any associated costs, please charge them to our Deposit Order Account No. 12-0080. We enclose a duplicate of this letter for that purpose.

Dated: November 9, 2004

Respectfully submitted,

By   
Elizabeth A. Hanley  
Registration No.: 33,505  
LAHIVE & COCKFIELD, LLP  
28 State Street  
Boston, Massachusetts 02109  
(617) 227-7400  
(617) 742-4214 (Fax)  
Attorney/Agent For Applicants

**CERTIFIED COPY OF  
PRIORITY DOCUMENT**



**BEST AVAILABLE COPY**

**Prioritätsbescheinigung über die Einreichung  
einer Patentanmeldung**

**Aktenzeichen:** 199 42 095.5

**Anmeldetag:** 3. September 1999

**Anmelder/Inhaber:** BASF AG, Ludwigshafen/DE

**Bezeichnung:** Codierende Gene neuer Proteine von Corynebacterium glutamicum

**IPC:** C 07 K, C 12 P, C 12 N

Die angehefteten Stücke sind eine richtige und genaue Wiedergabe der ursprünglichen Unterlagen dieser Patentanmeldung.

München, den 17. Juli 2000  
Deutsches Patent- und Markenamt  
Der Präsident  
Im Auftrag

Faust



## Patentansprüche

1. Isoliertes Nukleinsäuremolekül aus *Corynebacterium glutami-*  
5 *cum*, das ein MCP-Protein oder einen Abschnitt davon codiert.
2. Isoliertes Nukleinsäuremolekül nach Anspruch 1, wobei das Nu-  
kleinsäuremolekül ein MCP-Protein codiert, das an der Produk-  
tion einer Feinchemikalie beteiligt ist.
- 10 3. Isoliertes Nukleinsäuremolekül aus *Corynebacterium glutami-*  
*cum*, ausgewählt aus der Gruppe, bestehend aus den in Anhang A  
aufgeführten Sequenzen, oder einem Abschnitt davon.
- 15 4. Isoliertes Nukleinsäuremolekül, das eine Polypeptidsequenz  
codiert, ausgewählt aus der Gruppe, bestehend aus den in An-  
hang B angegebenen Sequenzen.
- 20 5. Isoliertes Nukleinsäuremolekül, das eine natürlich vorkom-  
mende allelische Variante eines Polypeptides codiert, ausge-  
wählt aus der Gruppe von Aminosäuresequenzen, bestehend aus  
den in Anhang B aufgeführten Sequenzen.
- 25 6. Isoliertes Nukleinsäuremolekül, umfassend eine Nukleotidse-  
quenz, die zu mindestens 50% zu einer Nukleotidsequenz, aus-  
gewählt aus der Gruppe, bestehend aus den in Anhang A angege-  
benen Sequenzen, oder einem Abschnitt davon homolog ist.
- 30 7. Isoliertes Nukleinsäuremolekül, umfassend ein Fragment mit  
mindestens 15 Nukleotiden einer Nukleinsäure, umfassend eine  
Nukleotidsequenz, ausgewählt aus der Gruppe, bestehend aus  
den in Anhang A angegebenen Sequenzen.
- 35 8. Isoliertes Nukleinsäuremolekül, das unter stringenten Bedin-  
gungen an ein Nukleinsäuremolekül nach einem der Ansprüche  
1-7 hybridisiert.
- 40 9. Isoliertes Nukleinsäuremolekül, umfassend das Nukleinsäuremo-  
lekül nach einem der Ansprüche 1-8 oder einen Abschnitt davon  
und eine Nukleotidsequenz, die ein heterologes Polypeptid co-  
diert.

## 2

10. Vektor, umfassend das Nukleinsäuremolekül nach einem der Ansprüche 1-9.
11. Vektor nach Anspruch 10, welcher ein Expressionsvektor ist.
- 5 12. Wirtszelle, die mit dem Expressionsvektor nach Anspruch 11 transfiziert ist.
- 10 13. Wirtszelle nach Anspruch 12, wobei die Zelle ein Mikroorganismus ist.
14. Wirtszelle nach Anspruch 13, wobei die Zelle zur Gattung *Corynebacterium* oder *Brevibacterium* gehört.
- 15 15. Wirtszelle nach Anspruch 12, wobei die Expression des Nukleinsäuremoleküls eine Modulation der Produktion einer Feinchemikalie von der Zelle bewirkt.
- 20 16. Wirtszelle nach Anspruch 15, wobei die Feinchemikalie ausgewählt ist aus der Gruppe, bestehend aus organischen Säuren, proteinogenen und nichtproteinogenen Aminosäuren, Purin- und Pyrimidinbasen, Nukleosiden, Nukleotiden, Lipiden, gesättigten und ungesättigten Fettsäuren, Diolen, Kohlehydraten, aromatischen Verbindungen, Vitaminen, Cofaktoren und Enzymen.
- 25 17. Verfahren zur Herstellung eines Polypeptides, umfassend das Züchten der Wirtszelle nach Anspruch 12 in einem geeigneten Kulturmedium, um so das Polypeptid zu produzieren.
- 30 18. Isoliertes MCP-Polypeptid aus *Corynebacterium glutamicum* oder ein Abschnitt davon.
- 35 19. Polypeptid nach Anspruch 18, wobei das Polypeptid an der Produktion einer Feinchemikalie beteiligt ist.
20. Isoliertes Polypeptid, umfassend eine Aminosäuresequenz, ausgewählt aus der Gruppe, bestehend aus den in Anhang B angegebenen Sequenzen.
- 40 21. Isoliertes Polypeptid, umfassend eine natürlich vorkommende allelische Variante eines Polypeptides, umfassend eine Aminosäuresequenz, ausgewählt aus der Gruppe, bestehend aus den in Anhang B angegebenen Sequenzen, oder einen Abschnitt davon.
- 45 22. Isoliertes Polypeptid nach einem der Ansprüche 18-21, das zudem heterologe Aminosäuresequenzen umfaßt.

## 3

23. Isoliertes Polypeptid, das von einem Nukleinsäuremolekül codiert wird, umfassend eine Nukleotidsequenz, die mindestens zu 50% homolog zu einer Nukleinsäure ist, ausgewählt aus der Gruppe, bestehend aus den in Anhang A angegebenen Sequenzen.
- 5 24. Isoliertes Polypeptid, umfassend eine Aminosäuresequenz, die mindestens zu 50% homolog zu einer Aminosäuresequenz ist, ausgewählt aus der Gruppe, bestehend aus den in Anhang B angegebenen Sequenzen.
- 10 25. Verfahren zur Herstellung einer Feinchemikalie, umfassend das Züchten einer Zelle, die einen Vektor nach Anspruch 12 enthält, so daß die Feinchemikalie produziert wird.
- 15 26. Verfahren nach Anspruch 25, wobei das Verfahren zudem den Schritt Gewinnen der Feinchemikalie aus der Kultur umfaßt.
- 20 27. Verfahren nach Anspruch 25, wobei das Verfahren zudem den Schritt Transfizieren der Zelle mit dem Vektor nach Anspruch 11 umfaßt, so daß eine Zelle erhalten wird, die den Vektor enthält.
- 25 28. Verfahren nach Anspruch 25, wobei die Zelle zur Gattung *Corynebacterium* oder *Brevibacterium* gehört.
- 30 29. Verfahren nach Anspruch 25, wobei die Zelle ausgewählt ist aus der Gruppe, bestehend aus: *Corynebacterium glutamicum*, *Corynebacterium herculis*, *Corynebacterium lilium*, *Corynebacterium acetoacidophilum*, *Corynebacterium acetoglutamicum*, *Corynebacterium acetophilum*, *Corynebacterium ammoniagenes*, *Corynebacterium fujiokense*, *Corynebacterium nitrilophilus*, *Brevibacterium ammoniagenes*, *Brevibacterium butanicum*, *Brevibacterium divaricatum*, *Brevibacterium flavum*, *Brevibacterium healii*, *Brevibacterium ketoglutamicum*, *Brevibacterium ketosoreductum*, *Brevibacterium lactofermentum*, *Brevibacterium linens*, *Brevibacterium paraffinolyticum* und den in Tabelle 3 angegebenen Stämmen.
- 35 30. Verfahren nach Anspruch 25, wobei die Expression des Nukleinsäuremoleküls von dem Vektor die Modulation der Produktion der Feinchemikalie bewirkt.
- 40 31. Verfahren nach Anspruch 25, wobei die Feinchemikalie ausgewählt ist aus der Gruppe, bestehend aus: organischen Säuren, proteinogenen und nichtproteinogenen Aminosäuren, Purin- und Pyrimidinbasen, Nukleosiden, Nukleotiden, Lipiden, gesättig-
- 45

## 4

ten und ungesättigten Fettsäuren, Diolen, Kohlehydraten, aromatischen Verbindungen, Vitaminen, Cofaktoren und Enzymen.

32. Verfahren nach Anspruch 25, wobei die Feinchemikalie eine  
5 Aminosäure ist.
33. Verfahren nach Anspruch 32, wobei die Aminosäure aus der  
Gruppe stammt, bestehend aus: Lysin, Glutamat, Glutamin, Ala-  
nin, Aspartat, Glycin, Serin, Threonin, Methionin, Cystein,  
10 Valin, Leucin, Isoleucin, Arginin, Prolin, Histidin, Tyrosin;  
Phenylalanin und Tryptophan.
34. Verfahren zur Herstellung einer Feinchemikalie, umfassend das  
Züchten einer Zelle, deren genomische DNA durch Einschluß ei-  
15 nes Nukleinsäuremoleküls nach einem der Ansprüche 1-9 verän-  
dert worden ist.
- 20
- 25
- 30
- 35
- 40
- 45

CODIERENDE GENE NEUER PROTEINE VON *CORYNEBACTERIUM GLUTAMICUM*

## Hintergrund der Erfindung

5

Bestimmte Produkte und Nebenprodukte von natürlich vorkommenden Stoffwechselprozessen in Zellen werden in vielen Industriezweigen verwendet, einschließlich der Nahrungsmittel-, Futtermittel-, Kosmetik- und pharmazeutischen Industrie. Diese Moleküle, die ge-

10 meinsam als "Feinchemikalien" bezeichnet werden, umfassen organische Säuren, sowohl proteinogene als auch nicht-proteinogene Aminosäuren, Nukleotide und Nukleoside, Lipide und Fettsäuren, Diole, Kohlehydrate, aromatische Verbindungen, Vitamine und Co-faktoren sowie Enzyme. Ihre Produktion erfolgt am besten mittels

15 Anzucht von Bakterien im Großmaßstab, die entwickelt wurden, um große Mengen des jeweils gewünschten Moleküls zu produzieren und sezernieren. Ein für diesen Zweck besonders geeigneter Organismus ist *Corynebacterium glutamicum*, ein gram-positives, nicht-pathogenes Bakterium. Über Stammselektion ist eine Reihe von Mutanten-

20 stämmen entwickelt worden, die ein Sortiment wünschenswerter Verbindungen produzieren. Die Auswahl von Stämmen, die hinsichtlich der Produktion eines bestimmten Moleküls verbessert sind, ist jedoch ein zeitaufwendiges und schwieriges Verfahren.

## 25 Zusammenfassung der Erfindung

Diese Erfindung stellt neuartige Nukleinsäuremoleküle bereit, die sich zur Identifizierung oder Klassifizierung von *Corynebacterium glutamicum* oder verwandten Bakterienarten verwenden lassen. C.

30 *glutamicum* ist ein gram-positives, aerobes Bakterium, das in der Industrie für die Produktion im Großmaßstab einer Reihe von Feinchemikalien und auch zum Abbau von Kohlenwasserstoffen (bspw. beim Überlaufen von Rohöl) und zur Oxidation von Terpenoiden gemeinhin verwendet wird. Die Nukleinsäuremoleküle können daher zum

35 Identifizieren von Mikroorganismen eingesetzt werden, die sich zur Produktion von Feinchemikalien, bspw. durch Fermentationsverfahren, verwenden lassen. *C. glutamicum* selbst ist zwar nicht-pathogen, jedoch ist es mit anderen *Corynebacterium*-Arten, wie *Corynebacterium diphtheriae* (dem Erreger der Diphtherie) verwandt,

40 die bedeutende Pathogene beim Menschen sind. Die Fähigkeit, das Vorhandensein von *Corynebacterium*-Arten zu identifizieren, kann daher auch eine signifikante klinische Bedeutung haben, z.B. bei diagnostischen Anwendungen. Diese Nukleinsäuremoleküle können zudem als Bezugspunkte zur Kartierung des *C. glutamicum*-Genoms oder

45 von Genomen verwandter Organismen dienen.

## 2

Diese neuen Nukleinsäuremoleküle codieren Proteine, die hier als Marker- und Feinchemikalienproduktions- (MCP-) Proteine bezeichnet werden. Diese MCP-Proteine können bspw. direkt oder indirekt an der Produktion einer oder mehrerer Feinchemikalien in *C. glutamicum* beteiligt sein. Die erfindungsgemäßen MCP-Proteine können auch am Abbau von Kohlenwasserstoffen oder an der Oxidation von Terpenoiden beteiligt sein. Diese Proteine lassen sich zur Identifikation von *Corynebacterium glutamicum* oder von zu *C. glutamicum* verwandten Organismen verwenden; das Vorliegen eines für *C. glutamicum* und verwandte Arten spezifischen MCP-Proteins in einem Proteingemisch kann auf das Vorliegen eines dieser Bakterien in der Probe hindeuten. Ferner können diese MCP-Protein Homologa in Pflanzen oder Tieren aufweisen, die an einem Erkrankungszustand oder einem Leiden beteiligt sind; so können diese Proteine als nützliche pharmazeutische Ziele für das Arzneimittel-Screening und die Entwicklung therapeutischer Verbindungen dienen.

Aufgrund der Verfügbarkeit von in *Corynebacterium glutamicum* verwendbaren Klonierungsvektoren, wie bspw. offenbart in Sinskey et al., US-Patent Nr. 4 649 119, und von Techniken zur genetischen Manipulation von *C. glutamicum* und den verwandten *Brevibacterium*-Arten (z.B. *lactofermentum*) (Yoshihama et al., J. Bacteriol. 162:591-597 (1985); Katsumata et al., J. Bacteriol. 159:306-311 (1984); und Santamaria et al. J. Gen. Microbiol. 130:2237-2246 (1984)), lassen sich die erfindungsgemäßen Nukleinsäuremoleküle zur genetischen Manipulation dieses Organismus verwenden, um die Produktion einer oder mehrerer Feinchemikalien zu modulieren. Diese Modulation kann aufgrund einer direkten Auswirkung der Manipulation eines erfindungsgemäßen Gens oder aufgrund einer indirekten Auswirkung einer solchen Manipulation erfolgen. Bspw. kann man durch Modifikation der Aktivität eines Proteins, das an der Biosynthese oder am Abbau einer Feinchemikalie beteiligt ist, (d.h. durch Mutagenese des entsprechenden Gens) die Fähigkeit der Zelle zur Synthese oder zum Abbau dieser Verbindung direkt modulieren, wodurch die Ausbeute und/oder Effizienz der Produktion der Feinchemikalie moduliert wird. Ebenso kann man durch Modulation der Aktivität eines Proteins, das einen Feinchemikalien-Stoffwechselweg reguliert, direkt beeinflussen, ob die Produktion der gewünschten Verbindung hoch- oder herunterreguliert wird, was beides die Ausbeute oder Effizienz der Produktion der Feinchemikalie von der Zelle moduliert.

Die indirekte Modulation der Feinchemikalienproduktion kann auch durch Modifikation der Aktivität eines erfindungsgemäßen Proteins (d.h. durch Mutagenese des entsprechenden Gens) erfolgen, so daß die Fähigkeit der Zelle, zu wachsen und sich zu teilen oder lebensfähig und produktiv zu bleiben, insgesamt erhöht ist. Die

## 3

Produktion von Feinchemikalien aus *C. glutamicum* wird gewöhnlich durch Fermentationskultur im Großmaßstab dieser Mikroorganismen erzielt, Bedingungen, die für das Wachstum und die Zellteilung häufig suboptimal sind. Durch Verändern eines erfindungsgemäßen Proteins (z.B. eines Streßreaktionsproteins, eines Zellwandproteins oder eines Proteins, das am Stoffwechsel von Verbindungen beteiligt ist, die für das Auftreten von Zellteilung und -Wachstum nötig sind, wie Nukleotide und Aminosäuren), so daß ein besseres Überleben, Wachsen und Vermehren in diesen Bedingungen möglich ist, kann es möglich sein, die Anzahl und die Produktivität dieser veränderten *C. glutamicum*-Zellen in Kulturen im Großmaßstab zu steigern, was wiederum zu gesteigerten Ausbeuten und/oder zu gesteigerter Effizienz der Produktion einer oder mehrerer gewünschter Feinchemikalien führen sollte. Ferner sind die Stoffwechselwege einer Zelle notwendigerweise voneinander abhängig und co-reguliert. Durch Ändern der Aktivität irgendeines Stoffwechselwegs in *C. glutamicum* (d.h. durch Ändern der Aktivität eines der erfindungsgemäßen Proteine, das an einem solchen Weg beteiligt ist) ist es möglich, gleichzeitig die Aktivität oder Regulation eines anderen Stoffwechselwegs in diesem Mikroorganismus zu ändern, der direkt an der Synthese oder am Abbau einer Feinchemikalie beteiligt sein kann.

Diese Erfindung stellt neue Nukleinsäuremoleküle bereit, die Proteine codieren, die hier als MCP-Proteine bezeichnet werden und bspw die Produktion oder Effizienz der Produktion einer oder mehrerer Feinchemikalien in *C. glutamicum* modulieren oder als Identifikationsmarker für *C. glutamicum* oder verwandte Organismen dienen können. Nukleinsäuremoleküle, die ein MCP-Protein codieren, werden hier als MCP-Nukleinsäuremoleküle bezeichnet. Bei einer bevorzugten Ausführungsform kann das MCP-Protein die Produktion oder Effizienz der Produktion einer oder mehrerer Feinchemikalien in *C. glutamicum* modulieren oder als Identifikationsmarker für *C. glutamicum* oder verwandte Organismen dienen. Beispiele für solche Proteine sind diejenigen, die von den in Tabelle 1 angegebenen Genen codiert werden.

Ein Aspekt der Erfindung betrifft folglich isolierte Nukleinsäuremoleküle (bspw. cDNAs), umfassend eine Nukleotidsequenz, die ein MCP-Protein oder biologisch aktive Abschnitte davon codiert, sowie Nukleinsäurefragmente, die sich als Primer oder Hybridisierungssonden zum Nachweis oder zur Amplifikation von MCP-codierenden Nukleinsäure (bspw. DNA oder mRNA) eignen. Bei besonders bevorzugten Ausführungsformen umfaßt das isolierte Nukleinsäuremolekül eine der in Anhang A aufgeführten Nukleotidsequenzen oder den codierenden Bereich einer dieser Nukleotidsequenzen oder ein Komplement davon. In anderen besonders bevorzugten Ausführungs-

## 4

formen umfaßt das erfindungsgemäße isolierte Nukleinsäuremolekül eine Nukleotidsequenz, die an eine in Anhang A angegebene Nukleotidsequenz hybridisiert oder mindestens zu etwa 50%, vorzugsweise mindestens zu etwa 60%, stärker bevorzugt mindestens etwa 70%, 80% oder 90% und noch stärker bevorzugt mindestens etwa 95%, 96%, 97%, 98%, 99% oder noch homologer dazu ist, oder einen Abschnitt davon. In anderen bevorzugten Ausführungsformen codiert das isolierte Nukleinsäuremolekül eine der in Anhang B aufgeführten Aminosäuresequenzen. Die bevorzugten erfindungsgemäßen MCP-Proteine besitzen ebenfalls vorzugsweise mindestens eine der hier beschriebenen MCP-Aktivitäten.

Bei einer weiteren Ausführungsform codiert das isolierte Nukleinsäuremoleküle ein Protein oder einen Abschnitt davon, wobei das Protein oder sein Abschnitt eine Aminosäuresequenz enthält, die zu einer Aminosäuresequenz in Anhang B hinreichend homolog ist, bspw. zu einer Aminosäuresequenz in Anhang B derart hinreichend homolog ist, daß das Protein oder sein Abschnitt eine MCP-Aktivität behält. Vorzugsweise behält das von dem Nukleinsäuremolekül codierte Protein oder der Abschnitt davon die Fähigkeit, die Produktion oder Effizienz der Produktion einer oder mehrerer Feinchemikalien in *C. glutamicum* zu modulieren oder als Identifikationsmarker für *C. glutamicum* oder verwandte Organismen zu dienen. Bei einer Ausführungsform ist das von dem Nukleinsäuremolekül codierte Protein mindestens etwa 50%, vorzugsweise mindestens etwa 60% und stärker bevorzugt mindestens etwa 70%, 80% oder 90% und am stärksten bevorzugt mindestens etwa 95%, 96%, 97%, 98% oder 99% oder noch homologer zu einer Aminosäuresequenz in Anhang B (bspw. einer vollständigen Aminosäuresequenz, ausgewählt aus den in Anhang B genannten Sequenzen). Bei einer weiteren bevorzugten Ausführungsform ist das Protein ein *C. glutamicum*-Vollängenprotein, das zu einer vollständigen Aminosäuresequenz in Anhang B (die von einem in Anhang A gezeigten offenen Leseraster codiert wird) im wesentlichen homolog ist.

Bei einer weiteren bevorzugten Ausführungsform stammt das isolierte Nukleinsäuremolekül aus *C. glutamicum* und codiert ein Protein (z.B. ein MCP-Fusionsprotein), das eine biologisch aktive Domäne umfaßt, die zu einer der Aminosäuresequenzen in Anhang B zumindest zu etwa 50% oder stärker homolog ist und die Ausbeute, Produktion und/oder Effizienz der Produktion einer oder mehrerer Feinchemikalien in *C. glutamicum* modulieren, Kohlenwasserstoffe abbauen, Terpenoide oxidieren, als Ziel für Arzneimittelentwicklung dienen oder als Identifikationsmarker für *C. glutamicum* oder verwandte Organismen dienen kann und auch heterologe Nukleinsäu-



## 5

resequenzen enthält, die ein heterologes Polypeptid oder regulatorische Bereiche codieren.

Bei einer weiteren Ausführungsform ist das isolierte Nukleinsäuremolekül mindestens 15 Nukleotide lang und hybridisiert unter stringenten Bedingungen an ein Nukleinsäuremolekül, das eine Nukleotidsequenz aus Anhang A umfaßt. Das isolierte Nukleinsäuremolekül entspricht vorzugsweise einem natürlich vorkommenden Nukleinsäuremolekül. Die isolierte Nukleinsäure codiert stärker bevorzugt ein natürlich vorkommendes *C. glutamicum*-MCP-Protein oder einen biologisch aktiven Abschnitt davon.

Ein weiterer Aspekt der Erfindung betrifft Vektoren, bspw. rekombinante Expressionsvektoren, die die erfindungsgemäßen Nukleinsäuremoleküle enthalten, und Wirtszellen, in die diese Vektoren eingebracht worden sind. Bei einer Ausführungsform wird diese Wirtszelle zur Herstellung eines MCP-Proteins verwendet, indem die Wirtszelle in einem geeigneten Medium gezüchtet wird. Das MCP-Protein kann dann aus dem Medium oder der Wirtszelle isoliert werden.

Ein weiterer Aspekt der Erfindung betrifft einen genetisch veränderten Mikroorganismus, bei dem ein MCP-Gen eingebracht oder verändert worden ist. Das Genom des Mikroorganismus ist bei einer Ausführungsform durch Einbringen eines erfindungsgemäßen Nukleinsäuremoleküls verändert worden, das die MCP-Wildtyp- oder die mutierte MCP-Sequenz als Transgen codiert. Bei einer anderen Ausführungsform ist ein endogenes MCP-Gen im Genom des Mikroorganismus durch homologe Rekombination mit einem veränderten MCP-Gen verändert, z.B. funktionell disrupiert, worden. Der Mikroorganismus gehört bei einer bevorzugten Ausführungsform zur Gattung *Corynebacterium* oder *Brevibacterium*, wobei *Corynebacterium glutamicum* besonders bevorzugt ist. Der Mikroorganismus wird in einer bevorzugten Ausführungsform auch zur Herstellung einer gewünschten Verbindung, wie einer Aminosäure verwendet, wobei Lysin besonders bevorzugt ist.

Ein weiterer Aspekt der Erfindung betrifft ein isoliertes MCP-Protein oder einen Abschnitt, bspw. einen biologisch aktiven Abschnitt, davon. Das isolierte MCP-Protein oder sein Abschnitt kann in einer bevorzugten Ausführungsform die Produktion oder Effizienz der Produktion einer oder mehrerer Feinchemikalien in *C. glutamicum* modulieren oder als Identifikationsmarker für *C. glutamicum* oder verwandte Organismen dienen. Bei einer weiteren bevorzugten Ausführungsform ist das isolierte MCP-Protein oder ein Abschnitt davon hinreichend homolog zu einer Aminosäuresequenz von Anhang B, so daß das Protein oder sein Abschnitt die Fähig-

## 6

keit behält, bspw. die Produktion oder Effizienz der Produktion einer oder mehrerer Feinchemikalien in *C. glutamicum* zu modulieren oder als Identifikationsmarker für *C. glutamicum* oder verwandte Organismen zu dienen.

5

Die Erfindung betrifft zudem ein isoliertes MCP-Proteinpräparat. Das MCP-Protein umfaßt bei bevorzugten Ausführungsformen eine Aminosäuresequenz aus Anhang B. Bei einer weiteren bevorzugten Ausführungsform betrifft die Erfindung ein isoliertes Vollängenprotein, das zu einer vollständigen Aminosäuresequenz aus Anhang B (welche von einem offenen Leseraster in Anhang A codiert wird) im wesentlichen homolog ist. Bei einer weiteren Ausführungsform ist das Protein mindestens zu etwa 50%, vorzugsweise mindestens zu etwa 60%, stärker bevorzugt mindestens etwa 70%, 80% oder 90% und am stärksten bevorzugt mindestens etwa 95%, 96%, 97%, 98%, oder 99% oder noch homologer zu einer vollständigen Aminosäuresequenz aus Anhang B. Das isolierte MCP-Protein umfaßt bei anderen Ausführungsformen eine Aminosäuresequenz, die zu mindestens etwa 50% oder stärker zu einer der Aminosäuresequenzen aus Anhang B homolog ist und die Ausbeute, Produktion und/oder Effizienz der Produktion einer oder mehrerer Feinchemikalien in *C. glutamicum* modulieren, Kohlenwasserstoffe abbauen, Terpenoide oxidieren, als Ziel für Arzneimittelentwicklung dienen oder als Identifikationsmarker für *C. glutamicum* oder verwandte Organismen dienen kann.

25

Das isolierte MCP-Protein kann alternativ eine Aminosäuresequenz umfassen, die von einer Nukleotidsequenz codiert wird, welche mit einer Nukleotidsequenz aus Anhang B, bspw. unter stringenten Bedingungen, hybridisiert oder mindestens zu etwa 50%, vorzugsweise mindestens zu etwa 60%, stärker bevorzugt mindestens etwa 70%, 80% oder 90% und noch stärker bevorzugt mindestens etwa 95%, 96%, 97%, 98% oder 99% oder noch homologer dazu ist. Bevorzugte Formen der MCP-Proteine haben ebenfalls vorzugsweise eine oder mehrere der hier beschriebenen biologischen Aktivitäten von MCP.

35

Das MCP-Polypeptid oder ein biologisch aktiver Abschnitt davon kann mit einem Nicht-MCP-Polypeptid funktionsfähig verbunden werden, damit ein Fusionsprotein entsteht. Dieses Fusionsprotein hat bei bevorzugten Ausführungsformen eine andere Aktivität als das MCP-Protein allein. Bei anderen bevorzugten Ausführungsformen kann dieses Fusionsprotein die Ausbeute, Produktion und/oder Effizienz der Produktion einer oder mehrerer Feinchemikalien in *C. glutamicum* modulieren oder als Identifikationsmarker für *C. glutamicum* oder verwandte Organismen dienen. Die Integration dieses Fusionsproteins in eine Wirtszelle moduliert bei besonders bevor-

zugten Ausführungsformen die Produktion einer gewünschten Verbindung von der Zelle.

Ein weiterer Aspekt der Erfindung betrifft ein Verfahren zur Herstellung einer Feinchemikalie. Das Verfahren sieht die Anzucht einer Zelle vor, die einen Vektor enthält, der die Expression eines erfindungsgemäßen MCP-Nukleinsäuremoleküls bewirkt, so daß eine Feinchemikalie produziert wird. Dieses Verfahren umfaßt bei einer bevorzugten Ausführungsform zudem den Schritt der Gewinnung einer Zelle, die einen solchen Vektor enthält, wobei die Zelle mit einem Vektor transfiziert ist, der die Expression einer MCP-Nukleinsäure bewirkt. Dieses Verfahren umfaßt bei einer weiteren bevorzugten Ausführungsform zudem den Schritt, bei dem die Feinchemikalie aus der Kultur gewonnen wird. Die Zelle gehört bei einer besonders bevorzugten Ausführungsform zur Gattung *Corynebacterium* oder *Brevibacterium* oder ist aus den in Tabelle 3 angegebenen Stämmen ausgewählt.

Ein weiterer Aspekt der Erfindung betrifft Verfahren zur Modulation der Produktion eines Moleküls von einem Mikroorganismus. Diese Verfahren umfassen das Zusammenbringen der Zelle mit einer Substanz, die die MCP-Proteinaktivität oder die MCP-Nukleinsäure-Expression moduliert, so daß eine zellassoziierte Aktivität verglichen mit der gleichen Aktivität bei Fehlen der Substanz verändert wird. Die Zelle wird bei einer bevorzugten Ausführungsform hinsichtlich einer oder mehrerer *C. glutamicum*-MCP-Proteinaktivitäten moduliert, so daß die Ausbeute, Produktion und/oder Effizienz der Produktion einer gewünschten Feinchemikalie durch diesen Mikroorganismus verbessert wird. Die Substanz, die die MCP-Proteinaktivität moduliert, kann eine Substanz sein, die die MCP-Proteinaktivität oder die MCP-Nukleinsäure-Expression stimuliert. Beispiele für Substanzen, die die MCP-Proteinaktivität oder MCP-Nukleinsäureexpression stimulieren, umfassen kleine Moleküle, aktive MCP-Proteine und Nukleinsäuren, die MCP-Proteine codieren und in die Zelle eingebracht worden sind. Beispiele für Substanzen, die die MCP-Aktivität oder -Expression hemmen, umfassen kleine Moleküle und MCP-Antisense-Nukleinsäuremoleküle.

Ein weiterer Aspekt der Erfindung betrifft Verfahren zur Modulation der Ausbeuten, der Produktion und/oder der Effizienz der Produktion einer gewünschten Verbindung aus einer Zelle, umfassend das Einbringen eines MCP-Wildtyp- oder -Mutantengens in eine Zelle, das entweder auf einem gesonderten Plasmid bleibt oder in das Genom der Wirtszelle integriert wird. Die Integration in das Genom kann zufallsgemäß oder durch homologe Rekombination erfolgen, so daß das native Gen durch die integrierte Kopie ersetzt wird, was die Produktion der gewünschten Verbindung von der zu

modulierenden Zelle hervorruft. Diese Ausbeuten sind bei einer bevorzugten Ausführungsform erhöht. Bei einer weiteren bevorzugten Ausführungsform ist die Chemikalie eine Feinchemikalie, die in einer besonders bevorzugten Ausführungsform eine Aminosäure ist. Diese Aminosäure ist in einer besonders bevorzugten Ausführungsform L-Lysin.

#### Eingehende Beschreibung der Erfindung

- 10 Die vorliegende Erfindung stellt MCP-Nukleinsäure- und -Proteinmoleküle bereit, die zur Identifikation von *Corynebacterium glutamicum* oder verwandter Organismen, zur Kartierung des *C. glutamicum*-Genoms (oder des Genoms eines nah verwandten Organismus) oder zur Identifikation von Mikroorganismen verwendet werden können, die zur Produktion von Feinchemikalien, z.B. durch Fermentationsverfahren, verwendet werden können. Die von diesen Nukleinsäuren codierten Proteine können zur direkten oder indirekten Modulation der Produktion oder Effizienz der Produktion einer oder mehrerer Feinchemikalien in *C. glutamicum*, als Identifikationsmarker für *C. glutamicum* oder verwandte Organismen, zur Oxidation von Terpenoiden oder zum Abbau von Kohlenwasserstoffen oder als Ziele zur Entwicklung therapeutischer pharmazeutischer Verbindungen verwendet werden. Die erfindungsgemäßen Aspekte sind nachstehend weiter erläutert.

25

#### I. Feinchemikalien

- Der Begriff "Feinchemikalie" ist im Fachgebiet bekannt und beinhaltet Moleküle, die von einem Organismus produziert werden und in verschiedenen Industriezweigen Anwendungen finden, wie bspw., jedoch nicht beschränkt auf die pharmazeutische Industrie, die Landwirtschafts- und Kosmetikindustrie. Diese Verbindungen umfassen organische Säuren, wie Weinsäure, Itaconsäure und Diaminopimelinsäure, sowohl proteinogene als auch nicht-proteinogene Aminosäuren, Purin- und Pyrimidinbasen, Nukleoside und Nukleotide (wie bspw. beschrieben in Kuninaka, A. (1996) Nucleotides and related compounds, S. 561-612, in Biotechnology Bd. 6, Rehm et al., Hrsg. VCH: Weinheim und den darin enthaltenen Zitaten), Lipide, gesättigte und ungesättigte Fettsäuren (bspw. Arachidonsäure), Dirole (bspw. Propandiol und Butandiol), Kohlehydrate (bspw. Hyaluronsäure und Trehalose), aromatische Verbindungen (bspw. aromatische Amine, Vanillin und Indigo), Vitamine und Cofaktoren (wie beschrieben in Ullmann's Encyclopedia of Industrial Chemistry, Bd. A27, "Vitamins", S. 443-613 (1996) VCH: Weinheim und den darin enthaltenen Zitaten; und Ong, A.S., Niki, E. und Packer, L. (1995) "Nutrition, Lipids, Health and Disease" Proceedings of the UNESCO/Confederation of Scientific and Technological Associations

- in Malaysia and the Society for Free Radical Research - Asien, abgehalten am 1.-3. Sept. 1994 in Penang, Malaysia, AOCs Press (1995)), Enzyme und sämtliche anderen von Gutcho (1983) in *Chemicals by Fermentation*, Noyes Data Corporation, ISBN: 0818805086
- 5 und den darin angegebenen Literaturstellen beschriebenen Chemikalien. Der Metabolismus und die Verwendungen bestimmter Feinchemikalien sind nachstehend weiter erläutert.

A. *Metabolismus und Verwendungen von Aminosäuren*

10

- Die Aminosäuren umfassen die grundlegenden Struktureinheiten sämtlicher Proteine und sind somit für die normalen Zellfunktionen in allen Organismen essentiell. Der Begriff "Aminosäure" ist im Fachgebiet bekannt. Die proteinogenen Aminosäuren, von denen
- 15 es 20 Arten gibt, dienen als Struktureinheiten für Proteine, in denen sie über Peptidbindungen miteinander verknüpft sind, wohingegen die nicht-proteinogenen Aminosäuren (von denen Hunderte bekannt sind) gewöhnlich nicht in Proteinen vorkommen (siehe Ullmann's Encyclopedia of Industrial Chemistry, Bd. A2, S. 57-97
- 20 VCH: Weinheim (1985)). Die Aminosäuren können in der optischen D- oder L-Konfiguration vorliegen, obwohl L-Aminosäuren gewöhnlich der einzige Typ sind, den man in natürlich vorkommenden Proteinen vorfindet. Biosynthese- und Abbauwege von jeder der 20 proteinogenen Aminosäuren sind sowohl bei prokaryotischen als auch euka-
- 25 ryotischen Zellen gut charakterisiert (siehe bspw. Stryer, L., Biochemistry, 3. Auflage, S. 578-590 (1988)). Die "essentiellen" Aminosäuren (Histidin, Isoleucin, Leucin, Lysin, Methionin, Phenylalanin, Threonin, Tryptophan und Valin), so bezeichnet, weil sie aufgrund der Komplexität ihrer Biosynthesen gewöhnlich mit
- 30 der Ernährung aufgenommen werden müssen, werden durch einfache Biosynthesewege in die übrigen 11 "nichtessentiellen" Aminosäuren (Alanin, Arginin, Asparagin, Aspartat, Cystein, Glutamat, Glutamin, Glycin, Prolin, Serin und Tyrosin) umgewandelt. Höhere Tiere besitzen die Fähigkeit, einige dieser Aminosäuren zu syn-
- 35 thetisieren, jedoch müssen die essentiellen Aminosäuren mit der Nahrung aufgenommen werden, damit eine normale Proteinsynthese stattfindet.

- Abgesehen von ihrer Funktion bei der Proteinbiosynthese sind
- 40 diese Aminosäuren interessante Chemikalien an sich, und man hat entdeckt, daß viele bei verschiedenen Anwendungen in der Nahrungsmittel-, Futter-, Chemie-, Kosmetik-, Landwirtschafts- und pharmazeutischen Industrie zum Einsatz kommen. Lysin ist nicht nur für die Ernährung des Menschen eine wichtige Aminosäure, son-
- 45 dern auch für monogastrische Tiere, wie Geflügel und Schweine. Glutamat wird am häufigsten als Geschmacksadditiv (Mononatriumglutamat, MSG) sowie weithin in der Nahrungsmittelindustrie ver-

## 10

- wendet, wie auch Aspartat, Phenylalanin, Glycin und Cystein. Glycin, L-Methionin und Tryptophan werden sämtlich in der pharmazeutischen Industrie verwendet. Glutamin, Valin, Leucin, Isoleucin, Histidin, Arginin, Prolin, Serin und Alanin werden in der pharmazeutischen Industrie und der Kosmetikindustrie verwendet. Threonin, Tryptophan und D-/L-Methionin sind weitverbreitete Futtermittelzusätze (Leuchtenberger, W. (1996) Amino acids - technical production and use, S. 466-502 in Rehm et al., (Hrsg.) Biotechnology Bd. 6, Kapitel 14a, VCH: Weinheim). Man hat entdeckt, daß
- 10 sich diese Aminosäuren außerdem als Vorstufen für die Synthese von synthetischen Aminosäuren und Proteinen, wie N-Acetylcystein, S-Carboxymethyl-L-cystein, (S)-5-Hydroxytryptophan und anderen in Ulmann's Encyclopedia of Industrial Chemistry, Bd. A2, S. 57-97, VCH, Weinheim, 1985 beschriebenen Substanzen eignen.
- 15 Die Biosynthese dieser natürlichen Aminosäuren in Organismen, die sie produzieren können, bspw. Bakterien, ist gut charakterisiert worden (für einen Überblick der bakteriellen Aminosäure-Biosynthese und ihrer Regulation s. Umbarger, H.E. (1978) Ann. Rev. Biochem. 47:533-606). Glutamat wird durch reduktive Aminierung von
- 20  $\alpha$ -Ketoglutarat, einem Zwischenprodukt im Citronensäure-Zyklus, synthetisiert. Glutamin, Prolin und Arginin werden jeweils nacheinander aus Glutamat erzeugt. Die Biosynthese von Serin erfolgt in einem Dreischritt-Verfahren, beginnt mit 3-Phosphoglycerat
- 25 (einem Zwischenprodukt der Glykolyse) und ergibt nach Oxidations-, Transaminierungs- und Hydrolyseschritten diese Aminosäure. Cystein und Glycin werden jeweils aus Serin produziert, und zwar die erstere durch Kondensation von Homocystein mit Serin, und die letztere durch Übertragung des Seitenketten- $\beta$ -Kohlenstoffatoms auf Tetrahydrofolat in einer durch Serin-Transhydroxymethylase katalysierten Reaktion. Phenylalanin und Tyrosin werden
- 30 aus den Vorstufen des Glykolyse- und Pentosephosphatweges, Erythrose-4-phosphat und Phosphoenolpyruvat, in einem 9-Schritt-Biosyntheseweg synthetisiert, der sich nur in den letzten beiden
- 35 Schritten nach der Synthese von Präphenat unterscheidet. Tryptophan wird ebenfalls aus diesen beiden Ausgangsmolekülen produziert, jedoch erfolgt dessen Synthese in einem 11-Schritt-Weg. Tyrosin läßt sich in einer durch Phenylalaninhydroxylase katalysierten Reaktion auch aus Phenylalanin herstellen. Alanin, Valin
- 40 und Leucin sind jeweils Biosyntheseprodukte aus Pyruvat, dem Endprodukt der Glykolyse. Aspartat wird aus Oxalacetat, einem Zwischenprodukt des Citratzyklus, gebildet. Asparagin, Methionin, Threonin und Lysin werden jeweils durch Umwandlung von Aspartat produziert. Isoleucin wird aus Threonin gebildet. In einem komplexen 9-Schritt-Weg erfolgt die Bildung von Histidin aus
- 45 5-Phosphoribosyl-1-pyrophosphat, einem aktivierten Zucker.

## 11

Aminosäuren, deren Menge den Proteinbiosynthesebedarf übersteigt, können nicht gespeichert werden, und werden statt dessen abgebaut, so daß Zwischenprodukte für die Haupt-Stoffwechselwege der Zelle bereitgestellt werden (für einen Überblick siehe Stryer, 5 L., Biochemistry, 3. Aufl. Kap. 21 "Amino Acid Degradation and the Urea Cycle"; S 495-516 (1988)). Die Zelle ist zwar in der Lage, ungewünschte Aminosäuren in nützliche Stoffwechsel-Zwischenprodukte umzuwandeln, jedoch ist die Aminosäureproduktion hinsichtlich der Energie, der Vorstufenmoleküle und der für ihre 10 Synthese nötigen Enzyme aufwendig. Es überrascht daher nicht, daß die Aminosäure-Biosynthese durch Feedback-Hemmung reguliert wird, wobei das Vorliegen einer bestimmten Aminosäure ihre eigene Produktion verlangsamt oder ganz beendet (für einen Überblick über Rückkopplungs-Mechanismen bei Aminosäure-Biosynthesewegen, siehe 15 Stryer, L., Biochemistry, 3. Aufl., Kap. 24, "Biosynthesis of Amino Acids and Heme", S. 575-600 (1988)). Der Ausstoß einer bestimmten Aminosäure wird daher durch die Menge dieser Aminosäure in der Zelle eingeschränkt.

20 B. *Metabolismus und Verwendungen von Vitaminen, Cofaktoren und Nutrazeutika*

Vitamine, Cofaktoren und Nutrazeutika umfassen eine weitere Gruppe von Molekülen. Höhere Tiere haben die Fähigkeit verloren, 25 diese zu synthetisieren und müssen sie somit aufnehmen, obwohl sie leicht durch andere Organismen, wie Bakterien, synthetisiert werden. Diese Moleküle sind entweder biologisch aktive Moleküle an sich oder Vorstufen von biologisch aktiven Substanzen, die als Elektronenüberträger oder Zwischenprodukte bei einer Reihe von 30 Stoffwechselwegen dienen. Diese Verbindungen haben neben ihrem Nährwert auch einen signifikanten industriellen Wert als Farbstoffe, Antioxidantien und Katalysatoren oder andere Verarbeitung-Hilfsstoffe. (Für einen Überblick über die Struktur, Aktivität und die industriellen Anwendungen dieser Verbindungen siehe 35 bspw. Ullman's Encyclopedia of Industrial Chemistry, "Vitamins", Bd. A27, S. 443-613, VCH: Weinheim, 1996). Der Begriff "Vitamin" ist im Fachgebiet bekannt und umfaßt Nährstoffe, die von einem Organismus für eine normale Funktion benötigt werden, jedoch nicht von diesem Organismus selbst synthetisiert werden können. 40 Die Gruppe der Vitamine kann Cofaktoren und nutrazeutische Verbindungen umfassen. Der Begriff "Cofaktor" umfaßt nicht-proteinartige Verbindungen, die für das Auftreten einer normalen Enzymaktivität nötig sind. Diese Verbindungen können organisch oder anorganisch sein; die erfindungsgemäßen Cofaktor-Moleküle sind 45 vorzugsweise organisch. Der Begriff "Nutrazeutikum" umfaßt Nahrungsmittelzusätze, die bei Pflanzen und Tieren, insbesondere dem Menschen, gesundheitsfördernd sind. Beispiele solcher Moleküle

## 12

sind Vitamine, Antioxidantien und ebenfalls bestimmte Lipide (z.B. mehrfach ungesättigte Fettsäuren).

- Die Biosynthese dieser Moleküle in Organismen, die zu ihrer Produktion befähigt sind, wie Bakterien, ist umfassend charakterisiert worden (Ullman's Encyclopedia of Industrial Chemistry, "Vitamins", Bd. A27, S. 443-613, VCH: Weinheim, 1996, Michal, G. (1999) Biochemical Pathways: An Atlas of Biochemistry and Molecular Biology, John Wiley & Sons; Ong, A.S., Niki, E. und
- 10 Packer, L. (1995) "Nutrition, Lipids, Health and Disease" Proceedings of the UNESCO/Confederation of Scientific and Technological Associations in Malaysia and the Society for free Radical Research - Asien, abgehalten am 1.-3. Sept. 1994 in Penang, Malaysia, AOCs Press, Champaign, IL X, 374 S).
- 15 Thiamin (Vitamin B<sub>1</sub>) wird durch chemisches Kuppeln von Pyrimidin und Thiazol-Einheiten gebildet. Riboflavin (Vitamin B<sub>2</sub>) wird aus Guanosin-5'-triphosphat (GTP) und Ribose-5'-phosphat synthetisiert. Riboflavin wiederum wird zur Synthese von Flavinmononukleotid (FMN) und Flavinadenindinukleotid (FAD) eingesetzt. Die Familie von Verbindungen, die gemeinsam als "Vitamin B<sub>6</sub>" bezeichnet werden (bspw. Pyridoxin, Pyridoxamin, Pyridoxal-5'-phosphat und das kommerziell verwendete Pyridoxinhydrochlorid), sind alle
- 20 Derivate der gemeinsamen Struktureinheit 5-Hydroxy-6-methylpyridin. Panthothenat (Pantothenensäure, R-(+)-N-(2,4-Dihydroxy-3,3-dimethyl-1-oxobutyl)-β-alanin) kann entweder durch chemische Synthese oder durch Fermentation hergestellt werden. Die letzten Schritte bei der Panthothenat-Biosynthese bestehen aus der ATP-getriebenen Kondensation von β-Alanin und Pantoinsäure. Die für die
- 25 Biosyntheseschritte für die Umwandlung in Pantoinsäure, in β-Alanin und zur Kondensation in Pantothenensäure verantwortlichen Enzyme sind bekannt. Die metabolisch aktive Form von Panthothenat ist Coenzym A, dessen Biosynthese über 5 enzymatische Schritte verläuft. Panthothenat, Pyridoxal-5'-phosphat, Cystein und ATP
- 30 sind die Vorstufen von Coenzym A. Diese Enzyme katalysieren nicht nur die Bildung von Panthothenat, sondern auch die Produktion von (R)-Pantoinsäure, (R)-Pantolacton, (R)-Panthenol (Provitamin B<sub>5</sub>), Pantethein (und seinen Derivaten) und Coenzym A.
- 40 Die Biosynthese von Biotin aus dem Vorstufenmolekül Pimeloyl-CoA in Mikroorganismen ist ausführlich untersucht worden, und man hat mehrere der beteiligten Gene identifiziert. Es hat sich herausgestellt, daß viele der entsprechenden Proteine an der Fe-Cluster-Synthese beteiligt sind und zu der Klasse der nifs-Proteine gehören.
- 45 Die Liponsäure wird von der Octanonsäure abgeleitet und dient als Coenzym beim Energie-Metabolismus, wo sie Bestandteil des Pyruvatdehydrogenasekomplexes und des α-Ketoglutaratdehydro-



## 13

genasekomplexes wird. Die Folate sind eine Gruppe von Substanzen, die alle von der Folsäure abgeleitet werden, die wiederum von L-Glutaminsäure, p-Aminobenzoessäure und 6-Methylpterin hergeleitet ist. Die Biosynthese der Folsäure und ihrer Derivate, ausgehend  
5 von den Stoffwechselzwischenprodukten Guanosin-5'-triphosphat (GTP), L-Glutaminsäure und p-Aminobenzoessäure ist in bestimmten Mikroorganismen eingehend untersucht worden.

- Corrinoide (wie die Cobalamine und insbesondere Vitamin B<sub>12</sub>) und  
10 die Porphyrine gehören zu einer Gruppe von Chemikalien, die sich durch ein Tetrapyrrol-Ringsystem auszeichnen. Die Biosynthese von Vitamin B<sub>12</sub> ist hinreichend komplex, daß sie noch nicht vollständig charakterisiert worden ist, jedoch ist inzwischen ein Großteil der beteiligten Enzyme und Substrate bekannt. Nikotinsäure  
15 (Nikotinat) und Nikotinamid sind Pyridin-Derivate, die auch als "Niacin" bezeichnet werden. Niacin ist die Vorstufe der wichtigen Coenzyme NAD (Nikotinamidadenindinukleotid) und NADP (Nikotinamidadenindinukleotidphosphat) und ihrer reduzierten Formen.
- 20 Die Produktion dieser Verbindungen im Großmaßstab beruht größtenteils auf zellfreien chemischen Synthesen, obwohl einige dieser Chemikalien, wie Riboflavin, Vitamin B<sub>6</sub>, Pantothenat und Biotin, auch durch großangelegte Anzucht von Mikroorganismen produziert worden sind. Nur Vitamin B<sub>12</sub> wird aufgrund der Komplexität seiner  
25 Synthese lediglich durch Fermentation produziert. In-vitro-Verfahren erfordern einen erheblichen Aufwand an Materialien und Zeit und häufig an hohen Kosten.

C. *Purin-, Pyrimidin-, Nukleosid- und Nukleotid-Metabolismus und*  
30 *Verwendungen*

- Gene für den Purin- und Pyrimidin-Stoffwechsel und ihre entsprechenden Proteine sind wichtige Ziele für die Therapie von Tumorerkrankungen und Virusinfektionen. Der Begriff "Purin" oder "Pyrimidin" umfaßt stickstoffhaltige Basen, die Bestandteile der Nukleinsäuren, Coenzyme und Nukleotide sind. Der Begriff "Nukleotid" beinhaltet die grundlegenden Struktureinheiten der Nukleinsäuremoleküle, die eine stickstoffhaltige Base, einen Pentose-Zucker (bei RNA ist der Zucker Ribose, bei DNA ist der Zucker D-  
35 Desoxyribose) und Phosphorsäure umfassen. Der Begriff "Nukleosid" umfaßt Moleküle, die als Vorstufen von Nukleotiden dienen, die aber im Gegensatz zu den Nukleotiden keine Phosphorsäureeinheit aufweisen. Durch Hemmen der Biosynthese dieser Moleküle oder ihrer Mobilisierung zur Bildung von Nukleinsäuremolekülen ist es  
40 möglich, die RNA- und DNA-Synthese zu hemmen; wird diese Aktivität zielgerichtet bei Krebszellen gehemmt, läßt sich die Teilungs- und Replikationsfähigkeit von Tumorzellen hemmen. Es gibt

## 14

zudem Nukleotide, die keine Nukleinsäuremoleküle bilden, jedoch als Energiespeicher (d.h. AMP) oder als Coenzyme (d.h. FAD und NAD) dienen.

- 5 Mehrere Veröffentlichungen haben die Verwendung dieser Chemikalien für diese medizinischen Indikationen beschrieben, wobei der Purin- und/oder Pyrimidin-Metabolismus beeinflusst wird (bspw. Christopherson, R.I. und Lyons, S.D. (1990) "Potent inhibitors of de novo pyrimidine and purine biosynthesis as chemotherapeutic agents", Med. Res. Reviews 10:505-548). Untersuchungen an Enzymen, die am Purin- und Pyrimidin-Metabolismus beteiligt sind, haben sich auf die Entwicklung neuer Medikamente konzentriert, die bspw. als Immunsuppressiva oder Antiproliferantien verwendet werden können (Smith, J.L. (1995) "Enzymes in Nucleotide Synthesis" Curr. Opin. Struct. Biol. 5:752-757; (1995) Biochem. Soc. Transact. 23:877-902). Die Purin- und Pyrimidinbasen, Nukleoside und Nukleotide haben jedoch auch andere Einsatzmöglichkeiten: als Zwischenprodukte bei der Biosynthese verschiedener Feinchemikalien (z.B. Thiamin, S-Adenosyl-methionin, Folate oder Riboflavin), als Energieträger für die Zelle (bspw. ATP oder GTP) und für Chemikalien selbst, die gewöhnlich als Geschmacksverstärker (bspw. IMP oder GMP) oder für viele medizinische Anwendungen verwendet werden (siehe bspw. Kuninaka, A., (1996) "Nucleotides and Related Compounds in Biotechnology Bd. 6, Rehm et al., Hrsg. VCH: Weinheim, S. 561-612). Enzyme, die am Purin-, Pyrimidin-, Nukleosid- oder Nukleotid-Metabolismus beteiligt sind, dienen auch immer stärker als Ziele, gegen die Chemikalien für den Pflanzenschutz, einschließlich Fungiziden, Herbiziden und Insektiziden, entwickelt werden.
- 30 Der Metabolismus dieser Verbindungen in Bakterien ist charakterisiert worden (für Übersichten siehe bspw. Zalkin, H. und Dixon, J.E. (1992) "De novo purin nucleotide biosynthesis" in Progress in Nucleic Acids Research and Molecular Biology, Bd. 42, Academic Press, S. 259-287; und Michal, G. (1999) "Nucleotides and Nucleosides"; Kap. 8 in: Biochemical Pathways: An Atlas of Biochemistry and Molecular Biology, Wiley, New York). Der Purin-Metabolismus, das Objekt intensiver Forschung, ist für das normale Funktionieren der Zelle essentiell. Ein gestörter Purin-Metabolismus in höheren Tieren kann schwere Erkrankungen verursachen, bspw. Gicht. Die Purinnukleotide werden aus Ribose-5-phosphat über eine Reihe von Schritten über die Zwischenverbindung Inosin-5'-phosphat (IMP) synthetisiert, was zur Produktion von Guanosin-5'-monophosphat (GMP) oder Adenosin-5'-monophosphat (AMP) führt, aus denen sich die als Nukleotide verwendeten Triphosphatformen leicht herstellen lassen. Diese Verbindungen werden auch als Energiespeicher verwendet, so daß ihr Abbau Energie für viele verschie-
- 45

## 15

dene biochemische Prozesse in der Zelle liefert. Die Pyrimidinbiosynthese erfolgt über die Bildung von Uridin-5'-monophosphat (UMP) aus Ribose-5-phosphat. UMP wiederum wird in Cytidin-5'-triphosphat (CTP) umgewandelt. Die Desoxyformen sämtlicher Nukleotide werden in einer Einschnitt-Reduktionsreaktion aus der Diphosphat-Riboseform des Nukleotides zur Diphosphat-Desoxyriboseform des Nukleotides hergestellt. Nach der Phosphorylierung können diese Moleküle an der DNA-Synthese teilnehmen.

10 D. *Trehalose-Metabolismus und Verwendungen*

Trehalose besteht aus zwei Glucosemolekülen, die über eine  $\alpha, \alpha$ -1,1-Bindung miteinander verknüpft sind. Sie wird gewöhnlich in der Nahrungsmittelindustrie als Süßstoff, als Additiv für getrocknete oder gefrorene Nahrungsmittel sowie in Getränken verwendet. Sie wird jedoch auch in der pharmazeutischen Industrie, der Kosmetik- und Biotechnologie-Industrie angewendet (s. bspw. Nishimoto et al., (1998) US-Patent Nr. 5 759 610; Singer, M.A. und Lindquist, S. (1998) Trends Biotech. 16:460-467; Paiva, C.L.A. und Panek, A.D. (1996) Biotech Ann. Rev. 2:293-314; und Shiosaka, M. (1997) J. Japan 172:97-102). Trehalose wird durch Enzyme von vielen Mikroorganismen produziert und auf natürliche Weise in das umgebende Medium abgegeben, aus dem sie durch im Fachgebiet bekannte Verfahren gewonnen werden kann.

25

II. Elemente und Verfahren der Erfindung

Die vorliegende Erfindung beruht zumindest teilweise auf der Entdeckung von neuen Molekülen, die hier als MCP-Nukleinsäure-Moleküle bezeichnet werden. Diese MCP-Nukleinsäuremoleküle eignen sich nicht nur zur Identifikation von *C. glutamicum* oder verwandten Bakterienarten, sondern auch als Marker zur Kartierung des *C. glutamicum*-Genoms und zur Identifizierung von Bakterien, die sich zur Produktion von Feinchemikalien durch z.B. fermentative Verfahren eignen. Die vorliegende Erfindung beruht zumindest teilweise auch auf den MCP-Proteinmolekülen, die von diesen MCP-Nukleinsäuremolekülen codiert werden. Diese MCP-Moleküle können die Ausbeute, Produktion und/oder Effizienz der Produktion einer oder mehrerer Feinchemikalien in *C. glutamicum* modulieren, als Identifikationsmarker für *C. glutamicum* oder verwandte Organismen dienen, Kohlenwasserstoffe abbauen und als Ziele für die Entwicklung therapeutischer pharmazeutischer Verbindungen dienen. In einer Ausführungsform sind die erfindungsgemäßen MCP-Moleküle direkt oder indirekt am Stoffwechselweg einer oder mehrerer Feinchemikalien in *C. glutamicum* beteiligt. In einer bevorzugten Ausführungsform hat die Aktivität der erfindungsgemäßen MCP-Moleküle, an solchen Stoffwechselwegen indirekt oder direkt teilzunehmen,

## 16

- eine Auswirkung auf die Produktion einer gewünschten Feinchemikalie durch diesen Mikroorganismus. In einer besonders bevorzugten Ausführungsform ist die Aktivität der erfindungsgemäßen MCP-Moleküle moduliert, so daß die *C. glutamicum*-Stoffwechselwege, an denen die erfindungsgemäßen MCP-Proteine beteiligt sind, hinsichtlich der Effizienz oder des Ausstoßes moduliert werden, was direkt oder indirekt die Produktion oder Effizienz der Produktion einer gewünschten Feinchemikalie durch *C. glutamicum* moduliert.
- 10 Der Begriff "MCP-Protein" oder "MCP-Polypeptid" umfaßt Proteine, die die Ausbeute, Produktion und/oder Effizienz der Produktion einer oder mehrerer Feinchemikalien in *C. glutamicum* modulieren, Kohlenwasserstoffe abbauen, Terpenoide oxidieren, als Zielprotein für Arzneimittelscreening oder -design oder als Identifikations-
- 15 marker für *C. glutamicum* oder verwandte Organismen dienen können. Beispiele für MCP-Proteine umfassen solche, die von den in Tabelle 1 und Anhang A aufgeführten MCP-Genen codiert werden. Die Ausdrücke "MCP-Gen" oder "MCP-Nukleinsäuresequenz" umfassen Nukleinsäuresequenzen, die ein MCP-Protein codieren, das aus einem
- 20 codierenden Bereich und entsprechenden untranslatierten 5'- und 3'-Sequenzbereichen besteht. Beispiele für MCP-Gene sind die in Tabelle 1 aufgelisteten. Die Begriffe "Produktion" oder "Produktivität" sind im Fachgebiet bekannt und beinhalten die Konzentration des Fermentationsproduktes (bspw. der gewünschten Feinchemi-
- 25 kalie), das innerhalb einer festgelegten Zeitspanne und eines festgelegten Fermentationsvolumens gebildet wird (bspw. kg Produkt pro Std. pro l). Der Begriff "Effizienz der Produktion" umfaßt die Zeit, die zur Erzielung einer bestimmten Produktionsmenge nötig ist (bspw. wie lange die Zelle zur Aufrichtung einer
- 30 bestimmten Ausstoßrate einer Feinchemikalie benötigt). Der Begriff "Ausbeute" oder "Produkt/Kohlenstoff-Ausbeute" ist im Fachgebiet bekannt und umfaßt die Effizienz der Umwandlung der Kohlenstoffquelle in das Produkt (d.h. die Feinchemikalie). Dies wird bspw. gewöhnlich ausgedrückt als kg Produkt pro kg Kohlen-
- 35 stoffquelle. Durch Vergrößern der Ausbeute oder Produktion der Verbindung wird die Menge der gewonnenen Moleküle oder der geeigneten gewonnenen Moleküle dieser Verbindung in einer bestimmten Kulturmenge über einen festgelegten Zeitraum erhöht. Die Begriffe "Biosynthese" oder "Biosyntheseweg" sind im Fachgebiet bekannt
- 40 und umfassen die Synthese einer Verbindung, vorzugsweise einer organischen Verbindung, durch eine Zelle aus Zwischenverbindungen, bspw. in einem Mehrschritt- oder stark regulierten Prozeß. Die Begriffe "Abbau" oder "Abbauweg" sind im Fachgebiet bekannt und umfassen die Spaltung einer Verbindung, vorzugsweise einer
- 45 organischen Verbindung, durch eine Zelle in Abbauprodukte (allgemeiner gesagt, kleinere oder weniger komplexe Moleküle), bspw. in einem Mehrschritt- oder stark regulierten Prozeß. Der Begriff

## 17

"Metabolismus" ist im Fachgebiet bekannt und umfaßt die Gesamtheit der biochemischen Reaktionen, die in einem Organismus stattfinden. Der Metabolismus einer bestimmten Verbindung (z.B. der Metabolismus einer Aminosäure, wie Glycin) umfaßt dann sämtliche

5 Biosynthese-, Modifikations- und Abbauege in der Zelle, die diese Verbindung betreffen.

Die erfindungsgemäßen MCP-Moleküle sind in einer anderen Ausführungsform befähigt, die Produktion eines gewünschten Moleküls,

10 wie einer Feinchemikalie, in einem Mikroorganismus, wie *C. glutamicum*, direkt oder indirekt zu modulieren. Unter Verwendung von Gen-Rekombinationstechniken kann/können ein oder mehrere erfindungsgemäße MCP-Proteine so manipuliert werden, daß seine Funktion moduliert ist. Diese Modulation der Funktion kann zur Modu-

15 lation der Ausbeute, Produktion und/oder Effizienz der Produktion einer oder mehrerer Feinchemikalien von *C. glutamicum* führen.

Beispielsweise kann man durch Modifikation der Aktivität eines Proteins, das an der Biosynthese oder am Abbau einer Feinchemikalie

20 beteiligt ist, (d.h. durch Mutagenese des entsprechenden Gens) die Fähigkeit der Zelle, diese Verbindung zu synthetisieren oder abzubauen, direkt modulieren und dadurch die Ausbeute und/oder Effizienz der Produktion der Feinchemikalien modulieren. Ebenso kann man durch Modulation der Aktivität eines Proteins,

25 das einen Feinchemikalien-Stoffwechselweg reguliert, direkt beeinflussen, ob die Produktion der gewünschten Verbindung hoch- oder herunterreguliert wird, was beides die Ausbeute oder Effizienz der Produktion der Feinchemikalie von der Zelle moduliert.

30 Die indirekte Modulation der Feinchemikalienproduktion kann auch durch Modifikation der Aktivität eines erfindungsgemäßen Proteins (d.h. durch Mutagenese des entsprechenden Gens) erfolgen, so daß die Fähigkeit der Zelle, zu wachsen und sich zu teilen oder lebensfähig und produktiv zu bleiben, insgesamt erhöht ist. Die

35 Produktion von Feinchemikalien aus *C. glutamicum* wird gewöhnlich durch Fermentationskultur im Großmaßstab dieser Mikroorganismen erzielt, Bedingungen, die für das Wachstum und die Zellteilung häufig suboptimal sind. Durch Verändern eines erfindungsgemäßen Proteins (z.B. eines Streßreaktionsproteins, eines Zellwandpro-

40 teins oder von Proteinen, die am Stoffwechsel von Verbindungen beteiligt sind, die für das Auftreten von Zellwachstum und -teilung nötig sind, wie Nukleotide und Aminosäuren), so daß ein besseres Überleben, Wachsen und Vermehren in diesen Bedingungen möglich ist, kann es möglich sein, die Anzahl und die Produktivität

45 dieser veränderten *C. glutamicum*-Zellen in Kulturen im Großmaßstab zu steigern, was wiederum zu gesteigerten Ausbeuten und/oder zu gesteigerter Effizienz der Produktion einer oder mehrerer ge-

## 18

wünschter Feinchemikalien führen sollte. Ferner sind die Stoffwechselwege einer Zelle notwendigerweise voneinander abhängig und co-reguliert. Durch Ändern der Aktivität irgendeines Stoffwechselwegs in *C. glutamicum* (d.h. durch Ändern der Aktivität eines  
5 der erfindungsgemäßen Proteine, das an einem solchen Weg beteiligt ist) ist es möglich, gleichzeitig die Aktivität oder Regulation eines anderen Stoffwechselwegs in diesem Mikroorganismus zu ändern, der direkt an der Synthese oder am Abbau einer Feinchemikalie beteiligt sein kann.

10

Die isolierten erfindungsgemäßen Nukleinsäuresequenzen befinden sich im Genom eines *Corynebacterium glutamicum*-Stammes, der von der American Type Culture Collection unter der Bezeichnung ATCC 13032 erhältlich ist. Die Nukleotidsequenz der isolierten *C. glutamicum*-MCP-Nukleinsäuremoleküle und die vorhergesagten Aminosäuresequenzen der *C. glutamicum*-MCP-Proteine sind im Anhang A bzw.  
15 B gezeigt. Es wurden Computeranalysen durchgeführt, die viele dieser Nukleotidsequenzen als Sequenzen mit Homologie zu *E. coli*- oder *Bacillus subtilis*-Genen klassifizierten und/oder identifizierten.  
20

Die vorliegende Erfindung betrifft auch Proteine, deren Aminosäuresequenz zu einer Aminosäuresequenz in Anhang B im wesentlichen homolog ist. Wie hier verwendet, ist ein Protein, dessen Aminosäuresequenz im wesentlichen homolog zu einer ausgewählten Aminosäuresequenz ist, zumindest zu etwa 50% homolog zu der ausgewählten Aminosäuresequenz, bspw. zur gesamten ausgewählten Aminosäuresequenz. Ein Protein, dessen Aminosäuresequenz zu einer ausgewählten Aminosäuresequenz im wesentlichen homolog ist, kann auch  
25 mindestens zu etwa 50-60%, vorzugsweise mindestens zu etwa 60-70%, stärker bevorzugt mindestens zu etwa 70-80%, 80-90% oder 90-95% und am stärksten bevorzugt mindestens zu etwa 96%, 97%, 98%, 99% oder noch homologer zur ausgewählten Aminosäuresequenz sein.

35

Ein erfindungsgemäßes MCP-Protein oder ein biologisch aktiver Abschnitt oder Fragment davon kann die Ausbeute, Produktion und/oder Effizienz der Produktion einer oder mehrerer Feinchemikalien in *C. glutamicum* modulieren, Kohlenwasserstoffe abbauen, Terpene  
40 noide oxidieren, als Ziel für Arzneimittelentwicklung dienen oder als Identifikationsmarker für *C. glutamicum* oder verwandte Organismen dienen.

In den nachstehenden Unterabschnitten sind verschiedene Aspekte  
45 der Erfindung ausführlicher beschrieben:

## 19

## A. Isolierte Nukleinsäuremoleküle

- Ein Aspekt der Erfindung betrifft isolierte Nukleinsäuremoleküle, die MCP-Moleküle oder biologisch aktive Abschnitte davon codieren, sowie Nukleinsäurefragmente, die zur Verwendung als Hybridisierungssonden oder Primer zur Identifizierung oder Amplifizierung von MCP-codierenden Nukleinsäuren (z.B. MCP-DNA) hinreichen. Diese Nukleinsäuremoleküle können zur Identifikation von *C. glutamicum* oder verwandten Organismen, zur Kartierung des Genoms von *C. glutamicum* oder verwandten Organismen oder zur Identifikation von Mikroorganismen, die zur Produktion von Feinchemikalien, z.B. durch Fermentationsverfahren, geeignet sind, verwendet werden. Der Begriff "Nukleinsäuremolekül", wie hier verwendet, soll DNA-Moleküle (z.B. cDNA oder genomische DNA) und RNA-Moleküle (z.B. mRNA) sowie DNA- oder RNA-Analoga, die mittels Nukleotidanaloga erzeugt werden, umfassen. Dieser Begriff umfaßt zudem die am 3'- und am 5'-Ende des codierenden Genbereichs gelegene untranslatierte Sequenz: mindestens etwa 100 Nukleotide der Sequenz stromaufwärts des 5'-Endes des codierenden Bereichs und mindestens etwa 20 Nukleotide der Sequenz stromabwärts des 3'-Endes des codierenden Bereichs des Gens. Das Nukleinsäuremolekül kann einzelsträngig oder doppelsträngig sein, ist aber vorzugsweise doppelsträngige DNA. Ein "isoliertes" Nukleinsäuremolekül wird von anderen Nukleinsäuremolekülen abgetrennt, die in der natürlichen Quelle der Nukleinsäure zugegen sind. Eine "isolierte" Nukleinsäure hat vorzugsweise keine Sequenzen, die die Nukleinsäure in der genomischen DNA des Organismus, aus dem die Nukleinsäure stammt, natürlicherweise flankieren (bspw. Sequenzen, die sich am 5'- bzw. 3'-Ende der Nukleinsäure befinden). In verschiedenen Ausführungsformen kann bspw. das isolierte MCP-Nukleinsäuremolekül weniger als etwa 5 kb, 4 kb, 3 kb, 2 kb, 1 kb, 0,5 kb oder 0,1 kb der Nukleotidsequenzen, die natürlicherweise das Nukleinsäuremolekül in der genomischen DNA der Zelle, aus der die Nukleinsäure stammt (bspw. eine *C. glutamicum*-Zelle) flankieren. Ein "isoliertes" Nukleinsäuremolekül, wie ein cDNA-Molekül, kann überdies im wesentlichen frei von anderem zellulären Material oder Kulturmedium sein, wenn es durch rekombinante Techniken hergestellt wird, oder frei von chemischen Vorstufen oder anderen Chemikalien sein, wenn es chemisch synthetisiert wird.
- Ein erfindungsgemäßes Nukleinsäuremolekül, bspw. eine Nukleinsäuremolekül mit einer Nukleotidsequenz aus Anhang A oder ein Abschnitt davon, kann mittels molekularbiologischer Standard-Techniken und der hier bereitgestellten Sequenzinformation isoliert werden. Bspw. kann eine *C. glutamicum*-MCP-cDNA aus einer *C. glutamicum*-Bank isoliert werden, indem eine vollständige Sequenz aus Anhang A oder ein Abschnitt davon als Hybridisierungssonde und

## 20

Standard-Hybridisierungstechniken (wie bspw. beschrieben in Sambrook, J., Fritsch, E.F. und Maniatis, T. Molecular Cloning: A Laboratory Manual. 2. Aufl., Cold Spring Harbor Laboratory, Cold Spring Harbor Laboratory Press, Cold Spring Harbor, NY, 1989)

- 5 verwendet werden. Überdies läßt sich ein Nukleinsäuremolekül, umfassend eine vollständige Sequenz aus Anhang A oder einen Abschnitt davon, durch Polymerasekettenreaktion isolieren, wobei die Oligonukleotidprimer, die auf der Basis dieser Sequenz erstellt wurden, verwendet werden (z.B. kann ein Nukleinsäuremolekül, umfassend eine vollständige Sequenz aus Anhang A oder einen Abschnitt davon, durch Polymerasekettenreaktion isoliert werden, indem Oligonukleotidprimer verwendet werden, die auf der Basis dieser gleichen Sequenz aus Anhang A erstellt worden sind). Bspw. läßt sich mRNA aus normalen Endothelzellen isolieren (bspw. durch
- 10 das Guanidiniumthiocyanat-Extraktionsverfahren von Chirgwin et al. (1979) Biochemistry 18:5294-5299), und die cDNA kann mittels reverser Transkriptase (bspw. Moloney-MLV-Reverse-Transkriptase, erhältlich bei Gibco/BRL, Bethesda, MD, oder AMV-Reverse-Transkriptase, erhältlich von Seikagaku America, Inc., St. Petersburg,
- 20 FL) und mittels zufallsgemäßen Polynukleotidprimern oder Oligonukleotidprimern auf der Basis einer der im Anhang A gezeigten Nukleotidsequenzen hergestellt werden. Synthetische Oligonukleotidprimer für die Amplifizierung via Polymerasekettenreaktion lassen sich auf der Basis einer der in Anhang A gezeigten Nukleotidsequenzen erstellen. Eine erfindungsgemäße Nukleinsäure kann mittels cDNA oder alternativ genomischer DNA als Matrize und geeigneten Oligonukleotidprimern gemäß PCR-Standard-Amplifikations-techniken amplifiziert werden. Die so amplifizierte Nukleinsäure kann in einen geeigneten Vektor kloniert werden und durch DNA-Se-
- 25 quenzanalyse charakterisiert werden. Oligonukleotide, die einer MCP-Nukleotidsequenz entsprechen, können ferner durch Standard-Syntheseverfahren, bspw. mit einem automatischen DNA-Synthesegerät, hergestellt werden.

- 35 Bei einer bevorzugten Ausführungsform umfaßt ein erfindungsgemäßes isoliertes Nukleinsäuremolekül eine der in Anhang A aufgeführten Nukleotidsequenzen. Die Sequenzen von Anhang A entsprechen den erfindungsgemäßen MCP-cDNAs aus *Corynebacterium glutamicum*. Diese cDNAs umfassen Sequenzen, die MCP-Proteine (d.h. den
- 40 "codierenden Bereich", der in jeder Sequenz in Anhang A angegeben ist), sowie die 5'- und 3'-untranslatierten Sequenzen, die ebenfalls in Anhang A angegeben sind. Das Nukleinsäuremolekül kann alternativ nur den codierenden Bereich einer der Sequenzen in Anhang A umfassen.



## 21

- Für die Zwecke dieser Anmeldung hat selbstverständlich jede der in Anhang A angegebenen Sequenzen eine RXA- oder RXN-Identifizierungsnummer, wobei hinter der Bezeichnung "RXA" oder "RXN" 5 Ziffern aufgeführt sind (bspw. RXA00003). Jede dieser Sequenzen umfaßt bis zu drei Abschnitte: einen stromaufwärts gelegenen 5'-Bereich, einen codierenden Bereich, und einen stromabwärts gelegenen Bereich. Jeder dieser drei Bereiche ist durch die gleiche RXA- oder RXN-Bezeichnung gekennzeichnet, um Verwirrung zu vermeiden. Die Bezeichnung "eine der Sequenzen in Anhang A" steht dann für eine der Sequenzen in Anhang A, die sich durch ihre unterschiedlichen RXA- oder RXN-Nummern unterscheiden lassen. Der codierende Bereich jeder Sequenz wird in die entsprechende Aminosäuresequenz translatiert, die in Anhang B angegeben ist. Die Sequenzen in Anhang B werden durch die gleichen RXA- oder RXN-Nummern wie in Anhang A identifiziert, so daß sie sich leicht zuordnen lassen. Bspw. ist die mit RXA00003 bezeichnete Aminosäuresequenz in Anhang B eine Translation des codierenden Bereichs der Nukleotidsequenz des Nukleinsäuremoleküls RXA00003 in Anhang A.
- 20 Bei einer Ausführungsform sollen die erfindungsgemäßen Nukleinsäuremoleküle nicht die in Tabelle 2 zusammengestellten umfassen.

- Bei einer weiteren bevorzugten Ausführungsform umfaßt ein erfindungsgemäßes isoliertes Nukleinsäuremolekül ein zu einer der in Anhang A gezeigten Nukleotidsequenzen komplementäres Nukleinsäuremolekül oder einen Abschnitt davon, wobei es sich um ein Nukleinsäuremolekül handelt, das zu einer der in Anhang A gezeigten Nukleotidsequenzen hinreichend komplementär ist, daß es mit einer der in Anhang A angegebenen Sequenzen hybridisieren kann, wodurch ein stabiler Duplex entsteht.

- Bei einer weiteren bevorzugten Ausführungsform umfaßt ein erfindungsgemäßes isoliertes Nukleinsäuremolekül eine Nukleotidsequenz, die mindestens etwa 50-60%, vorzugsweise mindestens etwa 60-70%, stärker bevorzugt mindestens etwa 70-80%, 80-90% oder 90-95% und noch stärker bevorzugt mindestens etwa 95%, 96%, 97%, 98%, 99% oder noch homologer zu einer in Anhang A angegebenen Nukleotidsequenz oder einem Abschnitt davon ist. Bei einer weiteren bevorzugten Ausführungsform umfaßt ein erfindungsgemäßes isoliertes Nukleinsäuremolekül eine Nukleotidsequenz, die, bspw. unter stringenten Bedingungen, mit einer der in Anhang A gezeigten Nukleotidsequenzen oder einem Abschnitt davon hybridisiert.

- Das erfindungsgemäße Nukleinsäuremolekül kann überdies nur einen Abschnitt des codierenden Bereichs von einer der Sequenzen in Anhang A umfassen, bspw. ein Fragment, das als Sonde oder Primer oder Fragment verwendet werden kann, welches einen biologisch ak-

## 22

- tiven Abschnitt eines MCP-Proteins codiert. Die aus der Klonierung der MCP-Gene aus *C. glutamicum* ermittelten Nukleotidsequenzen ermöglichen die Erzeugung von Sonden und Primern, die zur Identifizierung und/oder Klonierung von MCP-Homologa in anderen Zelltypen und Organismen und MCP-Homologa von anderen *Corynebakterien* oder verwandten Arten ausgelegt sind. Die Sonde bzw. der Primer umfaßt gewöhnlich im wesentlichen gereinigtes Oligonukleotid. Das Oligonukleotid umfaßt gewöhnlich einen Nukleotidsequenzbereich, der unter stringenten Bedingungen an mindestens etwa 12, vorzugsweise etwa 25, stärker bevorzugt etwa 40, 50 oder 75 aufeinanderfolgende Nukleotide eines Sense-Stranges von einer der in Anhang A angegebenen Sequenzen, eines Antisense-Stranges von einer der in Anhang A angegebenen Sequenzen oder natürlich vorkommenden Mutanten davon hybridisiert. Primer auf der Basis einer Nukleotidsequenz aus Anhang A können in PCR-Reaktionen zur Klonierung von MCP-Homologa verwendet werden. Sonden auf der Basis der MCP-Nukleotidsequenzen können zum Nachweisen von Transkripten oder genomischen Sequenzen, die das gleiche oder homologe Proteine codieren, verwendet werden. In bevorzugten Ausführungsformen umfaßt die Sonde zudem eine daran gebundene Markierungsgruppe, bspw. ein Radioisotop, eine fluoreszierende Verbindung, ein Enzym oder einen Enzym-Cofaktor. Diese Sonden können als Teil eines diagnostischen Test-Kits zur Identifizierung von Zellen verwendet werden, die ein MCP-Protein mißexpressieren, bspw. durch Messen einer Menge einer MCP-codierenden Nukleinsäure in einer Zellenprobe, bspw. durch Nachweisen der MCP-mRNA-Spiegel oder durch Bestimmen, ob ein genomisches MCP-Gen mutiert oder deletiert ist.
- Bei einer Ausführungsform codiert das erfindungsgemäße Nukleinsäuremolekül ein Protein oder einen Abschnitt davon, der eine Aminosäuresequenz umfaßt, die hinreichend homolog zu einer Aminosäuresequenz von Anhang B ist, daß das Protein oder ein Abschnitt davon die Fähigkeit behält, die Ausbeute, Produktion und/oder Effizienz der Produktion einer oder mehrerer Feinchemikalien in *C. glutamicum* zu modulieren, Kohlenwasserstoffe abzubauen, Terpene zu oxidieren, als Ziel für Arzneimittelentwicklung zu dienen oder als Identifikationsmarker für *C. glutamicum* oder verwandte Organismen zu dienen. Wie hier verwendet, betrifft der Begriff "hinreichend homolog" Proteine oder Abschnitte davon, deren Aminosäuresequenzen eine minimale Anzahl identischer oder äquivalenter (bspw. einen Aminosäurerest mit einer ähnlichen Seitenkette wie ein Aminosäurerest in einer der Sequenzen von Anhang B) Aminosäurereste zu einer Aminosäuresequenz aus Anhang B aufweisen, so daß das Protein oder ein Abschnitt davon die Ausbeute, Produktion und/oder Effizienz der Produktion einer oder mehrerer Feinchemikalien in *C. glutamicum* modulieren, Kohlenwasserstoffe

## 23

abbauen, Terpenoide oxidieren, als Ziel für Arzneimittelentwicklung dienen oder als Identifikationsmarker für *C. glutamicum* oder verwandte Organismen dienen kann. Beispiele dieser Aktivitäten sind ebenfalls hier beschrieben. Somit trägt die "Funktion eines MCP-Proteins" zur Gesamt-Regulation des Stoffwechselweges einer oder mehrerer Feinchemikalien oder zum Abbau eines Kohlenwasserstoffs oder zur Oxidation eines Terpenoids bei.

- Bei einer weiteren Ausführungsform ist das Protein mindestens
- 10 etwa 50-60%, vorzugsweise mindestens etwa 60-70%, stärker bevorzugt mindestens etwa 70-80%, 80-90%, 90-95% und am stärksten bevorzugt mindestens etwa 96%, 97%, 98%, 99% oder noch homologer zu einer vollständigen Aminosäuresequenz in Anhang B.
- 15 Abschnitte von Proteinen, die von den erfindungsgemäßen MCP-Nukleinsäuremolekülen codiert werden, sind vorzugsweise biologisch aktive Abschnitte von einem der MCP-Proteine. Der Begriff "biologisch aktiver Abschnitt eines MCP-Proteins", wie er hier verwendet wird, soll einen Abschnitt, bspw. eine Domäne/ein Motiv eines
- 20 MCP-Proteins, umfassen, die/das die Ausbeute, Produktion und/oder Effizienz der Produktion einer oder mehrerer Feinchemikalien in *C. glutamicum* moduliert, Kohlenwasserstoffe abbaut, Terpenoide oxidiert, als Ziel für Arzneimittelentwicklung oder als Identifikationsmarker für *C. glutamicum* oder verwandte Organismen
- 25 dient. Zur Bestimmung, ob ein MCP-Protein oder ein biologisch aktiver Abschnitt davon die Ausbeute, Produktion und/oder Effizienz der Produktion einer oder mehrerer Feinchemikalien in *C. glutamicum* modulieren, Kohlenwasserstoffe abbauen oder Terpenoide oxidieren kann, kann ein Test der enzymatischen Aktivität durchgeführt werden. Diese Testverfahren, wie eingehend beschrieben in
- 30 Beispiel 8 des Beispielteils, sind dem Fachmann geläufig.

Zusätzliche Nukleinsäurefragmente, die biologisch aktive Abschnitte eines MCP-Proteins codieren, lassen sich durch Isolieren

35 eines Abschnitts von einer der Sequenzen in Anhang B, Exprimieren des codierten Abschnitts des MCP-Proteins oder -Peptides (z.B. durch rekombinante Expression in vitro) und Bestimmen der Aktivität des codierten Abschnittes des MCP-Proteins oder -Peptides herstellen.

40

Die Erfindung umfaßt zudem Nukleinsäuremoleküle, die sich von einer der in Anhang A gezeigten Nukleotidsequenzen (und Abschnitten davon) aufgrund des degenerierten genetischen Codes unterscheiden und somit das gleiche MCP-Protein codieren wie dasjenige, das von

45 den in Anhang A gezeigten Nukleotidsequenzen codiert wird. In einer anderen Ausführungsform hat ein erfindungsgemäßes isoliertes Nukleinsäuremolekül eine Nukleotidsequenz, die ein Protein mit

## 24

einer in Anhang B gezeigten Aminosäuresequenz codiert. In einer weiteren Ausführungsform codiert das erfindungsgemäße Nukleinsäuremolekül ein *C. glutamicum*-Vollängenprotein, das zu einer Aminosäuresequenz aus Anhang B (codiert von einem in Anhang A gezeigten offenen Leseraster) im wesentlichen homolog ist.

- Zusätzlich zu den in Anhang A gezeigten *C. glutamicum*-MCP-Nukleotidsequenzen, ist dem Fachmann bekannt, daß DNA-Sequenzpolymorphismen, die zu Änderungen in den Aminosäuresequenzen von MCP-Proteinen führen, innerhalb einer Population (bspw. der *C. glutamicum*-Population) existieren können. Diese genetischen Polymorphismen im MCP-Gen können zwischen Individuen innerhalb einer Population aufgrund der natürlichen Variation existieren. Wie hier verwendet, bedeuten die Begriffe "Gen" und "rekombinantes Gen"
- 10 Nukleinsäuremoleküle mit einem offenen Leseraster, das ein MCP-Protein, vorzugsweise ein *C. glutamicum*-MCP-Protein, codiert. Diese natürlichen Variationen bewirken üblicherweise eine Varianz von 1-5% in der Nukleotidsequenz des MCP-Gens. Sämtliche Nukleotidvariationen und daraus resultierenden Aminosäurepolymorphismen
- 15 in MCP, die das Ergebnis natürlicher Variation sind und die funktionelle Aktivität von MCP-Proteinen nicht verändern, sollen im Umfang der Erfindung liegen.

- Nukleinsäuremoleküle, die natürlichen Varianten entsprechen, und
- 25 Nicht-*C. glutamicum*-Homologa der erfindungsgemäßen *C. glutamicum*-MCP-cDNA können aufgrund ihrer Homologie zur hier offenbarten *C. glutamicum*-MCP-Nukleinsäure mit der *C. glutamicum*-cDNA oder einem Abschnitt davon als Hybridisierungssonde gemäß Standard-Hybridisierungstechniken unter stringenten Hybridisierungsbedingungen
- 30 isoliert werden. In einer anderen Ausführungsform ist folglich ein erfindungsgemäßes isoliertes Nukleinsäuremolekül mindestens 15 Nukleotide lang und hybridisiert unter stringenten Bedingungen mit dem Nukleinsäuremolekül, das eine Nukleotidsequenz aus Anhang A umfaßt. In anderen Ausführungsformen ist die Nukleinsäure mindestens 30, 50, 100, 250 Nukleotide lang oder länger. Der Begriff
- 35 "hybridisiert unter stringenten Bedingungen", wie er hier verwendet wird, soll Hybridisierungs- und Waschbedingungen beschreiben, unter denen Nukleotidsequenzen, die mindestens 60% homolog zueinander sind, gewöhnlich aneinander hybridisiert bleiben. Die Bedingungen sind vorzugsweise derart, daß Sequenzen, die mindestens etwa 65%, stärker bevorzugt mindestens etwa 70% und noch stärker bevorzugt mindestens etwa 75% oder stärker zueinander homolog sind, gewöhnlich aneinander hybridisiert bleiben. Diese stringenten Bedingungen sind dem Fachmann bekannt und lassen sich in Aus-
- 40 ubel et al., Current Protocols in Molecular Biology, John Wiley & Sons, N.Y. (1989), 6.3.1-6.3.6. finden. Ein bevorzugtes, nicht-einschränkendes Beispiel für stringente Hybridisierungsbedingun-
- 45

## 25

gen ist eine Hybridisierung in 6x Natriumchlorid/Natriumcitrat (SSC) bei etwa 45°C, gefolgt von einem oder mehreren Waschschritten in 0,2x SSC, 0,1% SDS bei 50-65°C. Ein erfindungsgemäßes isoliertes Nukleinsäuremolekül, das unter stringenten Bedingungen an  
5 eine Sequenz aus Anhang A hybridisiert, entspricht vorzugsweise einem natürlich vorkommenden Nukleinsäuremolekül. Wie hier verwendet betrifft ein "natürlich vorkommendes" Nukleinsäuremolekül ein RNA- oder DNA-Molekül mit einer Nukleotidsequenz, die in der Natur vorkommt (bspw. ein natürliches Protein codiert). Bei einer  
10 Ausführungsform codiert die Nukleinsäure ein natürlich vorkommendes *C. glutamicum*-MCP-Protein.

Zusätzlich zu natürlich vorkommenden Varianten der MCP-Sequenz, die in der Population existieren können, ist der Fachmann sich  
15 ebenfalls bewußt darüber, daß Änderungen durch Mutation in eine Nukleotidsequenz von Anhang A eingebracht werden können, was zur Änderung der Aminosäuresequenz des codierten MCP-Proteins führt, ohne daß die Funktionsfähigkeit des MCP-Proteins beeinträchtigt wird. Bspw. lassen sich Nukleotidsusbtitutionen, die an "nicht-  
20 essentiellen" Aminosäureresten zu Aminosäuresubstitutionen führen, in einer Sequenz von Anhang A herstellen. Ein "nicht-essentieller" Aminosäurerest ist ein Rest, der sich in der Wildtypsequenz von einem der MCP-Proteine (Anhang B) verändern läßt, ohne daß die Aktivität des MCP-Proteins verändert wird, wohingegen ein  
25 "essentieller" Aminosäurerest für die MCP-Proteinaktivität erforderlich ist. Andere Aminosäurereste jedoch (bspw. nicht-konservierte oder lediglich semikonservierte Aminosäurereste in der Domäne mit MCP-Aktivität) können für die Aktivität nicht essentiell sein und lassen sich somit wahrscheinlich verändern, ohne daß die  
30 MCP-Aktivität verändert wird.

Ein weiterer Aspekt der Erfindung betrifft folglich Nukleinsäuremoleküle, die MCP-Proteine codieren, die veränderte Aminosäurereste enthalten, die für die MCP-Aktivität nicht-essentiell sind.  
35 Diese MCP-Proteine unterscheiden sich in der Aminosäuresequenz von einer Sequenz in Anhang B, behalten aber dennoch mindestens eine der hier beschriebenen MCP-Aktivitäten. Das isolierte Nukleinsäuremolekül umfaßt bei einer Ausführungsform eine Nukleotidsequenz, die ein Protein codiert, das eine Aminosäuresequenz  
40 umfaßt, die mindestens etwa 50% Homologie zu einer Aminosäuresequenz aus Anhang B aufweist und die Ausbeute, Produktion und/oder Effizienz der Produktion einer oder mehrerer Feinchemikalien in *C. glutamicum* modulieren, Kohlenwasserstoffe abbauen, Terpene oxidieren, als Ziel für Arzneimittelentwicklung dienen oder  
45 als Identifikationsmarker für *C. glutamicum* oder verwandte Organismen dienen kann. Das von dem Nukleinsäuremolekül codierte Protein weist vorzugsweise mindestens etwa 50-60%, stärker bevorzugt

## 26

mindestens etwa 60-70%, noch stärker bevorzugt mindestens etwa 70-80%, 80-90%, 90-95%, und am stärksten bevorzugt mindestens etwa 96%, 97%, 98% oder 99% Homologie zu einer der Sequenzen in Anhang B auf.

5

Zur Bestimmung der prozentualen Homologie von zwei Aminosäuresequenzen (bspw. einer der Sequenzen aus Anhang B und einer mutierten Form davon) oder von zwei Nukleinsäuren werden die Sequenzen für optimale Vergleichszwecke untereinander geschrieben (bspw.

- 10 können Lücken in die Sequenz eines Proteins oder einer Nukleinsäure eingefügt werden, damit ein optimales Alignment mit dem anderen Protein oder der anderen Nukleinsäure erzeugt wird). Die Aminosäurereste oder die Nukleotide werden dann an den entsprechenden Aminosäure- oder Nukleotidpositionen miteinander vergli-
- 15 chen. Wenn eine Position in einer Sequenz (bspw. einer der Sequenzen von Anhang B) vom gleichen Aminosäurerest oder Nukleotid belegt wird, wie an der entsprechenden Stelle in der anderen Sequenz (bspw. einer mutanten Form der aus Anhang B ausgewählten Sequenz), dann sind die Moleküle an dieser Position homolog (d.h.
- 20 der hier verwendete Begriff Aminosäure- oder Nukleinsäure-"Homologie" ist äquivalent zu Aminosäure- oder Nukleinsäure-"Identität"). Die prozentuale Homologie zwischen den beiden Sequenzen ist eine Funktion der Anzahl der identischen Positionen in allen Sequenzen (d.h. % Homologie = Anzahl der identischen Positionen/
- 25 Gesamtanzahl der Positionen x 100).

Ein isoliertes Nukleinsäuremolekül, das ein MCP-Protein codiert, das zu einer Proteinsequenz aus Anhang B homolog ist, kann durch Einbringen von einer oder mehreren Nukleotidsubstitutionen,

- 30 -additionen oder -deletionen in eine Nukleotidsequenz aus Anhang A erzeugt werden, so daß eine oder mehrere Aminosäuresubstitutionen, -additionen oder -deletionen in das codierte Protein eingebracht werden. Die Mutationen können in eine der Sequenzen aus Anhang A durch Standard-Techniken, wie stellergerichtete Mutagenese und PCR-vermittelte Mutagenese, eingebracht werden. Vor-
- 35 zugsweise werden konservative Aminosäuresubstitutionen an einem oder mehreren der vorhergesagten nicht-essentiellen Aminosäurereste eingeführt. Bei einer "konservativen Aminosäuresubstitution" wird der Aminosäurerest durch einen Aminosäurerest mit einer ähn-
- 40 lichen Seitenkette ausgetauscht. Im Fachgebiet sind Familien von Aminosäureresten mit ähnlichen Seitenketten definiert worden. Diese Familien umfassen Aminosäuren mit basischen Seitenketten (z.B. Lysin, Arginin, Histidin), sauren Seitenketten (z.B. Asparaginsäure, Glutaminsäure), ungeladenen polaren Seitenketten
- 45 (z.B. Glycin, Asparagin, Glutamin, Serin, Threonin, Tyrosin, Cystein), nicht-polaren Seitenketten, (bspw. Alanin, Valin, Leucin, Isoleucin, Prolin, Phenylalanin, Methionin, Tryptophan), beta-

## 27

verzweigten Seitenketten (z.B. Threonin, Valin, Isoleucin) und aromatischen Seitenketten (z.B. Tyrosin, Phenylalanin, Tryptophan, Histidin). Ein vorhergesagter nicht-essentieller Aminosäurerest in einem MCP-Protein wird somit vorzugsweise durch einen  
5 anderen Aminosäurerest der gleichen Seitenkettenfamilie ausgetauscht. In einer weiteren Ausführungsform können die Mutationen alternativ zufallsgemäß über die gesamte oder einen Teil der MCP-codierenden Sequenz eingebracht werden, bspw. durch Sättigungsmutagenese, und die resultierenden Mutanten können auf eine hier  
10 beschriebene MCP-Aktivität untersucht werden, um Mutanten zu identifizieren, die eine MCP-Aktivität beibehalten. Nach der Mutagenese von einer der Sequenzen aus Anhang A kann das codierte Protein rekombinant exprimiert werden, und die Aktivität des Proteins kann bspw. mit den hier beschriebenen Tests (siehe Beispiel  
15 8 des Beispielteils) bestimmt werden.

Zusätzlich zu den Nukleinsäuremolekülen, die die vorstehend beschriebenen MCP-Proteine codieren, betrifft ein weiterer Aspekt der Erfindung isolierte Nukleinsäuremoleküle, die antisense dazu  
20 sind. Eine "Antisense"-Nukleinsäure umfaßt eine Nukleotidsequenz, die zu einer "Sense"-Nukleinsäure, welche ein Protein codiert, komplementär ist, bspw. komplementär zum codierenden Strang eines doppelsträngigen cDNA-Moleküls oder komplementär zu einer mRNA-Sequenz. Eine Antisense-Nukleinsäure kann folglich über Wasserstoffbrückenbindungen an eine Sense-Nukleinsäure binden. Die Antisense-Nukleinsäure kann zum gesamten MCP-codierenden Strang  
25 oder nur zu einem Abschnitt davon komplementär sein. Bei einer Ausführungsform ist ein Antisense-Nukleinsäuremolekül antisense zu einem "codierenden Bereich" des codierenden Stranges einer Nukleotidsequenz, die ein MCP-Protein codiert. Der Begriff "codierender Bereich" betrifft den Bereich der Nukleotidsequenz, der Codons umfaßt, die in Aminosäurereste translatiert werden (bspw. umfaßt der gesamte codierende Bereich von SEQ.-ID. RXA00003 die Nukleotide 1 bis 741). Bei einer weiteren Ausführungsform ist das  
30 Antisense-Nukleinsäuremolekül antisense zu einem "nicht-codierenden Bereich" des codierenden Stranges einer Nukleotidsequenz, die MCP codiert. Der Begriff "nicht-codierender Bereich" betrifft 5'- und 3'-Sequenzen, die den codierenden Bereich flankieren und nicht in Aminosäuren translatiert werden (d.h. die auch als 5'-  
35 und 3'-untranslatierte Bereiche bezeichnet werden).  
40

Bei den hier offenbarten Sequenzen des codierenden Stranges, die das MCP codieren (bspw. die Sequenzen aus Anhang A), können die erfindungsgemäßen Antisense-Nukleinsäuren gemäß der Regeln der  
45 Watson-Crick-Basenpaarung ausgestaltet werden. Das Antisense-Nukleinsäuremolekül kann zum gesamten codierenden Bereich von MCP-mRNA komplementär sein, ist aber stärker bevorzugt ein Oligonu-

kleotid, das zu lediglich einem Abschnitt des codierenden oder nicht-codierenden Bereichs der MCP-mRNA antisense ist. Das Antisense-Oligonukleotid kann bspw. zum Bereich, der die Translationsstartstelle von MCP-mRNA umgibt, komplementär sein. Ein Antisense-Oligonukleotid kann bspw. etwa 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45 oder 50 Nukleotide lang sein. Eine erfindungsgemäße Antisense-Nukleinsäure kann durch chemische Synthese und enzymatische Ligationsreaktionen mittels im Fachgebiet bekannter Verfahren konstruiert werden. Eine Antisense-Nukleinsäure (bspw. ein Antisense-Oligonukleotid) kann chemisch synthetisiert werden, wobei natürlich vorkommende Nukleotide oder verschieden modifizierte Nukleotide verwendet werden, die so gestaltet sind, daß sie die biologische Stabilität der Moleküle erhöhen oder die physikalische Stabilität des Duplexes erhöhen, der zwischen der Antisense- und Sense-Nukleinsäure entstanden ist. Bspw. können Phosphorothioat-Derivate und acridinsubstituierte Nukleotide verwendet werden. Beispiele modifizierter Nukleotide, die zur Erzeugung der Antisense-Nukleinsäure verwendet werden können, sind u.a. 5-Fluoruracil, 5-Bromuracil, 5-Chloruracil, 5-Ioduracil, Hypoxanthin, Xanthin, 4-Acetylcytosin, 5-(Carboxyhydroxymethyl)uracil, 5-Carboxymethylaminomethyl-2-thiouridin, 5-Carboxymethylaminomethyluracil, Dihydrouracil, Beta-D-Galactosylqueosin, Inosin, N6-Iso-pentenyladenin, 1-Methylguanin, 1-Methylinosin, 2,2-Dimethylguanin, 2-Methyladenin, 2-Methylguanin, 3-Methylcytosin, 5-Methylcytosin, N6-Adenin, 7-Methylguanin, 5-Methylaminomethyluracil, 5-Methoxyaminomethyl-2-thiouracil, Beta-D-Mannosylqueosin, 5'-Methoxycarboxymethyluracil, 5-Methoxyuracil, 2-Methylthio-N6-isopentenyladenin, Uracil-5-oxyessigsäure (v), Wybutoxosin, Pseudouracil, Queosin, 2-Thiocytosin, 5-Methyl-2-thiouracil, 2-Thiouracil, 4-Thiouracil, 5-Methyluracil, Uracil-5-oxyessigsäuremethylester, Uracil-5-oxyessigsäure (v), 5-Methyl-2-thiouracil, 3-(3-Amino-3-N-2-carboxypropyl)uracil, (acp3)w und 2,6-Diaminopurin. Die Antisense-Nukleinsäure kann ersatzweise biologisch hergestellt werden, indem ein Expressionsvektor verwendet wird, in den eine Nukleinsäure in Antisense-Richtung subkloniert worden ist (d.h. RNA, die von der eingebrachten Nukleinsäure transkribiert wird, ist zu einer Ziehnukleinsäure von Interesse in Antisense-Richtung orientiert, was im nachstehenden Unterabschnitt weiter beschrieben ist).

40

Die erfindungsgemäßen Antisense-Nukleinsäuremoleküle werden üblicherweise an eine Zelle verabreicht oder in situ erzeugt, so daß sie mit der zellulären mRNA und/oder der genomischen DNA, die ein MCP-Protein codiert, hybridisieren oder daran binden, so daß die Expression des Proteins, bspw. durch Hemmung der Transkription und/oder Translation, gehemmt wird. Die Hybridisierung kann durch herkömmliche Nukleotid-Komplementarität unter Bildung eines sta-



## 29

bilen Duplexes oder bspw. im Fall eines Antisense-Nukleinsäuremoleküls, das DNA-Duplices bindet, durch spezifische Wechselwirkungen in der großen Furche der Doppelhelix erfolgen. Das Antisense-Molekül kann so modifiziert werden, daß es spezifisch an einen

5 Rezeptor oder an ein Antigen bindet, das auf einer ausgewählten Zelloberfläche exprimiert wird, bspw. durch Verknüpfen des Antisense-Nukleinsäuremoleküls mit einem Peptid oder einem Antikörper, das/der an einen Zelloberflächenrezeptor oder Antigen bindet. Das Antisense-Nukleinsäuremolekül kann auch unter Verwendung

10 der hier beschriebenen Vektoren an Zellen verabreicht werden. Zur Erzielung hinreichender intrazellulärer Konzentrationen der Antisense-Moleküle sind Vektorkonstrukte, in denen sich das Antisense-Nukleinsäuremolekül unter der Kontrolle eines prokaryotischen, viralen oder eukaryotischen Promotors befindet, bevorzugt.

15

In einer weiteren Ausführungsform ist das erfindungsgemäße Antisense-Nukleinsäuremolekül ein  $\alpha$ -anomerer Nukleinsäuremolekül. Ein  $\alpha$ -anomerer Nukleinsäuremolekül bildet spezifische doppelsträngige Hybride mit komplementärer RNA, wobei die Stränge im Gegensatz

20 zu gewöhnlichen  $\beta$ -Einheiten parallel zueinander verlaufen. (Gaultier et al., (1987) Nucleic Acids Res. 15:6625-6641). Das Antisense-Nukleinsäuremolekül kann zudem ein 2'-O-Methylribonukleotid (Inoue et al., (1987) Nucleic Acids Res. 15:6131-6148) oder ein chimäres RNA-DNA-Analogon (Inoue et al.

25 (1987) FEBS Lett. 215:327-330) umfassen.

In einer weiteren Ausführungsform ist eine erfindungsgemäße Antisense-Nukleinsäure ein Ribozym. Ribozyme sind katalytische RNA-Moleküle mit Ribonukleaseaktivität, die eine einzelsträngige Nu-

30 kleinsäure, wie eine mRNA, zu der sie einen komplementären Bereich haben, spalten können. Somit können Ribozyme (z.B. Hammerhead-Ribozyme (beschrieben in Haselhoff und Gerlach (1988) Nature 334:585-591)) zur katalytischen Spaltung von MCP-mRNA-Transkripten verwendet werden, um dadurch die Translation der MCP-mRNA zu

35 hemmen. Ein Ribozym mit Spezifität für eine MCP-codierende Nukleinsäure kann auf der Basis der Nukleotidsequenz einer hier offenbarten MCP-cDNA (d.h. RXA00003 in Anhang A) gestaltet werden. Bspw. kann ein Derivat einer Tetrahymena-L-19-IVS-RNA konstruiert werden, wobei die Nukleotidsequenz der aktiven Stelle komplementär zur Nukleotidsequenz ist, die in einer MCP-codierenden mRNA

40 gespalten werden soll. S. bspw. Cech et al., US-Patent Nr. 4 987 071 und Cech et al., US-Patent Nr. 5 116 742. Alternativ kann MCP-mRNA zur Selektion einer katalytischen RNA mit spezifischer Ribonukleaseaktivität aus einem Pool von RNA-Molekülen verwendet

45 werden. Siehe bspw. Bartel, D., und Szostak, J.W. (1993) Science 261:1411-1418.

Die MCP-Genexpression läßt sich alternativ hemmen, indem Nukleotidsequenzen, die komplementär zum regulatorischen Bereich einer MCP-Nukleotidsequenz sind (bspw. zu einem MCP-Promotor und/oder -Enhancer) so dirigiert werden, daß Triple-Helixstrukturen gebildet werden, die die Transkription eines MCP-Gens in Ziel-Zellen verhindern. Siehe allgemein Helene, C. (1991) Anticancer Drug Res. 6(6) 569-584; Helene, C. et al., (1992) Ann. N. Y. Acad. Sci. 660:27-36; und Maher. L.J. (1992) Bioassays 14(12):807-815.

#### 10 B. *Rekombinante Expressionsvektoren und Wirtszellen*

Ein weiterer Aspekt der Erfindung betrifft Vektoren, vorzugsweise Expressionsvektoren, die eine Nukleinsäure enthalten, die ein MCP-Protein (oder einen Abschnitt davon) codieren. Wie hier verwendet, betrifft der Begriff "Vektor" ein Nukleinsäuremolekül, das eine andere Nukleinsäure transportieren kann, an welche es gebunden ist. Ein Vektortyp ist ein "Plasmid", was für eine zirkuläre doppelsträngige DNA-Schleife steht, in die zusätzliche DNA-Segmente ligiert werden können. Ein weiterer Vektortyp ist ein viraler Vektor, wobei zusätzliche DNA-Segmente in das virale Genom ligiert werden können. Bestimmte Vektoren können in einer Wirtszelle, in die sie eingebracht worden sind, autonom replizieren (bspw. Bakterienvektoren mit bakteriellem Replikationsursprung und episomale Säugetiervektoren). Andere Vektoren (z.B. nicht-episomale Säugetiervektoren) werden in das Genom einer Wirtszelle beim Einbringen in die Wirtszelle integriert und dadurch zusammen mit dem Wirtsgenom repliziert. Zudem können bestimmte Vektoren die Expression von Genen, mit denen sie funktionsfähig verbunden sind, steuern. Diese Vektoren werden hier als "Expressionsvektoren" bezeichnet. Gewöhnlich haben die Expressionsvektoren, die bei DNA-Rekombinationstechniken verwendet werden können, die Form von Plasmiden. In der vorliegenden Beschreibung können "Plasmid" und "Vektor" austauschbar verwendet werden, da das Plasmid die am häufigsten verwendete Vektorform ist. Die Erfindung soll jedoch andere Expressionsvektorformen, wie virale Vektoren (bspw. replikationsdefiziente Retroviren, Adenoviren und adenoverwandte Viren), die ähnliche Funktionen ausüben, umfassen.

Die erfindungsgemäßen rekombinanten Expressionsvektoren umfassen eine erfindungsgemäße Nukleinsäure in einer Form, die sich zur Expression der Nukleinsäure in einer Wirtszelle eignet, d.h. daß die rekombinanten Expressionsvektoren eine oder mehrere regulatorische Sequenzen, ausgewählt auf der Basis der zur Expression zu verwendenden Wirtszellen, umfassen, die mit der zu exprimierenden Nukleinsäuresequenz funktionsfähig verbunden sind. In einem rekombinanten Expressionsvektor bedeutet "funktionsfähig verbunden", daß die Nukleotidsequenz von Interesse derart an die

## 31

- regulatorische(n) Sequenz(en) gebunden ist, daß die Expression der Nukleotidsequenz möglich ist (bspw. in einem in-vitro-Transkriptions-/Translationssystem oder in einer Wirtszelle, wenn der Vektor in die Wirtszelle eingebracht ist). Der Begriff "regulatorische Sequenz" soll Promotoren, Repressorbindungsstellen, Aktivatorbindungsstellen, Enhancerbereiche und andere Expressionskontrollelemente (bspw. Terminatoren, andere Elemente der m-RNA-Sekundärstruktur oder Polyadenylierungssignale) umfassen. Diese regulatorischen Sequenzen sind bspw beschrieben in Goeddel: Gene Expression Technology: Methods in Enzymology 185, Academic Press, San Diego, CA (1990). Regulatorische Sequenzen umfassen solche, die die konstitutive Expression einer Nukleotidsequenz in vielen Wirtszelltypen steuern, und solche, die die Expression der Nukleotidsequenz nur in bestimmten Wirtszellen steuern. Der Fachmann ist sich dessen bewußt, daß die Gestaltung eines Expressionsvektors von Faktoren abhängen kann, wie der Wahl der zu transformierenden Wirtszelle, dem gewünschten Ausmaß der Proteinexpression usw. Die erfindungsgemäßen Expressionsvektoren können in die Wirtszellen eingebracht werden, so daß dadurch Proteine oder Peptide, einschließlich der Fusionsproteine oder -peptide, die von den Nukleinsäuren, wie hier beschrieben, codiert werden, hergestellt werden (bspw. MCP-Proteine, mutierte Formen von MCP-Proteinen, Fusionsproteine, usw.).
- 25 Die erfindungsgemäßen rekombinanten Expressionsvektoren können zur Expression von MCP-Proteinen in prokaryotischen oder eukaryotischen Zellen ausgestaltet sein. Bspw. können MCP-Gene in bakteriellen Zellen, wie *C. glutamicum*, Insektenzellen (mit Baculovirus-Expressionsvektoren), Hefe- und anderen Pilzzellen (siehe Romanos, M.A. et al. (1992) "Foreign gene expression in yeast: a review", Yeast 8: 423-488; van den Hondel, C.A.M.J.J. et al. (1991) "Heterologous gene expression in filamentous fungi" in: More Gene Manipulations in Fungi, J.W. Bennet & L.L. Lasure, Hrsg., S. 396-428: Academic Press: San Diego; und van den Hondel, C.A.M.J.J. & Punt, P.J. (1991) "Gene transfer systems and vector development for filamentous fungi. in: Applied Molecular Genetics of Fungi, Peberdy, J.F. et al., Hrsg, S. 1-28, Cambridge University Press: Cambridge), Algenzellen und Zellen vielzelliger Pflanzen (siehe Schmidt, R. und Willmitzer, L. (1988) "High efficiency Agrobacterium tumefaciens-mediated transformation of Arabidopsis thaliana leaf and cotyledon explants" Plant Cell Rep.: 583-586) oder Säugetierzellen exprimiert werden. Geeignete Wirtszellen werden weiter erörtert in Goeddel, Gene Expression Technology: Methods in Enzymology 185, Academic Press, San Diego, CA (1990). Der rekombinante Expressionsvektor kann alternativ,

## 32

bspw. mit regulatorischen Sequenzen des T7-Promotors und T7-Polymerase, in vitro transkribiert und translatiert werden.

Die Expression von Proteinen in Prokaryoten erfolgt meist mit Vektoren, die konstitutive oder induzierbare Promotoren enthalten, die die Expression von Fusions- oder Nicht-Fusionsproteinen steuern. Fusionsvektoren steuern eine Reihe von Aminosäuren zu einem darin codierten Protein, gewöhnlich am Aminotermius des rekombinanten Proteins, bei. Diese Fusionsvektoren haben gewöhnlich drei Aufgaben: 1) die Verstärkung der Expression von rekombinantem Protein; 2) die Erhöhung der Löslichkeit des rekombinanten Proteins; und 3) die Unterstützung der Reinigung des rekombinanten Proteins durch Wirkung als Ligand bei der Affinitätsreinigung. Bei Fusions-Expressionsvektoren wird oft eine proteolytische Spaltstelle an der Verbindungsstelle der Fusionseinheit und des rekombinanten Proteins eingebracht, so daß die Trennung des rekombinanten Proteins von der Fusionseinheit nach der Reinigung des Fusionsproteins möglich ist. Diese Enzyme und ihre entsprechenden Erkennungssequenzen umfassen Faktor Xa, Thrombin und Entero-  
erokinase.

Übliche Fusionsexpressionsvektoren umfassen pGEX (Pharmacia Biotech Inc; Smith, D.B. und Johnson, K.S. (1988) Gene 67:31-40), pMAL (New England Biolabs, Beverly, MA) und pRIT 5 (Pharmacia, Piscataway, NJ), bei denen Glutathion-S-Transferase (GST), Maltose E-bindendes Protein bzw. Protein A an das rekombinante Zielprotein fusioniert wird. Bei einer Ausführungsform ist die codierende Sequenz des MCP-Proteins in einen pGEX-Expressionsvektor kloniert, so daß ein Vektor erzeugt wird, der ein Fusionsprotein codiert, umfassend vom N-Terminus zum C-Terminus: GST - Thrombin-Spaltstelle - X-Protein. Das Fusionsprotein kann durch Affinitätschromatographie mittels Glutathion-Agarose-Harz gereinigt werden. Das rekombinante MCP-Protein, das nicht mit GST fusioniert ist, kann durch Spaltung des Fusionsproteins mit Thrombin gewonnen werden.

Beispiele geeigneter induzierbarer Nicht-Fusions-*E.-coli*-Expressionsvektoren umfassen pTrc (Amann et al., (1988) Gene 69:301-315) und pET 11d (Studier et al. Gene Expression Technology: Methods in Enzymology 185, Academic Press, San Diego, Kalifornien (1990) 60-89). Die Zielgenexpression aus dem pTrc-Vektor beruht auf der Transkription durch Wirts-RNA-Polymerase von einem Hybrid-trp-lac-Fusionspromotor. Die Zielgenexpression aus dem pET 11d-Vektor beruht auf der Transkription von einem T7-gn10-lac-Fusions-Promotor, die von einer coexprimierten viralen RNA-Polymerase (T7 gn1) vermittelt wird. Diese virale Polymerase wird von den Wirtsstämmen BL 21 (DE3) oder HMS174

## 33

(DE3) von einem residenten  $\lambda$ -Prophagen geliefert, der ein T7 gnl-Gen unter der Transkriptionskontrolle des lacUV 5-Promotors birgt.

- 5 Eine Strategie zur Maximierung der Expression des rekombinanten Proteins ist die Expression des Proteins in einem Wirtsbakterium, dessen Fähigkeit zur proteolytischen Spaltung des rekombinanten Proteins gestört ist (Gottesman, S. Gene Expression Technology: Methods in Enzymology 185, Academic Press, San Diego, Kalifornien  
10 (1990) 119-128). Eine weitere Strategie ist die Veränderung der Nukleinsäuresequenz der in einen Expressionsvektor zu inserierenden Nukleinsäure, so daß die einzelnen Codons für jede Aminosäure diejenigen sind, die vorzugsweise in einem zur Expression ausgewählten Bakterium, wie *C. glutamicum*, verwendet werden (Wada et  
15 al. (1992) Nucleic Acids Res. 20:2111-2118). Diese Veränderung der erfindungsgemäßen Nukleinsäuresequenzen kann durch Standard-DNA-Synthesetechniken erfolgen.

- Bei einer weiteren Ausführungsform ist der MCP-Protein-Expressionsvektor ein Hefe-Expressionsvektor. Beispiele für Vektoren zur Expression in der Hefe *S. cerevisiae* umfassen pYepSec1 (Baldari et al., (1987) Embo J. 6:229-234), pMFa (Kurjan und Herskowitz (1982) Cell 30:933-943), pJRY88 (Schultz et al. (1987) Gene 54:113-123) sowie pYES2 (Invitrogen Corporation, San Diego, CA).  
20 Vektoren und Verfahren zur Konstruktion von Vektoren, die sich zur Verwendung in anderen Pilzen, wie filamentösen Pilzen, eignen, umfassen diejenigen, die eingehend beschrieben sind in: van den Hondel, C.A.M.J.J. & Punt, P.J. (1991) "Gene transfer systems and vector development for filamentous fungi, in: Applied Molecular Genetics of Fungi, J.F. Peberdy et al., Hrsg., S. 1-28, Cambridge University Press: Cambridge.  
25 30

- Alternativ können die erfindungsgemäßen MCP-Proteine in Insektenzellen unter Verwendung von Baculovirus-Expressionsvektoren exprimiert werden. Baculovirus-Vektoren, die zur Expression von Proteinen in gezüchteten Insektenzellen (bspw. Sf9-Zellen) verfügbar sind, umfassen die pAc-Reihe (Smith et al., (1983) Mol. Cell Biol. 3:2156-2165) und die pVL-Reihe (Lucklow und Summers (1989) Virology 170:31-39).  
35 40

- In einer weiteren Ausführungsform können die erfindungsgemäßen MCP-Proteine in Zellen einzelliger Pflanzen (wie Algen) oder in Pflanzenzellen höherer Pflanzen (bspw. Spermatophyten, wie Feldfrüchte) exprimiert werden. Beispiele für Pflanzen-Expressionsvektoren umfassen solche, die eingehend beschrieben sind in: Becker, D., Kemper, E., Schell, J. und Masterson, R. (1992) "New plant binary vectors with selectable markers located proximal to  
45

the left border", Plant Mol. Biol. 20:1195-1197; und Bevan, M.W. (1984) "Binary Agrobacterium vectors for plant transformation", Nucl. Acids Res. 12:8711-8721.

- 5 In einer weiteren Ausführungsform wird eine erfindungsgemäße Nukleinsäure in Säugetierzellen mit einem Säugetier-Expressionsvektor exprimiert. Beispiele für Säugetier-Expressionsvektoren umfassen pCDM8 (Seed, B. (1987) Nature 329:840) und pMT2PC (Kaufman et al. (1987) EMBO J. 6:187-195). Bei der Verwendung in Säugetierzellen werden die Kontrollfunktionen des Expressionsvektors oft von viralen regulatorischen Elementen bereitgestellt. Gemeinhin verwendete Promotoren stammen bspw. aus Polyoma, Adenovirus 2, Cytomegalievirus und Simian Virus 40. Weitere geeignete Expressionssysteme für prokaryotische und eukaryotische Zellen
- 10 tierzellen werden die Kontrollfunktionen des Expressionsvektors oft von viralen regulatorischen Elementen bereitgestellt. Gemeinhin verwendete Promotoren stammen bspw. aus Polyoma, Adenovirus 2, Cytomegalievirus und Simian Virus 40. Weitere geeignete Expressionssysteme für prokaryotische und eukaryotische Zellen
- 15 siehe in Kapitel 16 und 17 von Sambrook, J., Fritsch, E.F. und Maniatis, T., Molecular cloning: A Laboratory Manual, 2. Auflage, Cold Spring Harbor Laboratory, Cold Spring Harbor Laboratory Press, Cold Spring Harbor, NY, 1989.
- Bei einer weiteren Ausführungsform kann der rekombinante Säugetier-Expressionsvektor die Expression der Nukleinsäure vorzugsweise in einem bestimmten Zelltyp bewirken (bspw. werden gewebespezifische regulatorische Elemente zur Expression der Nukleinsäure verwendet). Gewebespezifische regulatorische Elemente sind im Fachgebiet bekannt. Nicht-einschränkende Beispiele für geeignete gewebespezifische Promotoren umfassen den Albuminpromotor (leberspezifisch; Pinkert et al. (1987) Genes Dev. 1:268-277), lymphoid-spezifische Promotoren (Calame und Eaton (1988) Adv. Immunol. 43:235-275), insbesondere Promotoren von T-Zellrezeptoren (Winoto und Baltimore (1989) EMBO J. 8:729-733) und Immunglobulinen (Banerji et al. (1983) Cell 33:729-740; Queen und Baltimore (1983) Cell 33:741-748), neuronenspezifische Promotoren (bspw. der Neurofilament-Promotor; Byrne und Ruddle (1989) PNAS 86:5473-5477), pankreasspezifische Promotoren (Edlund et al., (1985) Science 230:912-916) und milchdrüsenspezifische Promotoren
- 35 (bspw. Milchserum-Promotor; US-Patent Nr. 4 873 316 und europäische Patentanmeldungsveröffentlichung Nr. 264 166). Entwicklungsregulierte Promotoren sind ebenfalls umfaßt, bspw. die Maus-hox-Promotoren (Kessel und Gruss (1990) Science 249:374-379) und der  $\alpha$ -Fetoprotein-Promotor (Campes und Tilghman (1989) Genes Dev. 3:537-546).
- 40 3:537-546).

- Die Erfindung stellt zudem einen rekombinanten Expressionsvektor bereit, umfassend ein erfindungsgemäßes DNA Molekül, das in Antisense-Richtung in den Expressionsvektor kloniert ist. D.h. daß
- 45 das DNA-Molekül derart mit einer regulatorischen Sequenz funktionsfähig verbunden ist, daß die Expression (durch Transkription des DNA-Moleküls) eines RNA-Moleküls, das zur MCP-mRNA antisense

## 35

- ist, möglich wird. Es können regulatorische Sequenzen ausgewählt werden, die funktionsfähig an eine in Antisense-Richtung klonierte Nukleinsäure gebunden sind und die kontinuierliche Expression des Antisense-RNA-Moleküls in einer Vielzahl von Zelltypen
- 5 steuern, bspw. können virale Promotoren und/oder Enhancer oder regulatorische Sequenzen ausgewählt werden, die die konstitutive, gewebespezifische oder zelltypspezifische Expression von Antisense-RNA steuern. Der Antisense-Expressionsvektor kann in Form eines rekombinanten Plasmids, Phagemids oder attenuierten Virus
- 10 vorliegen, in dem Antisense-Nukleinsäuren unter der Kontrolle eines hochwirksamen regulatorischen Bereichs produziert werden, dessen Aktivität durch den Zelltyp bestimmt wird, in den der Vektor eingebracht wird. Für eine Diskussion der Regulation der Genexpression mittels Antisense-Genen siehe Weintraub, H. et al.,
- 15 Antisense-RNA as a molecular tool for genetic analysis, Reviews - Trends in Genetics, Bd. 1(1) 1986.

- Ein weiterer Aspekt der Erfindung betrifft die Wirtszellen, in die ein erfindungsgemäßer rekombinanter Expressionsvektor einge-
- 20 bracht worden ist. Die Begriffe "Wirtszelle" und "rekombinante Wirtszelle" werden hier untereinander austauschbar verwendet. Es ist selbstverständlich, daß diese Begriffe nicht nur eine bestimmte Zielzelle, sondern auch die Nachkommen oder potentiellen Nachkommen dieser Zelle betreffen. Da in aufeinanderfolgenden Ge-
- 25 nerationen aufgrund von Mutation oder Umwelteinflüssen bestimmte Modifikationen auftreten können, sind diese Nachkommen nicht unbedingt mit der Parentalzelle identisch, sind jedoch im Umfang des Begriffs, wie er hier verwendet wird, noch umfaßt.
- 30 Eine Wirtszelle kann eine prokaryotische oder eukaryotische Zelle sein. Bspw. kann ein MCP-Protein in Bakterienzellen, wie *C. glutamicum*, Insektenzellen, Hefe- oder Säugetierzellen (wie Ovarzellen des chinesischen Hamsters (CHO) oder COS-Zellen) exprimiert werden. Andere geeignete Wirtszellen sind dem Fachmann geläufig.
- 35 Mikroorganismen, die mit *Corynebacterium glutamicum* verwandt sind und sich geeignet als Wirtszellen für die erfindungsgemäßen Nukleinsäure- und Proteinmoleküle verwenden lassen, sind in Tabelle 3 aufgeführt.
- 40 Durch herkömmliche Transformations- oder Transfektionsverfahren läßt sich Vektor-DNA in prokaryotische oder eukaryotische Zellen einbringen. Die Begriffe "Transformation" und "Transfektion", "Konjugation" und "Transduktion", wie sie hier verwendet werden, sollen eine Vielzahl von im Stand der Technik bekannten Verfahren
- 45 zum Einbringen fremder Nukleinsäure (bspw. DNA) in eine Wirtszelle umfassen, einschließlich natürlicher Kompetenz, chemisch vermittelter Übertragung, Calciumphosphat- oder Calciumchlorid-

## 36

Copräzipitation, DEAE-Dextran-vermittelter Transfektion, Lipofektion oder Elektroporation. Geeignete Verfahren zur Transformation oder Transfektion von Wirtszellen lassen sich nachlesen in Sambrook et al. (Molecular Cloning: A Laboratory Manual. 2. Aufl., Cold Spring Harbor Laboratory, Cold Spring Harbor Laboratory Press, Cold Spring Harbor, NY, 1989) und anderen Labor-Handbüchern.

Es ist bekannt, daß für die stabile Transfektion von Säugetierzellen je nach dem verwendeten Expressionsvektor und der verwendeten Transfektionstechnik nur ein kleiner Teil der Zellen die fremde DNA in ihr Genom integrieren kann. Zur Identifizierung und Selektion dieser Integranten wird gewöhnlich ein Gen, das einen selektierbaren Marker (z.B. Resistenz gegen Antibiotika) codiert, zusammen mit dem Gen von Interesse in die Wirtszellen eingebracht. Bevorzugte selektierbare Marker umfassen solche, die die Resistenz gegen Medikamente, wie G418, Hygromycin und Methotrexat, verleihen. Eine Nukleinsäure, die einen selektierbaren Marker codiert, kann in eine Wirtszelle auf dem gleichen Vektor eingebracht werden, wie derjenige, der ein MCP-Protein codiert, oder kann auf einem gesonderten Vektor eingebracht werden. Zellen, die mit der eingebrachten Nukleinsäure stabil transfiziert worden sind, können bspw. durch Medikamentenselektion identifiziert werden (z.B. überleben Zellen, die den selektierbaren Marker integrieren, wohingegen die anderen Zellen sterben).

Zur Erzeugung eines homolog rekombinierten Mikroorganismus wird ein Vektor hergestellt, der zumindest einen Abschnitt eines MCP-Gens enthält, in den eine Deletion, Addition oder Substitution eingebracht worden ist, um das MCP-Gen zu verändern, bspw. funktionell zu disruptieren. Dieses MCP-Gen ist vorzugsweise ein *Corynebacterium glutamicum*-MCP-Gen, jedoch kann ein Homologon von einem verwandten Bakterium oder sogar aus einer Säugetier-, Hefe- oder Insektenquelle verwendet werden. Bei einer bevorzugten Ausführungsform ist der Vektor derart ausgestaltet, daß das endogene MCP-Gen bei homologer Rekombination funktionell disruptiert ist (d.h. nicht länger ein funktionelles Protein codiert; auch als "Knockout"-Vektor bezeichnet). Der Vektor kann alternativ derart ausgestaltet sein, daß das endogene MCP-Gen bei homologer Rekombination mutiert oder anderweitig verändert ist, jedoch noch das funktionelle Protein codiert (z.B. kann der stromaufwärts gelegene regulatorische Bereich derart verändert sein, daß dadurch die Expression des endogenen MCP-Proteins verändert wird.). Der veränderte Abschnitt des MCP-Gens ist im homologen Rekombinationsvektor an seinem 5'- und 3'-Ende von zusätzlicher Nukleinsäure des MCP-Gens flankiert, die eine homologe Rekombination zwischen dem exogenen MCP-Gen, das von dem Vektor getragen wird, und einem



## 37

endogenen MCP-Gen in einem Mikroorganismus ermöglicht. Die zusätzliche flankierende MCP-Nukleinsäure ist für eine erfolgreiche homologe Rekombination mit dem endogenen Gen hinreichend lang. Gewöhnlich enthält der Vektor weniger als eine Kilobase flankierende DNA (sowohl am 5'- als auch am 3'-Ende) (siehe z.B. Thomas, K.R. und Capecchi, M.R. (1987) Cell 51:503 für eine Beschreibung von homologen Rekombinationsvektoren). Der Vektor wird in einen Mikroorganismus (z.B. durch Elektroporation) eingebracht, und Zellen, in denen das eingebrachte MCP-Gen mit dem endogenen MCP-Gen homolog rekombiniert ist, werden unter Verwendung im Fachgebiet bekannter Verfahren selektiert.

Bei einer anderen Ausführungsform können rekombinante Mikroorganismen produziert werden, die ausgewählte Systeme enthalten, die eine regulierte Expression des eingebrachten Gens ermöglichen. Der Einschluß eines MCP-Gens in einen Vektor, wodurch es unter die Kontrolle des Lac-Operons gebracht wird, ermöglicht z.B. die Expression des MCP-Gens nur in Gegenwart von IPTG. Diese regulatorischen Systeme sind im Fachgebiet bekannt.

Eine erfindungsgemäße Wirtszelle, wie eine prokaryotische oder eukaryotische Wirtszelle in Kultur, kann zur Produktion (d.h. Expression) eines MCP-Proteins verwendet werden. Die Erfindung stellt zudem Verfahren zur Produktion von MCP-Proteinen unter Verwendung der erfindungsgemäßen Wirtszellen bereit. Bei einer Ausführungsform umfaßt das Verfahren die Anzucht der erfindungsgemäßen Wirtszelle (in die ein rekombinanter Expressionsvektor, der ein MCP-Protein codiert, eingebracht worden ist, oder in deren Genom ein Gen eingebracht worden ist, das ein Wildtyp- oder verändertes MCP-Protein codiert) in einem geeigneten Medium, bis das MCP-Protein produziert worden ist. Das Verfahren umfaßt in einer weiteren Ausführungsform das Isolieren der MCP-Proteine aus dem Medium oder der Wirtszelle.

### 35 C. *Isolierte MCP-Proteine*

Ein weiterer Aspekt der Erfindung betrifft isolierte MCP-Proteine und biologisch aktive Abschnitte davon. Ein "isoliertes" oder "gereinigtes" Protein oder biologisch aktiver Abschnitt davon ist im wesentlichen frei von zellulärem Material, wenn es durch DNA-Rekombinationstechniken produziert wird, oder von chemischen Vorstufen oder andern Chemikalien, wenn es chemisch synthetisiert wird. Der Begriff "im wesentlichen frei von zellulärem Material" umfaßt MCP-Proteinpräparationen, in denen das Protein von zellulären Komponenten der Zellen, in denen es natürlich oder rekombinant produziert wird, abgetrennt ist. Bei einer Ausführungsform umfaßt der Ausdruck "im wesentlichen frei von zellulärem Mate-

- rial" MCP-Proteinpräparationen mit weniger als etwa 30% (bezogen auf das Trockengewicht) Nicht-MCP-Protein (hier auch als "kontaminierendes Protein" bezeichnet), stärker bevorzugt weniger als etwa 20%, noch stärker bevorzugt weniger als etwa 10% und am stärksten bevorzugt weniger als etwa 5% Nicht-MCP-Protein. Das MCP-Protein oder ein biologisch aktiver Abschnitt davon enthält nach rekombinanter Produktion ebenfalls vorzugsweise im wesentlichen kein Kulturmedium, d.h. das Kulturmedium macht weniger als etwa 20%, stärker bevorzugt weniger als etwa 10% und am stärksten bevorzugt weniger als etwa 5% des Volumens der Proteinpräparation aus. Der Begriff "im wesentlichen frei von chemischen Vorstufen oder anderen Chemikalien" umfaßt MCP-Proteinpräparationen, in denen das Protein von chemischen Vorstufen oder anderen Chemikalien abgetrennt ist, die an der Synthese des Proteins beteiligt sind.
- 15 Bei einer Ausführungsform umfaßt der Begriff "im wesentlichen frei von chemischen Vorstufen oder anderen Chemikalien" MCP-Proteinpräparationen mit weniger als etwa 30% (bezogen auf das Trockengewicht), stärker bevorzugt weniger als etwa 20%, noch stärker bevorzugt weniger als etwa 10% und am stärksten bevorzugt weniger als etwa 5% chemische Vorstufen oder Nicht-MCP-Chemikalien. In bevorzugten Ausführungsformen weisen die isolierten Proteine oder biologisch aktiven Abschnitte davon keine kontaminierenden Proteine aus dem gleichen Organismus auf, aus dem das MCP-Protein stammt. Diese Proteine werden gewöhnlich durch rekombinante Expression, bspw. eines *C. glutamicum*-MCP-Proteins, in einem Mikroorganismus, wie *C. glutamicum*, hergestellt.

- Ein erfindungsgemäßes isoliertes MCP-Protein oder ein Abschnitt davon kann die Ausbeute, Produktion und/oder Effizienz der Produktion einer oder mehrerer Feinchemikalien in *C. glutamicum* modulieren, Kohlenwasserstoffe abbauen, Terpenoide oxidieren, als Ziel für Arzneimittelentwicklung dienen oder als Identifikationsmarker für *C. glutamicum* oder verwandte Organismen dienen. In bevorzugten Ausführungsformen umfaßt das Protein oder ein Abschnitt davon eine Aminosäuresequenz, die zu einer Aminosäuresequenz aus Anhang B hinreichend homolog ist, daß das Protein oder der Abschnitt davon die Fähigkeit, die Ausbeute, Produktion und/oder Effizienz der Produktion einer oder mehrerer Feinchemikalien in *C. glutamicum* zu modulieren, Kohlenwasserstoffe abzubauen, Terpenoide zu oxidieren, als Ziel für Arzneimittelentwicklung zu dienen oder als Identifikationsmarker für *C. glutamicum* oder verwandte Organismen zu dienen, beibehält. Der Abschnitt des Proteins ist vorzugsweise ein biologisch aktiver Abschnitt, wie hier beschrieben. Bei einer weiteren bevorzugten Ausführungsform hat ein erfindungsgemäßes MCP-Protein eine der in Anhang B gezeigten Aminosäuresequenzen. In einer weiteren bevorzugten Ausführungsform hat das MCP-Protein eine Aminosäuresequenz, die von einer

## 39

Nukleotidsequenz codiert wird, die, bspw. unter stringenten Bedingungen, an eine Nukleotidsequenz aus Anhang A hybridisiert. In noch einer weiteren bevorzugten Ausführungsform hat das MCP-Protein eine Aminosäuresequenz, die von einer Nukleotidsequenz codiert wird und die mindestens etwa 50-60%, vorzugsweise mindestens etwa 60-70%, stärker bevorzugt mindestens etwa 70-80%, 80-90%, 90-95% und noch stärker bevorzugt mindestens etwa 96%, 97%, 98%, 99% oder noch homologer zu einer der Aminosäuresequenzen von Anhang B ist. Die bevorzugten erfindungsgemäßen MCP-Proteine besitzen vorzugsweise ebenfalls mindestens eine der hier beschriebenen MCP-Aktivitäten. Ein bevorzugtes erfindungsgemäßes MCP-Protein umfaßt zum Beispiel eine Aminosäuresequenz, die von einer Nukleotidsequenz codiert wird, die, bspw. unter stringenten Bedingungen, mit einer Nukleotidsequenz von Anhang A hybridisiert, und die die Ausbeute, Produktion und/oder Effizienz der Produktion einer oder mehrerer Feinchemikalien in *C. glutamicum* modulieren, Kohlenwasserstoffe abbauen, Terpenoide oxidieren, als Ziel für Arzneimittelentwicklung dienen oder als Identifikationsmarker für *C. glutamicum* oder verwandte Organismen dienen kann.

Bei weiteren Ausführungsformen ist das MCP-Protein im wesentlichen homolog zu einer Aminosäuresequenz von Anhang B und behält die funktionelle Aktivität des Proteins mit einer der Sequenzen aus Anhang B und unterscheidet sich dennoch in der Aminosäuresequenz aufgrund von natürlicher Variation oder Mutagenese, wie in Unterabschnitt I oben eingehend beschrieben. In einer weiteren Ausführungsform umfaßt das MCP-Protein folglich eine Aminosäuresequenz, die mindestens etwa 50-60%, vorzugsweise mindestens etwa 60-70%, stärker bevorzugt mindestens etwa 70-80%, 80-90%, 90-95% und am stärksten bevorzugt mindestens etwa 96%, 97%, 98%, 99% oder noch homologer zu einer vollständigen Aminosäuresequenz aus Anhang B ist und die zumindest eine der hier beschriebenen MCP-Aktivitäten aufweist. Bei einer anderen Ausführungsform betrifft die Erfindung ein *C. glutamicum*-Vollängenprotein, das im wesentlichen homolog zu einer vollständigen Aminosäuresequenz aus Anhang B ist.

Biologisch aktive Abschnitte eines MCP-Proteins umfassen Peptide mit Aminosäuresequenzen, die von der Aminosäuresequenz eines MCP-Proteins hergeleitet sind, bspw. eine in Anhang B gezeigte Aminosäuresequenz oder die Aminosäuresequenz eines Proteins, das zu einem MCP-Protein homolog ist, die weniger Aminosäuren als das Vollängen-MCP-Protein oder das Vollängenprotein aufweisen, das zu einem MCP-Protein homolog ist, und zumindest eine Aktivität eines MCP-Proteins aufweisen. Gewöhnlich umfassen biologisch aktive Abschnitte (Peptide, bspw. Peptide, die bspw 5, 10, 15, 20, 30, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 50, 100 oder mehr Aminosäuren lang sind) eine

## 40

Domäne oder ein Motiv mit mindestens einer Aktivität eines MCP-Proteins. Überdies können andere biologisch aktive Abschnitte, in denen andere Bereiche des Proteins deletiert sind, durch rekombinante Techniken hergestellt werden und bezüglich einer oder mehrerer der hier beschriebenen Aktivitäten untersucht werden. Die biologisch aktiven Abschnitte eines MCP-Proteins umfassen vorzugsweise ein oder mehrere ausgewählte Domänen/Motive oder Abschnitte davon mit biologischer Aktivität.

- 10 MCP-Proteine werden vorzugsweise durch DNA-Rekombinationstechniken hergestellt. Bspw. wird ein Nukleinsäuremolekül, das das Protein codiert, in einen Expressionsvektor (wie vorstehend beschrieben) kloniert, der Expressionsvektor wird in eine Wirtszelle (wie vorstehend beschrieben) eingebracht, und das MCP-Protein wird in der Wirtszelle exprimiert. Das MCP-Protein kann dann durch ein geeignetes Reinigungsschema mittels Standard-Protein-Reinigungstechniken aus den Zellen isoliert werden. Alternativ zur rekombinanten Expression kann ein MCP-Protein, -Polypeptid, oder -Peptid mittels Standard-Peptidsynthesetechniken chemisch synthetisiert werden. Überdies kann natives MCP-Protein aus Zellen (bspw. Endothelzellen, Bakterienzellen, Pilzzellen oder anderen Zellen), z.B. mit einem Anti-MCP-Antikörper, isoliert werden, der durch Standardtechniken produziert werden kann, wobei ein erfindungsgemäßes MCP-Protein oder ein Fragment davon verwendet wird.

- Die Erfindung stellt auch chimäre MCP-Proteine oder MCP-Fusionsproteine bereit. Wie hier verwendet, umfaßt ein "chimäres MCP-Protein" oder "MCP-Fusionsprotein" ein MCP-Polypeptid, das funktionsfähig an ein Nicht-MCP-Polypeptid gebunden ist. Ein "MCP-Polypeptid" betrifft ein Polypeptid mit einer Aminosäuresequenz, die einem MCP-Protein entspricht, wohingegen ein "Nicht-MCP-Polypeptid" ein Polypeptid mit einer Aminosäuresequenz betrifft, die einem Protein entspricht, das nicht im wesentlichen homolog zum MCP-Protein ist, z.B. ein Protein, das sich vom MCP-Protein unterscheidet und vom gleichen oder einem anderen Organismus herrührt. Innerhalb des Fusionsproteins soll der Begriff "funktionsfähig verbunden" bedeuten, daß das MCP-Polypeptid und das Nicht-MCP-Polypeptid im Leseraster miteinander fusioniert sind. Das Nicht-MCP-Polypeptid kann an den N- oder C-Terminus des MCP-Polypeptides gebunden sein. Bei einer Ausführungsform ist das Fusionsprotein bspw. ein GST-MCP-Fusionsprotein, bei dem die MCP-Sequenzen an den C-Terminus der GST-Sequenzen gebunden sind. Diese Fusionsproteine können die Reinigung des rekombinanten MCP-Proteins erleichtern. Bei einer weiteren Ausführungsform ist das Fusionsprotein ein MCP-Protein, das eine heterologe Signalsequenz an seinem N-Terminus aufweist. In bestimmten Wirtszellen (z.B.

## 41

Säugetier-Wirtszellen) kann die Expression und/oder Sekretion eines MCP-Proteins durch Verwendung einer heterologen Signalsequenz gesteigert werden.

- 5 Ein erfindungsgemäßes chimäres MCP-Protein oder MCP-Fusionsprotein wird durch Standard-DNA-Rekombinationstechniken produziert. DNA-Fragmente, die unterschiedliche Polypeptidsequenzen codieren, werden gemäß herkömmlicher Techniken im Leseraster aneinander ligiert, bspw. durch Einsatz glatter oder überhängender Enden zur
- 10 Ligation, Restriktionsenzymspaltung zur Bereitstellung geeigneter Enden, Auffüllen kohäsiver Enden, falls erforderlich, Behandlung mit alkalischer Phosphatase, um ungewollte Verknüpfungen zu vermeiden, und enzymatische Ligierung. Bei einer weiteren Ausführungsform kann das Fusionsgen durch herkömmliche Techniken, ein-
- 15 schließlich DNA-Syntheseautomaten, synthetisiert werden. Alternativ kann eine PCR-Amplifizierung von Genfragmenten mittels Ankerprimern durchgeführt werden, die komplementäre Überhänge zwischen aufeinanderfolgenden Genfragmenten erzeugen. Diese können anschließend miteinander hybridisiert und reamplifiziert werden, so
- 20 daß eine chimäre Gensequenz erzeugt wird (s. bspw. Current Protocols in Molecular Biology, Ausubel et al., Hrsg., John Wiley & Sons: 1992). Überdies sind viele Expressionsvektoren kommerziell erhältlich, die schon eine Fusionseinheit codieren (bspw. ein GST-Polypeptid). Eine MCP-codierende Nukleinsäure kann in einen
- 25 solchen Expressionsvektor kloniert werden, so daß die Fusionseinheit mit dem MCP-Protein im Leseraster verbunden ist.

Homologa des MCP-Proteins können durch Mutagenese erzeugt werden, z.B. durch bestimmte Punktmutation oder Verkürzung des MCP-Pro-

- 30 teins. Der Begriff "Homologon", wie er hier verwendet wird, betrifft eine variante Form des MCP-Proteins, die als Agonist oder Antagonist der MCP-Protein-Aktivität wirkt. Ein Agonist des MCP-Proteins kann im wesentlichen die gleiche oder einen Teil der biologischen Aktivitäten des MCP-Proteins beibehalten. Ein Anta-
  - 35 gonist des MCP-Proteins kann eine oder mehrere Aktivitäten der natürlich vorkommenden Form des MCP-Proteins bspw. durch kompetitive Bindung an ein stromabwärts oder -aufwärts gelegenes Element eines biochemischen Wegs, der das MCP-Protein enthält, hemmen.
- 40 Bei einer alternativen Ausführungsform können Homologa des MCP-Proteins durch Screening kombinatorischer Banken von Mutanten, bspw. Verkürzungsmutanten, des MCP-Proteins bezüglich MCP-Protein-Agonisten- oder -Antagonisten-Aktivität identifiziert werden. Bei einer Ausführungsform wird eine variierte Bank von
  - 45 MCP-Varianten durch kombinatorische Mutagenese auf Nukleinsäureebene erzeugt und von der variierten Genbank codiert. Eine variierte Bank von MCP-Varianten kann bspw durch enzymatisches

## 42

- Ligieren eines Gemisches synthetischer Oligonukleotide in Gensequenzen hergestellt werden, so daß sich ein degenerierter Satz potentieller MCP-Sequenzen als individuelle Polypeptide oder alternativ als Satz größerer Fusionsproteine (z.B. Für Phagen-Display), die diesen Satz von MCP-Sequenzen enthalten, exprimieren läßt. Es gibt eine Vielzahl von Verfahren, die zur Herstellung von Banken potentieller MCP-Homologa aus einer degenerierten Oligonukleotidsequenz verwendet werden können. Die chemische Synthese einer degenerierten Gensequenz kann in einem DNA-Syntheseroboter durchgeföhrt werden, und das synthetische Gen kann dann in einen geeigneten Expressionsvektor ligiert werden. Die Verwendung eines degenerierten Gensatzes ermöglicht die Bereitstellung sämtlicher Sequenzen in einem Gemisch, die den gewünschten Satz an potentiellen MCP-Sequenzen codieren. Verfahren zur Synthese degenerierter Oligonukleotide sind im Fachgebiet bekannt (s. bspw. Narang, S.A. (1983) Tetrahedron 39:3; Itakura et al. (1984) Annu. Rev. Biochem. 53:323; Itakura et al., (1984) Science 198:1056; Ike et al. (1983) Nucleic Acids Res. 11:477).
- Zusätzlich können Banken von Fragmenten der MCP-Protein-Codierung verwendet werden, um eine variierte Population von MCP-Fragmenten zum Screening und zur anschließenden Selektion von Homologa eines MCP-Proteins zu erzeugen. Bei einer Ausführungsform kann eine Bank von codierenden Sequenzfragmenten durch Behandeln eines doppelsträngigen PCR-Fragmentes einer codierenden MCP-Sequenz mit einer Nuklease unter Bedingungen, unter denen ein Nicking nur etwa einmal pro Molekül erfolgt, Denaturieren der doppelsträngigen DNA, Renaturieren der DNA unter Bildung doppelsträngiger DNA, die Sense-/Antisense-Paare von verschiedenen genickten Produkten umfassen kann, Entfernen einzelsträngiger Abschnitte aus neu gebildeten Duplices durch Behandlung mit S1-Nuklease und Ligieren der resultierenden Fragmentbank in einen Expressionsvektor erzeugt werden. Durch dieses Verfahren kann eine Expressionsbank hergeleitet werden, die N-terminale, C-terminale und interne Fragmente mit verschiedenen Größen des MCP-Proteins codiert.

- Im Fachgebiet sind mehrere Techniken zum Screening von Genprodukten kombinatorischer Banken, die durch Punktmutationen oder Verkürzung hergestellt worden sind, und zum Screening von cDNA-Banken hinsichtlich Genprodukten mit einer ausgewählten Eigenschaft bekannt. Diese Techniken lassen sich an das schnelle Screening der Genbanken anpassen, die durch kombinatorische Mutagenese von MCP-Homologa erzeugt worden sind. Die am häufigsten verwendeten Techniken zum Screening großer Genbanken, die einer Analyse mit hohem Durchsatz unterliegen, umfassen das Klonieren der Genbank in replizierbare Expressionsvektoren, Transformieren geeigneter Zellen mit der resultierenden Vektorenbank und Exprimieren der

kombinatorischen Gene unter Bedingungen, unter denen der Nachweis der gewünschten Aktivität die Isolation des Vektors, der das Gen codiert, dessen Produkt nachgewiesen wurde, erleichtert. Recursive-Ensemble-Mutagenese (REM), eine neue Technik, die die Häufigkeit funktioneller Mutanten in den Banken vergrößert, kann in Kombination mit den Screeningtests verwendet werden, um MCP-Homologa zu identifizieren (Arkin und Yourvan (1992) PNAS 89:7811-7815; Delgrave et al. (1993) Protein Engineering 6(3):327-331).

10

Bei einer weiteren Ausführungsform können Tests auf Zellenbasis zur Analyse einer variierten MCP-Bank unter Verwendung von im Fachgebiet bekannten Verfahren verwendet werden.

#### 15 D. Erfindungsgemäße Verwendungen und Verfahren

Die hier beschriebenen Nukleinsäuremoleküle, Proteine, Proteinhomologa, Fusionsproteine, Primer, Vektoren und Wirtszellen können in einem oder mehreren nachstehenden Verfahren verwendet werden:

- 20 Identifikation von *C. glutamicum* und verwandten Organismen, Kartierung von Genomen von Organismen, die mit *C. glutamicum* verwandt sind, Identifikation und Lokalisation von *C. glutamicum*-Sequenzen von Interesse, Evolutionsstudien, Bestimmung von MCP-Proteinbereichen, die für die Funktion notwendig sind, Modulation
- 25 der Aktivität eines MCP-Proteins; Modulation der Aktivität eines oder mehrerer Stoffwechselwege und Modulation der zellulären Produktion einer gewünschten Verbindung, wie einer Feinchemikalie. Die erfindungsgemäßen MCP-Nukleinsäuremoleküle haben eine Vielzahl von Verwendungen. Sie können zunächst zur Identifikation ei-
- 30 nes Organismus als *Corynebacterium glutamicum* oder naher Verwandter davon verwendet werden. Sie können zudem zur Identifikation des Vorliegens von *C. glutamicum* oder eines Verwandten davon in einer Mischpopulation von Mikroorganismen verwendet werden. Die Erfindung stellt die Nukleinsäuresequenzen einer Reihe von *C.*
- 35 *glutamicum*-Genen bereit. Durch Sondieren der extrahierten genomischen DNA einer Kultur einer einheitlichen oder gemischten Population von Mikroorganismen unter stringenten Bedingungen mit einer Sonde, die einen Bereich eines *C. glutamicum*-Gens überspannt, das für diesen Organismus einzigartig ist, kann man bestimmen, ob
- 40 dieser Organismus zugegen ist. *Corynebacterium glutamicum* selbst ist zwar nicht pathogen, jedoch ist es mit pathogenen Arten, wie *Corynebacterium diphtheriae*, verwandt. Der Nachweis eines solchen Organismus ist von signifikanter klinischer Bedeutung.
- 45 Zum Nachweis des Vorliegens von *C. glutamicum* in einer Probe können im Fachgebiet bekannte Techniken eingesetzt werden. Insbesondere können die Zellen in der Probe zunächst in einer geeigneten

Flüssigkeit oder auf einem geeigneten festen Kulturmedium gezüchtet werden, um die Anzahl der Zellen in der Kultur zu vergrößern. Diese Zellen werden lysiert, und die gesamte enthaltene DNA wird extrahiert und gegebenenfalls gereinigt, um Zelltrümmer und Proteinmaterial zu entfernen, die die anschließende Analyse stören könnten. Polymerasekettenreaktion oder eine ähnliche, im Fachgebiet bekannte Technik wird durchgeführt (s. einen allgemeinen Überblick über Methodologien, die gewöhnlich zur Nukleinsäuresequenz-Amplifikation verwendet werden in Mullis et al., U.S.-Patent Nr. 4683195, Mullis et al., U.S.-Patent Nr. 4965188 und Innis, M.A., und Gelfand, D.H. (1989) PCR-Protocols, A guide to Methods and Applications, Academic Press, S. 3-12, und (1988) Biotechnology 6:1197, und Internationale Patentanmeldung Nr. WO89/01050), wobei Primer, die für ein erfindungsgemäßes MCP-Nukleinsäuremolekül spezifisch sind, mit der Nukleinsäureprobe inkubiert werden, so daß diese bestimmte MCP-Nukleinsäuresequenz, falls in der Probe vorhanden, amplifiziert wird. Die bestimmte, zu amplifizierende Nukleinsäuresequenz wird auf der Basis ihres ausschließlichen Vorkommens im Genom von *C. glutamicum* und nur einiger nah verwandter Bakterien ausgewählt. Das Vorliegen des gewünschten Amplifikationsproduktes zeigt das Vorliegen von *C. glutamicum* oder eines mit *C. glutamicum* nah verwandten Organismus an.

- 25 Die erfindungsgemäßen Nukleinsäure- und Proteinmoleküle können ferner als Marker für spezifische Bereiche des Genoms dienen. Unter Verwendung von im Fachgebiet bekannten Techniken ist es möglich, die physikalische Lokalisierung der erfindungsgemäßen MCP-Nukleinsäuremoleküle auf dem *C. glutamicum*-Genom nachzuweisen,
- 30 was wiederum zur leichteren Lokalisierung anderer Nukleinsäuremoleküle und Gene auf der Karte verwendet werden kann. Die erfindungsgemäßen Nukleinsäuremoleküle können zudem hinreichend homolog zu den Sequenzen verwandter Arten sein, so daß diese Nukleinsäuremoleküle ebenfalls die Konstruktion einer genomischen Karte
- 35 in solchen Bakterien ( z.B. *Brevibacterium lactofermentum*) ermöglichen können.

- Die erfindungsgemäßen Nukleinsäure- und Proteinmoleküle eignen sich nicht nur zum Kartieren des Genoms, sondern auch für funktionelle Studien von *C. glutamicum*-Proteinen. Zur Identifikation des Genombereichs, an den ein bestimmtes *C. glutamicum*-DNA-bindendes Protein bindet, kann das *C. glutamicum*-Genom bspw. gespalten und die Fragmente mit dem DNA-bindenden Protein inkubiert werden. Diejenigen, die das Protein binden, können zusätzlich mit
- 40 den erfindungsgemäßen Nukleinsäuremolekülen, vorzugsweise mit leicht nachweisbaren Markierungen, sondiert werden; die Bindung eines solchen Nukleinsäuremoleküls an das Genomfragment ermög-



## 45

licht die Lokalisation des Fragmentes auf der genomischen Karte von *C. glutamicum*, und wenn dies mehrmals mit unterschiedlichen Enzymen durchgeführt wird, erleichtert es eine rasche Bestimmung der Nukleinsäuresequenz, an die das Protein bindet.

5

- Die erfindungsgemäßen MCP-Nukleinsäuremoleküle eignen sich ebenfalls für Evolutions- und Proteinstruktur-Untersuchungen. Die Stoffwechselprozesse, an denen die erfindungsgemäßen Moleküle beteiligt sind, werden von einer Vielzahl von prokaryotischen und eukaryotischen Zellen ausgenutzt; durch Vergleich der Sequenzen der erfindungsgemäßen Nukleinsäuremoleküle mit solchen, die ähnliche Enzyme aus anderen Organismen codieren, kann der Evolutions-Verwandschaftsgrad der Organismen bestimmt werden. Entsprechend ermöglicht ein solcher Vergleich die Bestimmung, welche Sequenzbereiche konserviert sind und welche nicht, was bei der Bestimmung solcher Bereiche des Proteins hilfreich sein kann, die für die Enzymfunktion essentiell sind. Dieser Typ der Bestimmung ist für Proteintechnologie-Untersuchungen wertvoll und kann einen Hinweis darauf geben, wieviel Mutagenese das Protein tolerieren kann ohne die Funktion zu verlieren.

- Die erfindungsgemäßen MCP-Proteine lassen sich als Marker zur Klassifizierung eines unbekannten Bakteriums als *C. glutamicum* oder zur Identifikation von *C. glutamicum* oder nahe verwandten Bakterien in einer Probe verwenden. Unter Verwendung von im Fachgebiet bekannten Techniken können bspw. Zellen in einer Probe gegebenenfalls amplifiziert werden (z.B. durch Züchten in einem geeigneten Medium), um die Probengröße zu erhöhen, und können dann lysiert werden, so daß die darin enthaltenen Proteine freigesetzt werden. Diese Probe kann gegebenenfalls gereinigt werden, um Zelltrümmer und Nukleinsäuremoleküle zu entfernen, die die anschließende Analyse stören könnten. Antikörper, die für ein ausgewähltes erfindungsgemäßes MCP-Protein spezifisch sind, können mit der Proteinprobe in einem typischen Western-Test-Format inkubiert werden (s. z.B. Ausubel et al., (1988) Current Protocols in Molecular Biology, Wiley: New York), wobei der Antikörper an sein Zielprotein bindet, wenn dieses Protein in der Probe vorliegt. Ein MCP-Protein wird für diesen Testtyp ausgewählt, wenn es für *C. glutamicum* oder *C. glutamicum* und sehr nahe verwandte Bakterien einzigartig oder fast einzigartig ist. Die Proteine in der Probe werden dann durch Gelelektrophorese aufgetrennt und auf eine geeignete Matrix, wie Nitrocellulose übertragen. Ein geeigneter Zweitantikörper mit einer nachweisbaren Markierung (z.B. chemilumineszierend oder colorimetrisch) wird mit der Matrix inkubiert, gefolgt von stringentem Waschen. Das Vorliegen oder Fehlen der Markierung zeigt das Vorliegen oder Fehlen des Zielproteins in der Probe an. Ist das Protein zugegen, zeigt dies das

## 46

Vorliegen von *C. glutamicum* an. Ein ähnliches Verfahren ermöglicht die Klassifizierung eines unbekannten Bakteriums als *C. glutamicum*; wenn eine Reihe für *C. glutamicum* spezifischer Proteine nicht in den Proteinproben nachgewiesen wird, die von dem  
5 unbekannten Bakterium präpariert wurden, ist dieses Bakterium wahrscheinlich nicht *C. glutamicum*.

Die genetische Manipulation der erfindungsgemäßen MCP-Nukleinsäuremoleküle kann die Produktion von MCP-Proteinen mit funktionellen  
10 Unterschieden zu den Wildtyp-MCP-Proteinen bewirken. Diese Proteine können hinsichtlich ihrer Effizienz oder Aktivität verbessert werden, können in größerer Anzahl als gewöhnlich in der Zelle zugegen sein oder können hinsichtlich ihrer Effizienz oder Aktivität geschwächt sein.

15

Diese Änderungen der Aktivität können direkt die Ausbeute, Produktion und/oder Effizienz der Produktion einer oder mehrerer Feinchemikalien in *C. glutamicum* modulieren. Beispielsweise kann man durch Modifikation der Aktivität eines Proteins, das an der  
20 Biosynthese oder am Abbau einer Feinchemikalie beteiligt ist, (d.h. durch Mutagenese des entsprechenden Gens) die Fähigkeit der Zelle, diese Verbindung zu synthetisieren oder abzubauen, direkt modulieren und dadurch die Ausbeute und/oder Effizienz der Produktion der Feinchemikalie modulieren. Ebenso kann man durch Mo-  
25 dulation der Aktivität eines Proteins, das einen Feinchemikalien-Stoffwechselweg reguliert, direkt beeinflussen, ob die Produktion der gewünschten Verbindung hoch- oder herunterreguliert wird, was beides die Ausbeute oder Effizienz der Produktion der Feinchemikalie von der Zelle moduliert.

30

Die indirekte Modulation der Feinchemikalienproduktion kann auch durch Modifikation der Aktivität eines erfindungsgemäßen Proteins (d.h. durch Mutagenese des entsprechenden Gens) erfolgen, so daß die Fähigkeit der Zelle, zu wachsen und sich zu teilen oder le-  
35 bensfähig und produktiv zu bleiben, insgesamt erhöht ist. Die Produktion von Feinchemikalien aus *C. glutamicum* wird gewöhnlich durch Fermentationskultur im Großmaßstab dieser Mikroorganismen erzielt, Bedingungen, die für das Wachstum und die Zellteilung häufig suboptimal sind. Durch Verändern eines erfindungsgemäßen  
40 Proteins (z.B. eines Streßreaktionsproteins, eines Zellwandproteins oder von Proteinen, die am Stoffwechsel von Verbindungen beteiligt sind, die für das Auftreten von Zellwachstum und -teilung nötig sind, wie Nukleotide und Aminosäuren), so daß ein besseres Überleben, Wachsen und Vermehren in diesen Bedingungen mög-  
45 lich ist, kann es möglich sein, die Anzahl und die Produktivität dieser veränderten *C. glutamicum*-Zellen in Kultur im Großmaßstab zu steigern, was wiederum zu gesteigerten Ausbeuten und/oder zu

gesteigerter Effizienz der Produktion einer oder mehrerer gewünschter Feinchemikalien führen sollte. Ferner sind die Stoffwechselwege einer Zelle notwendigerweise voneinander abhängig und co-reguliert. Durch Ändern der Aktivität irgendeines Stoffwechselwegs in *C. glutamicum* (d.h. durch Ändern der Aktivität eines der erfindungsgemäßen Proteine, das an einem solchen Weg beteiligt ist) ist es möglich, gleichzeitig die Aktivität oder Regulation eines anderen Stoffwechselwegs in diesem Mikroorganismus zu ändern, der direkt an der Synthese oder am Abbau einer Feinchemikalie beteiligt sein kann.

Diese vorstehend genannten Mutagenesestrategien für MCP-Proteine, die erhöhte Ausbeuten einer Feinchemikalie aus *C. glutamicum* bewirken sollen, sollen nicht einschränkend sein; Variationen dieser Mutagenesestrategien sind dem Fachmann leicht ersichtlich. Unter Verwendung dieser Strategien und einschließlich der hier offenbarten Mechanismen können die erfindungsgemäßen Nukleinsäure- und Proteinmoleküle verwendet werden, um *C. glutamicum*- oder verwandte Bakterienstämme, die mutierte MCP-Nukleinsäure- und Proteinmoleküle exprimieren, zu erzeugen, so daß die Ausbeute, Produktion und/oder Effizienz der Produktion einer gewünschten Verbindung verbessert wird. Die gewünschte Verbindung kann jedes von *C. glutamicum* hergestellte Produkt sein, einschließlich der Endprodukte von Biosynthesewegen und Zwischenprodukte natürlich vorkommender metabolischer Wege sowie Moleküle, die im Metabolismus von *C. glutamicum* nicht natürlich vorkommen, die jedoch von einem erfindungsgemäßen *C. glutamicum*-Stamm produziert werden.

Diese Erfindung wird durch die nachstehenden Beispiele weiter veranschaulicht, die nicht als einschränkend aufgefaßt werden sollen. Die Inhalte sämtlicher, in dieser Patentanmeldung zitierter Literaturstellen, Patentanmeldungen, Patente und veröffentlichter Patentanmeldungen sind hiermit durch Bezugnahme aufgenommen.

#### Beispiele

Beispiel 1: Präparation der gesamten genomischen DNA aus *Corynebacterium glutamicum* ATCC13032

Eine Kultur von *Corynebacterium glutamicum* (ATCC 13032) wurde über Nacht bei 30°C unter starkem Schütteln in BHI-Medium (Difco) gezüchtet. Die Zellen wurden durch Zentrifugation geerntet, der Überstand wurde verworfen, und die Zellen wurden in 5ml Puffer I (5% des Ursprungsvolumens der Kultur - sämtliche angegebenen Volumina sind für 100 ml Kulturvolumen berechnet) resuspendiert.

## 48

- Zusammensetzung von Puffer I: 140,34 g/l Saccharose, 2,46 g/l  $\text{MgSO}_4 \cdot 7 \text{H}_2\text{O}$ , 10 ml/l  $\text{KH}_2\text{PO}_4$ -Lösung (100g/l, mit KOH auf pH-Wert 6,7 eingestellt), 50 ml/l M12-Konzentrat (10 g/l  $(\text{NH}_4)_2\text{SO}_4$ , 1 g/l NaCl, 2 g/l  $\text{MgSO}_4 \cdot 7 \text{H}_2\text{O}$ , 0,2 g/l  $\text{CaCl}_2$ , 0,5 g/l Hefe-Extrakt
- 5 (Difco), 10 ml/l Spurenelemente-Mischung (200 mg/l  $\text{FeSO}_4 \cdot \text{H}_2\text{O}$ , 10 mg/l  $\text{ZnSO}_4 \cdot 7 \text{H}_2\text{O}$ , 3 mg/l  $\text{MnCl}_2 \cdot 4 \text{H}_2\text{O}$ , 30 mg/l  $\text{H}_3\text{BO}_3$ , 20 mg/l  $\text{CoCl}_2 \cdot 6 \text{H}_2\text{O}$ , 1 mg/l  $\text{NiCl}_2 \cdot 6 \text{H}_2\text{O}$ , 3 mg/l  $\text{Na}_2\text{MoO}_4 \cdot 2 \text{H}_2\text{O}$ , 500 mg/l Komplexbildner (EDTA oder Citronensäure), 100 ml/l Vitamingemisch (0,2 ml/l Biotin, 0,2 mg/l Folsäure, 20 mg/l p-Aminobenzoessäure,
- 10 20 mg/l Riboflavin, 40 mg/l Ca-Panthothenat, 140 mg/l Nikotinsäure, 40 mg/l Pyridoxolhydrochlorid, 200 mg/l Myo-Inositol). Lysozym wurde in einer Endkonzentration von 2,5 mg/ml zur Suspension gegeben. Nach etwa 4 Std. Inkubation bei 37°C wurde die Zellwand abgebaut, und die erhaltenen Protoplasten wurden durch Zentrifugation geerntet. Das Pellet wurde einmal mit 5 ml Puffer I und einmal mit 5 ml TE-Puffer (10 mM Tris-HCl, 1 mM EDTA, pH-Wert 8) gewaschen. Das Pellet wurde in 4 ml TE-Puffer resuspendiert, und 0,5 ml SDS-Lösung (10%) und 0,5 ml NaCl-Lösung (5 M) wurden zugegeben. Nach Zugabe von Proteinase K in einer Endkonzentration
- 20 von 200 µg/ml wurde die Suspension etwa 18 Std. bei 37°C inkubiert. Die DNA wurde durch Extraktion mit Phenol, Phenol-Chloroform-Isoamylalkohol und Chloroform-Isoamylalkohol mittels Standard-Verfahren gereinigt. Dann wurde die DNA durch Zugabe von 1/50 Volumen 3 M Natriumacetat und 2 Volumina Ethanol, anschließend
- 25 fender Inkubation für 30 min bei -20°C und 30 min Zentrifugation bei 12000 U/min in einer Hochgeschwindigkeitszentrifuge mit einem SS34-Rotor (Sorvall) gefällt. Die DNA wurde in 1 ml TE-Puffer gelöst, der 20 µg/ml RNase A enthielt, und für mindestens 3 Std. bei 4°C gegen 1000 ml TE-Puffer dialysiert. Während dieser Zeit
- 30 wurde der Puffer 3mal ausgetauscht. Zu Aliquots von 0,4 ml der dialysierten DNA-Lösung wurden 0,4 ml 2 M LiCl und 0,8 ml Ethanol zugegeben. Nach 30 min Inkubation bei -20°C wurde die DNA durch Zentrifugation gesammelt (13000 U/min, Biofuge Fresco, Heraeus, Hanau, Deutschland). Das DNA-Pellet wurde in TE-Puffer gelöst.
- 35 Durch dieses Verfahren hergestellte DNA konnte für alle Zwecke verwendet werden, einschließlich Southern-Blotting oder zur Konstruktion genomischer Banken.

- Beispiel 2: Konstruktion genomischer *Corynebacterium glutamicum*
- 40 (ATCC13032)-Banken in *Escherichia coli*

- Ausgehend von DNA, die wie in Beispiel 1 beschrieben hergestellt wurde, wurden gemäß bekannter und gut eingeführter Verfahren (siehe bspw. Sambrook, J. et al. (1989) "Molecular Cloning: A
- 45 Laboratory Manual". Cold Spring Harbor Laboratory Press oder

Ausubel, F.M. et al. (1994) "Current Protocols in Molecular Biology", John Wiley & Sons) Cosmid- und Plasmid-Banken hergestellt.

- Es ließ sich jedes Plasmid oder Cosmid einsetzen. Besondere Verwendung fanden die Plasmide pBR322 (Sutcliffe, J.G. (1979) Proc. Natl Acad. Sci. USA, 75:3737-3741); pACYC177 (Change & Cohen (1978) J. Bacteriol. 134:1141-1156); Plasmide der pBS-Reihe (pBSSK+, pBSSK- und andere; Stratagene, LaJolla, USA) oder Cosmide, wie SuperCos1 (Stratagene, LaJolla, USA) oder Lorist6 (Gibson, T.J. Rosenthal, A., und Waterson, R.H. (1987) Gene 53: 283-286.

#### Beispiel 3: DNA-Sequenzierung und Computer-Funktionsanalyse

- 15 Genomische Banken, wie in Beispiel 2 beschrieben, wurden zur DNA-Sequenzierung gemäß Standard-Verfahren, insbesondere dem Kettenabbruchverfahren mit ABI377-Sequenziermaschinen (s. z.B. Fleischman, R.D. et al. (1995) "Whole-genome Random Sequencing and Assembly of Haemophilus Influenzae Rd.", Science 269:496-512) verwendet. Die Sequenzierprimer mit den folgenden Nukleotidsequenzen wurden verwendet: 5'-GGAAACAGTATGACCATG-3' oder 5'-GTAAAACGACGGCCAGT-3'.

#### Beispiel 4: In-vivo-Mutagenese

- 25 In vivo-Mutagenese von *Corynebacterium glutamicum* kann durchgeführt werden, indem eine Plasmid- (oder andere Vektor-) DNA durch *E. coli* oder andere Mikroorganismen (z.B. *Bacillus* spp. oder Hefen, wie *Saccharomyces cerevisiae*) geschleust wird, die die Integrität ihrer genetischen Information nicht aufrechterhalten können. Übliche Mutatorstämme weisen Mutationen in den Genen für das DNA-Reparatursystem auf (z.B., mutHLS, mutD, mutT, usw., zum Vergleich siehe Rupp, W.D. (1996) DNA repair mechanisms, in: *Escherichia coli* and *Salmonella*, S. 2277-2294, ASM: Washington). Diese Stämme sind dem Fachmann bekannt. Die Verwendung dieser Stämme ist bspw. in Greener, A. und Callahan, M. (1994) Strategies 7:32-34 veranschaulicht.

- 40 Beispiel 5: DNA-Transfer zwischen *Escherichia coli* und *Corynebacterium glutamicum*

- Mehrere *Corynebacterium*- und *Brevibacterium*-Arten enthalten endogene Plasmide (wie bspw. pHM1519 oder pBL1) die autonom replizieren (für einen Überblick siehe bspw. Martin, J.F. et al. (1987) Biotechnology 5:137-146). Shuttle-Vektoren für *Escherichia coli* und *Corynebacterium glutamicum* lassen sich leicht mittels Standard-Vektoren für *E. coli* konstruieren (Sambrook, J. et al.,

## 50

- (1989), "Molecular Cloning: A Laboratory Manual", Cold Spring Harbor Laboratory Press oder Ausubel, F.M. et al. (1994) "Current Protocols in Molecular Biology", John Wiley & Sons), denen ein Replikationsursprung für und ein geeigneter Marker aus *Corynebacterium glutamicum* beigegeben wird. Solche Replikationsursprünge werden vorzugsweise von endogenen Plasmiden entnommen, die aus *Corynebacterium*- und *Brevibacterium*-Arten isoliert worden sind. Besondere Verwendung als Transformationsmarker für diese Arten sind Gene für Kanamycin-Resistenz (wie solche, die vom Tn5- oder
- 10 Tn-903-Transposon stammen) oder für Chloramphenicol (Winnacker, E.L. (1987) "From Genes to Clones - Introduction to Gene Technology, VCH, Weinheim). Es gibt zahlreiche Beispiele in der Literatur für die Herstellung einer großen Vielzahl von Shuttle-Vektoren, die in *E. coli* und *C. glutamicum* replizieren und für verschiedene Zwecke verwendet werden können, einschließlich Gen-Überexpression (siehe bspw. Yoshihama, M. et al. (1985) J. Bacteriol. 162:591-597, Martin, J.F. et al., (1987) Biotechnology, 5:137-146 und Eikmanns, B.J. et al. (1992) Gene 102:93-98).
- 20 Mittels Standard-Verfahren ist es möglich, ein Gen von Interesse in einen der vorstehend beschriebenen Shuttle-Vektoren zu klonieren und solche Hybrid-Vektoren in *Corynebacterium glutamicum*-Stämme einzubringen. Die Transformation von *C. glutamicum* läßt
- 25 sich durch Protoplastentransformation (Kastsumata, R. et al., (1984) J. Bacteriol. 159:306-311), Elektroporation (Liebl, E. et al., (1989) FEMS Microbiol. Letters, 53:399-303) und in Fällen, bei denen spezielle Vektoren verwendet werden, auch durch Konjugation erzielen (wie z.B. beschrieben in Schäfer, A., et (1990) J. Bacteriol. 172:1663-1666). Es ist ebenfalls möglich, die Shuttle-Vektoren für *C. glutamicum* auf *E. coli* zu übertragen, indem Plasmid-DNA aus *C. glutamicum* (mittels im Fachgebiet bekannter Standard-Verfahren) präpariert und in *E. coli* transformiert wird. Dieser Transformationsschritt kann mit Standard-Verfahren
- 35 erfolgen, jedoch wird vorteilhafterweise ein Mcr-defizienter *E. coli*-Stamm verwendet, wie NM522 (Gough & Murray (1983) J. Mol. Biol. 166:1-19).

## Beispiel 6: Bestimmung der Expression des mutanten Proteins

- 40 Die Beobachtungen der Aktivität eines mutierten Proteins in einer transformierten Wirtszelle beruhen auf der Tatsache, daß das mutante Protein auf ähnliche Weise und in ähnlicher Menge exprimiert wird wie das Wildtyp-Protein. Ein geeignetes Verfahren zur
- 45 Bestimmung der Transkriptionsmenge des mutanten Gens (ein Anzeichen für die mRNA-Menge, die für die Translation des Genprodukts verfügbar ist) ist die Durchführung eines Northern-Blots (s.

## 51

bspw. Ausubel et al., (1988) Current Protocols in Molecular Biology, Wiley: New York), wobei ein Primer, der so ausgestaltet ist, daß er an das Gen von Interesse bindet, mit einer nachweisbaren (gewöhnlich radioaktiven oder chemilumineszierenden) Markierung versehen wird, so daß - wenn die Gesamt-RNA einer Kultur des Organismus extrahiert, auf einem Gel aufgetrennt, auf eine stabile Matrix übertragen und mit dieser Sonde inkubiert wird - die Bindung und die Quantität der Bindung der Sonde das Vorliegen und auch die Menge der mRNA für dieses Gen anzeigt. Diese Information ist ein Hinweis auf das Ausmaß der Transkription des mutanten Gens. Gesamt-Zell-RNA läßt sich durch verschiedene Verfahren aus *Corynebacterium glutamicum* isolieren, die im Fachgebiet bekannt sind, wie in Bormann, E.R. et al., (1992) Mol. Microbiol. 6:317-326 beschrieben.

15

Zur Bestimmung des Vorliegens oder der relativen Menge an Protein, das von dieser mRNA translatiert wird, können Standard-Techniken, wie Western-Blot, eingesetzt werden (s. bspw. Ausubel et al. (1988) "Current Protocols in Molecular Biology", Wiley, New York). Bei diesem Verfahren werden Gesamt-Zellproteine extrahiert, durch Gelelektrophorese aufgetrennt, auf eine Matrix, wie Nitrocellulose, übertragen und mit einer Sonde, wie einem Antikörper, die an das gewünschte Protein spezifisch bindet, inkubiert. Diese Sonde ist gewöhnlich mit einer chemilumineszierenden oder colorimetrischen Markierung versehen, die sich leicht nachweisen läßt. Das Vorliegen und die beobachtete Menge an Markierung zeigt das Vorliegen und die Menge des gesuchten Mutantensproteins in der Zelle an.

30 Beispiel 7: Wachstum von genetisch verändertem *Corynebacterium glutamicum* - Medien und Anzuchtbedingungen

Genetisch veränderte *Corynebakterien* werden in synthetischen oder natürlichen Wachstumsmedien gezüchtet. Eine Anzahl unterschiedlicher Wachstumsmedien für *Corynebakterien* sind bekannt und leicht erhältlich (Lieb et al. (1989) Appl. Microbiol. Biotechnol. 32:205-210; von der Osten et al. (1998) Biotechnology Letters 11:11-16; Patent DE 4 120 867; Liebl (1992) "The Genus *Corynebacterium*", in: The Prokaryotes, Bd. II, Balows, A., et al., Hrsg. Springer-Verlag). Diese Medien bestehen aus einer oder mehreren Kohlenstoffquellen, Stickstoffquellen, anorganischen Salzen, Vitaminen und Spurenelementen. Bevorzugte Kohlenstoffquellen sind Zucker, wie Mono-, Di- oder Polysaccharide. Sehr gute Kohlenstoffquellen sind bspw. Glucose, Fructose, Mannose, Galactose, Ribose, Sorbose, Ribulose, Lactose, Maltose, Saccharose, Raffinose, Stärke oder Cellulose. Man kann Zucker auch über komplexe Verbindungen, wie Melassen, oder andere Nebenprodukte

## 52

der Zucker-Raffinierung zu den Medien geben. Es kann auch vorteilhaft sein, Gemische verschiedener Kohlenstoffquellen zuzugeben. Andere mögliche Kohlenstoffquellen sind Alkohole und organische Säuren, wie Methanol, Ethanol, Essigsäure oder Milchsäure.

- 5 Stickstoffquellen sind gewöhnlich organische oder anorganische Stickstoffverbindungen oder Materialien, die diese Verbindungen enthalten. Beispielhafte Stickstoffquellen umfassen Ammoniak-Gas oder Ammoniumsalze, wie  $\text{NH}_4\text{Cl}$  oder  $(\text{NH}_4)_2\text{SO}_4$ ,  $\text{NH}_4\text{OH}$ , Nitrate, Harnstoff, Aminosäuren oder komplexe Stickstoffquellen, wie Mais-
- 10 quellwasser, Sojamehl, Sojaprotein, Hefeextrakt, Fleischextrakt und andere.

Anorganische Salzverbindungen, die in den Medien enthalten sein können, umfassen die Chlorid-, Phosphor- oder Sulfatsalze von

- 15 Calcium, Magnesium, Natrium, Kobalt, Molybdän, Kalium, Mangan, Zink, Kupfer und Eisen. Chelatbildner können zum Medium gegeben werden, um die Metallionen in Lösung zu halten. Besonders geeignete Chelatbildner umfassen Dihydroxyphenole, wie Catechol oder Protocatechuat, oder organische Säuren, wie Citronensäure. Die
- 20 Medien enthalten üblicherweise auch andere Wachstumsfaktoren, wie Vitamine oder Wachstumsförderer, zu denen bspw. Biotin, Riboflavin, Thiamin, Folsäure, Nikotinsäure, Panthothenat und Pyridoxin gehören. Wachstumsfaktoren und Salze stammen häufig von komplexen Medienkomponenten, wie Hefeextrakt, Melassen, Maisquellwasser und
- 25 dergleichen. Die genaue Zusammensetzung der Medienverbindungen hängt stark vom jeweiligen Experiment ab und wird für jeden spezifischen Fall individuell entschieden. Information über die Medienoptimierung ist erhältlich aus dem Lehrbuch "Applied Microbiol. Physiology, A Practical Approach" (Hrsg. P.M. Rhodes, P.F.
- 30 Stanbury, IRL Press (1997) S. 53-73, ISBN 0 19 963577 3). Wachstumsmedien lassen sich auch von kommerziellen Anbietern beziehen, wie Standard 1 (Merck) oder BHI (Brain heart infusion, DIFCO) und dergleichen.

- 35 Sämtliche Medienkomponenten werden, entweder durch Hitze (20 min bei 1,5 bar und 121°C) oder durch Sterilfiltration, sterilisiert. Die Komponenten können entweder zusammen oder nötigenfalls getrennt sterilisiert werden. Sämtliche Medienkomponenten können zu Beginn der Anzucht zugegen sein oder wahlfrei kontinuierlich oder
- 40 chargenweise hinzugegeben werden.

Die Anzuchtbedingungen werden für jedes Experiment gesondert definiert. Die Temperatur sollte zwischen 15°C und 45°C liegen und kann während des Experimentes konstant gehalten oder verändert

- 45 werden. Der pH-Wert des Mediums sollte im Bereich von 5 bis 8,5, vorzugsweise um 7,0 liegen, und kann durch Zugabe von Puffern zu den Medien aufrechterhalten werden. Ein beispielhafter Puffer für



## 53

diesen Zweck ist ein Kaliumphosphatpuffer. Synthetische Puffer, wie MOPS, HEPES; ACES usw., können alternativ oder gleichzeitig verwendet werden. Der Anzucht-pH-Wert läßt sich während der Anzucht auch durch Zugabe von NaOH oder  $\text{NH}_4\text{OH}$  konstant halten. Werden komplexe Medienkomponenten, wie Hefe-Extrakt, verwendet, sinkt der Bedarf an zusätzlichen Puffern, da viele komplexe Verbindungen eine hohe Pufferkapazität aufweisen. Beim Einsatz eines Fermenters für die Anzucht von Mikroorganismen kann der pH-Wert auch mit gasförmigem Ammoniak reguliert werden.

10

Die Inkubationsdauer liegt gewöhnlich in einem Bereich von mehreren Stunden bis zu mehreren Tagen. Diese Zeit wird so ausgewählt, daß sich die maximale Menge Produkt in der Brühe ansammelt. Die offenbarten Wachstumsexperimente können in einer Vielzahl von Behältern, wie Mikrotiterplatten, Glasröhrchen, Glaskolben oder Glas- oder Metallfermentern unterschiedlicher Größen durchgeführt werden. Zum Screening einer großen Anzahl von Klonen sollten die Mikroorganismen in Mikrotiterplatten, Glasröhrchen oder Schüttelkolben entweder mit oder ohne Schikanen, gezüchtet werden. Vorzugsweise werden 100-ml-Schüttelkolben verwendet, die mit 10% (bezogen auf das Volumen) des erforderlichen Wachstumsmediums gefüllt sind. Die Kolben sollten auf einem Kreiselerschüttler (Amplitude 25 mm) mit einer Geschwindigkeit im Bereich von 100-300 U/min geschüttelt werden. Verdampfungsverluste können durch Aufrechterhalten einer feuchten Atmosphäre verringert werden; alternativ sollte für die Verdampfungsverluste eine mathematische Korrektur durchgeführt werden.

Werden genetisch modifizierte Klone untersucht, sollte auch ein unmodifizierter Kontrollklon oder ein Kontrollklon getestet werden, der das Basisplasmid ohne Insertion enthält. Das Medium wird auf eine  $\text{OD}_{600}$  von 0,5 - 1,5 angeimpft, wobei Zellen verwendet werden, die auf Agarplatten, wie CM-Platten (10 g/l Glucose, 2,5 g/l NaCl, 2 g/l Harnstoff, 10 g/l Polypepton, 5 g/l Hefeextrakt, 5 g/l Fleischextrakt, 22 g/l Agar pH-Wert 6,8 mit 2 M NaOH), die bei 30°C inkubiert worden sind, gezüchtet wurden. Das Animpfen der Medien erfolgt entweder durch Einbringen einer Kochsalzlösung von *C. glutamicum*-Zellen von CM-Platten oder durch Zugabe einer flüssigen Vorkultur dieses Bakteriums.

40

#### Beispiel 8: In-vitro-Analyse der Funktion mutanter Proteine

Die Bestimmung der Aktivitäten und kinetischen Parameter von Enzymen ist im Fachgebiet gut bekannt. Experimente zur Bestimmung der Aktivität eines bestimmten veränderten Enzyms müssen an die spezifische Aktivität des Wildtypenzyms angepaßt werden, was innerhalb der Fähigkeiten des Fachmann liegt. Überblicke über En-

- zyme im allgemeinen sowie spezifische Einzelheiten, die die Struktur, Kinetiken, Prinzipien, Verfahren, Anwendungen und Beispiele zur Bestimmung vieler Enzymaktivitäten betreffen, können bspw. in den nachstehenden Literaturstellen gefunden werden: Dixon, M., und Webb, E.C: (1979) *Enzymes*, Longmans, London; Fersht (1985) *Enzyme Structure and Mechanism*, Freeman, New York; Walsh (1979) *Enzymatic Reaction Mechanisms*. Freeman, San Francisco; Price, N.C., Stevens, L. (1982) *Fundamentals of Enzymology*. Oxford Univ. Press: Oxford; Boyer, P.D: Hrsg. (1983) *The Enzymes*, 3. Aufl., Academic Press, New York; Bisswanger, H. (1994) *Enzymkinetik*, 2. Aufl. VCH, Weinheim (ISBN 3527300325); Bergmeyer, H.U., Bergmeyer, J., Graßl, M. Hrsg. (1983-1986) *Methods of Enzymatic Analysis*, 3. Aufl. Bd. I-XII, Verlag Chemie: Weinheim; und Ullmann's *Encyclopedia of Industrial Chemistry* (1987) Bd. A9, "Enzymes", VCH, Weinheim, S. 352-363.

- Die Aktivität von Proteinen, die an DNA binden, kann durch viele gut eingeführte Verfahren gemessen werden, wie DNA-Banden-Shift-Assays (die auch als Gelretardations-Assays bezeichnet werden).
- 20 Die Wirkung dieser Proteine auf die Expression anderer Moleküle kann mit Reportergen-Assays (wie in Kolmar, H. et al., (1995) *EMBO J.* 14:3895-3904 und den darin zitierten Literaturstellen beschrieben) gemessen werden. Reportergen-Testsysteme sind wohl bekannt und für Anwendungen in pro- und eukaryotischen Zellen etabliert, wobei Enzyme, wie beta-Galactosidase, Grün-Fluoreszenz-Protein und mehrere andere verwendet werden.

- Die Bestimmung der Aktivität von Membran-Transportproteinen kann gemäß Techniken, wie sie in Gennis, R.B. (1989) "Pores, Channels and Transporters", in *Biomembranes, Molecular Structure and Function*, Springer: Heidelberg, S. 85-137; 199-234; und 270-322 beschrieben sind, erfolgen.

- Beispiel 9: Analyse des Einflusses von mutiertem Protein auf die Produktion des gewünschten Produktes

- Die Wirkung der genetischen Modifikation in *C. glutamicum* auf die Produktion einer gewünschten Verbindung (wie einer Aminosäure) kann bestimmt werden, indem die modifizierten Mikroorganismen unter geeigneten Bedingungen (wie den vorstehend beschriebenen) gezüchtet werden und das Medium und/oder die zellulären Komponenten bezüglich der erhöhten Produktion des gewünschten Produktes (d.h. einer Aminosäure) untersucht wird/werden. Solche Analysetechniken sind dem Fachmann wohl bekannt und umfassen Spektroskopie, Dünnschichtchromatographie, Färbeverfahren verschiedener Art, enzymatische und mikrobiologische Verfahren sowie analytische Chromatographie, wie Hochleistungs-Flüssigkeitschromatographie (s. bspw.

- Ullman, Encyclopedia of Industrial Chemistry, Bd. A2, S. 89-90 und S. 443-613, VCH: Weinheim (1985); Fallon, A., et al., (1987) "Applications of HPLC in Biochemistry" in: Laboratory Techniques in Biochemistry and Molecular Biology, Bd. 17; Rehm et al. (1993) 5 Biotechnology, Bd. 3, Kapitel III: "Product recovery and purification", S. 469-714, VCH: Weinheim; Belter, P.A. et al. (1988) Bioseparations: downstream processing for Biotechnology, John Wiley and Sons; Kennedy, J.F. und Cabral, J.M.S. (1992) Recovery processes for biological Materials, John Wiley and Sons;
- 10 Shaeiwitz, J.A. und Henry, J.D. (1988) Biochemical Separations, in Ullmann's Encyclopedia of Industrial Chemistry, Bd. B3; Kapitel 11, S. 1-27, VCH: Weinheim; und Dechow, F.J. (1989) Separation and purification techniques in biotechnology, Noyes Publications).
- 15 Zusätzlich zur Messung des Fermentationsendproduktes ist es ebenfalls möglich, andere Komponenten der Stoffwechselwege zu analysieren, die zur Produktion der gewünschten Verbindung verwendet werden, wie Zwischen- und Nebenprodukte, um die Gesamt-Effizienz
- 20 der Produktion der Verbindung zu bestimmen. Die Analyseverfahren umfassen Messungen der Nährstoffmengen im Medium (bspw. Zucker, Kohlenwasserstoffe, Stickstoffquellen, Phosphat und andere Ionen), Messungen der Biomassezusammensetzung und des Wachstums, Analyse der Produktion gemeinsamer Metabolite von Biosynthesewe-
- 25 gen und Messungen von Gasen, die während der Fermentation erzeugt werden. Standardverfahren für diese Messungen sind in Applied Microbial Physiology; A Practical Approach, P.M. Rhodes und P.F. Stanbury, Hrsg. IRL Press, S. 103-129; 131-163 und 165-192 (ISBN: 0199635773) und den darin angegebenen Literaturstellen beschrie-
- 30 ben.

Beispiel 10: Reinigung des gewünschten Produktes aus *C. glutamicum*-Kultur

- 35 Die Gewinnung des gewünschten Produktes aus *C. glutamicum*-Zellen oder aus dem Überstand der vorstehend beschriebenen Kultur kann durch verschiedene, im Fachgebiet bekannte Verfahren erfolgen. Wird das gewünschte Produkt von den Zellen nicht sezerniert, können die Zellen aus der Kultur durch langsame Zentrifugation ge-
- 40 erntet werden, die Zellen können durch Standard-Techniken, wie mechanische Kraft oder Ultraschallbehandlung, lysiert werden. Die Zelltrümmer werden durch Zentrifugation entfernt, und die Überstandsfraktion, die die löslichen Proteine enthält, wird zur weiteren Reinigung der gewünschten Verbindung erhalten. Wird das
- 45 Produkt von den *C. glutamicum*-Zellen sezerniert, werden die Zel-

## 56

len durch langsame Zentrifugation aus der Kultur entfernt, und die Überstandsfraktion wird zur weiteren Reinigung behalten.

- Die Überstandsfraktion aus beiden Reinigungsverfahren wird einer
- 5 Chromatographie mit einem geeigneten Harz unterworfen, wobei das gewünschte Molekül entweder auf dem Chromatographieharz zurückgehalten wird, viele Verunreinigungen in der Probe jedoch nicht, oder die Verunreinigungen auf dem Harz zurückbleiben, die Probe hingegen nicht. Diese Chromatographieschritte können nötigenfalls
- 10 wiederholt werden, wobei die gleichen oder andere Chromatographieharze verwendet werden. Der Fachmann ist in der Auswahl der geeigneten Chromatographieharze und ihrer wirksamsten Anwendung für ein bestimmtes zu reinigendes Molekül bewandert. Das gereinigte Produkt kann durch Filtration oder Ultrafiltration konzen-
- 15 triert und bei einer Temperatur aufbewahrt werden, bei der die Stabilität des Produktes maximal ist.

- Im Fachgebiet sind viele Reinigungsverfahren bekannt, und das vorhergehende Reinigungsverfahren soll nicht einschränkend sein.
- 20 Diese Reinigungstechniken sind bspw. beschrieben in Bailey, J.E. & Ollis, D.F. Biochemical Engineering Fundamentals, McGraw-Hill: New York (1986).

- Die Identität und Reinheit der isolierten Verbindungen kann durch
- 25 Techniken des Standes der Technik bestimmt werden. Diese umfassen Hochleistungs-Flüssigkeitschromatographie (HPLC), spektroskopische Verfahren, Färbeverfahren, Dünnschichtchromatographie, NIRS, Enzymtest oder mikrobiologische Tests. Diese Analyseverfahren sind zusammengefaßt in: Patek et al. (1994) Appl. Environ.
- 30 Microbiol. 60:133-140; Malakhova et al. (1996) Biotekhnologiya 11 27-32; und Schmidt et al. (1998) Bioprocess Engineer. 19:67-70. Ulmann's Encyclopedia of Industrial Chemistry (1996) Bd. A27, VCH: Weinheim, S. 89-90, S. 521-540, S. 540-547, S. 559-566, 575-581 und S. 581-587; Michal, G (1999) Biochemical Pathways: An
- 35 Atlas of Biochemistry and Molecular Biology, John Wiley and Sons; Fallon, A. et al. (1987) Applications of HPLC in Biochemistry in: Laboratory Techniques in Biochemistry and Molecular Biology, Bd. 17.

## 40 Äquivalente

- Der Fachmann erkennt oder kann - indem er lediglich Routineverfahren verwendet - viele Äquivalente der erfindungsgemäßen spezifischen Ausführungsformen feststellen. Diese Äquivalente sollen
- 45 von den nachstehenden Patentansprüchen umfaßt sein.

## 57

Tabelle 1: Gene der Patentanmeldung

	RXN00080	VV0154	8446	6917
	RXN00087	VV0048	204	731
5	RXN00162	VV0084	9489	9842
	RXN00194	VV0115	4174	4614
	RXN00242	VV0133	7031	8308
	RXN00247	VV0057	35082	34156
	RXN00344	VV0135	42719	43597
	RXN00362	VV0176	33334	34680
10	RXN00390	VV0025	9834	9430
	RXN00416	VV0181	1	1650
	RXN00447	VV0112	23325	22906
	RXN00455	VV0076	5523	4774
	RXN00485	VV0086	51200	48906
	RXN00515	VV0144	3289	2588
15	RXN00662	VV0142	7711	8979
	RXN00729	VV0024	3903	2926
	RXN00731	VV0133	8314	10809
	RXN00835	VV0138	12068	13021
	RXN00945	VV0107	1876	2847
	RXN00953	VV0260	1834	1082
20	RXN00959	VV0208	402	857
	RXN00991	VV0210	4424	3045
	RXN01004	VV0210	3045	1984
	RXN01016	VV0209	14476	15123
	RXN01071	VV0030	4879	2816

25

30

35

40

45

Tabelle 2

GenBank™ Zugangs-Nr.	Gen-Name	Genfunktion	Literaturstellen
A09073	ppg	Phosphoenolpyruvatcarboxylase	Bachmann, B. et al. "DNA fragment coding for phosphoenolpyruvat carboxylase, recombinant DNA carrying said fragment, strains carrying the recombinant DNA and method for producing L-aminino acids using said strains," Patent: EP 0358940-A 3 03/21/90
A45579, A45581, A45583, A45585 A45587		Threonindehydratase	Moeckel, B. et al. "Production of L-isoleucine by means of recombinant micro-organisms with deregulated threonine dehydratase," Patent: WO 9519442-A 5 07/20/95
AB003132	murC; flsQ; flsZ		Kobayashi, M. et al. "Cloning, sequencing, and characterization of the flsZ gene from coryneform bacteria," <i>Biochem. Biophys. Res. Commun.</i> , 236(2):383-388 (1997)
AB015023	murC; flsQ		Wachi, M. et al. "A murC gene from Coryneform bacteria," <i>Appl. Microbiol. Biotechnol.</i> , 51(2):223-228 (1999)
AB018530	ftsR		Kimura, E. et al. "Molecular cloning of a novel gene, ftsR, which rescues the detergent sensitivity of a mutant derived from <i>Brevibacterium lactofermentum</i> ," <i>Biosci. Biotechnol. Biochem.</i> , 60(10):1565-1570 (1996)
AB018531	ftsR1; ftsR2		
AB020624	murI	D-Glutamatracemase	
AB023377	tki	Transketolase	
AB024708	gltB; gltD	Glutamin-2-oxoglutarataminotransferase große und kleine Untereinheiten	
AB025424	acn	Aconitase	
AB027714	rep	Replikationsprotein	
AB027715	rep; adn	Replikationsprotein; Aminoglycosid- adenyltransferase	

GenBank™ Zugangs-Nr.	Gen-Name	Genfunktion	Literaturstellen
AF005242	argC	N-Acetylglutamat-5-semialdehyd- dehydrogenase	
AF005635	glnA	Glutaminsynthetase	
AF030405	hisF	Cyclase	
AF030520	argG	Argininosuccinatsynthetase	
AF031518	argF	Ornithincarbamolytransferase	
AF036932	aroD	3-Dehydroquimatdehydratase	
AF038548	pyc	Pyruvatcarboxylase	
AF038651	dcIAE; apt; rel	Dipeptid-bindendes Protein; Adenin- phosphoribosyltransferase; GTP- pyrophosphokinase	Wehneier, L. et al. "The role of the Corynebacterium glutamicum rel gene in (p)ppGpp metabolism," <i>Microbiology</i> , 144:1853-1862 (1998)
AF041436	argR	Arginine-Repressor	
AF045998	impA	Inositolmonophosphatphosphatase	
AF048764	argH	Argininosuccinatlase	
AF049897	argC; argJ; argB; argD; argF; argR; argG; argH	N-Acetylglutamylphosphatereduktase; Ornithinacetyltransferase; N-Acetyl- glutamatkinase; Acetylornithin- trans- aminase; Ornithin- carbamoyltransferase; Argininrepressor; Argininosuccinatsynthase; Argininosuccinatlase	
AF050109	inhA	Enoyl-acyl-Carrierprotein-Reductase	
AF050166	hisG	ATP-Phosphoribosyltransferase	
AF051846	hisA	Phosphoribosylformi- mino-5-amino-1-phosphoribosyl-4- imidazolecarboxamide isomerase	
AF052652	metA	Homoscrin-O-acetyltransferase	Park, S. et al. "Isolation and analysis of metA, a methionine biosynthetic gene encoding homoserine acetyltransferase in Corynebacterium glutamicum," <i>Mol. Cells</i> , 8(3):286-294 (1998)
AF053071	aroB	Dehydrochinatsynthetase	
AF060558	hisH	Glutaminamidotransferase	

GenBank™ Zugangs-Nr.	Gen-Name	Genfunktion	Literaturstellen
AF086704	hisE	Phosphoribosyl-ATP-pyrophospho- hydrolase	
AF114233	aroA	5-Enolpyruvylshikimat-3-phosphatsynthase	
AF116184	panD	L-Aspartat- $\alpha$ -decarboxylase-Vorstufe	Dusch, N. et al. "Expression of the <i>Corynebacterium glutamicum</i> panD gene encoding L-aspartate- $\alpha$ -decarboxylase leads to pantothenate over-production in <i>Escherichia coli</i> ," <i>Appl. Environ. Microbiol.</i> , 65(4):1530-1539 (1999)
AF124518	aroD; aroE	3-Dehydrochinase; Shikimatdehydrogenase	
AF124600	aroC; aroK; aroB; pepQ	Chorisnatsynthase; Shikimatkinase; 3-Dehydrochinatsynthase; mutmaßliche Cytoplasmapeptidase	
AF145897	inhA		
AF145898	inhA		
AJ001436	ectP	Transport von Ectoine, Glycin, Betain, Prolin	Peter, H. et al. "Corynebacterium glutamicum is equipped with four secondary carriers for compatible solutes: Identification, sequencing, and characterization of the proline/ectoine uptake system, ProP, and the ectoine/proline/glycine betaine carrier, EctP," <i>J. Bacteriol.</i> , 180(22):6005-6012 (1998)
AJ004934	dapD	Tetrahydrodipicolinatsuccinylase (unvollständig)	Wehrmann, A. et al. "Different modes of diamino pimelate synthesis and their role in cell wall integrity: A study with <i>Corynebacterium glutamicum</i> ," <i>J. Bacteriol.</i> , 180(12):3159-3165 (1998)
AJ007732	ppc; secG; amt; ocd; soxA	Phosphoenolpyruvatcarboxylase; ?; High affinity-Ammonium-Aufnahmeprotein; mutmassliche Ornithin-cyclodecarboxylase; Sarcosinoxidase	
AJ010319	ftsY, glnB, glnD; srp; amtP	Beteiligt an Zellteilung; PII protein; uridylyltransferase (Uridylyl-enfernendes Enzym); Signalerkennungspartikel; Low affinity-Ammonium-Aufnahmeprotein	Jakoby, M. et al. "Nitrogen regulation in <i>Corynebacterium glutamicum</i> ; Isolation of genes involved in biochemical characterization of corresponding proteins," <i>FEMS Microbiol.</i> , 173(2):303-310 (1999)
AJ132968	cat	Chloramphenicol-acetyltransferase	



GenBank™ Zugangs-Nr.	Gen-Name	Genfunktion	Literaturstellen
AJ224946	mgo	L-malate: Chinonoxidoreductase	Molenaar, D. et al. "Biochemical and genetic characterization of the membrane-associated malate dehydrogenase (acceptor) from <i>Corynebacterium glutamicum</i> ," <i>Eur. J. Biochem.</i> , 254(2):395-403 (1998)
AJ238250	ndh	NADH-dehydrogenase	Lichtinger, T. et al. "Biochemical and biophysical characterization of the cell wall porin of <i>Corynebacterium glutamicum</i> : The channel is formed by a low molecular mass polypeptide," <i>Biochemistry</i> , 37(43):15024-15032 (1998)
AJ238703	porA	Porin	Vertes, A.A. et al. "Isolation and characterization of IS31831, a transposable element from <i>Corynebacterium glutamicum</i> ," <i>Mol. Microbiol.</i> , 11(4):739-746 (1994)
D17429		Transposables Element IS31831	Usuda, Y. et al. "Molecular cloning of the <i>Corynebacterium glutamicum</i> (Brevibacterium lactofermentum AJ12036) <i>odhA</i> gene encoding a novel type of 2-oxoglutarate dehydrogenase," <i>Microbiology</i> , 142:3347-3354 (1996)
D84102	odhA	2-Oxoglutaratdehydrogenase	Katsumata, R. et al. "Production of L-threonine and L-isoleucine," Patent: JP 1987232392-A 1 10/12/87
E01358	hdh; hk	Homoserindehydrogenase; Homoserin-kinase	Katsumata, R. et al. "Production of L-threonine and L-isoleucine," Patent: JP 1987232392-A 2 10/12/87
E01359		Stromaufwärts des Startcodons des Homoserinkinase-Gens	Matsui, K. et al. "Tryptophan operon, peptide and protein coded thereby, utilization of tryptophan operon gene expression and production of tryptophan," Patent: JP 1987244382-A 1 10/24/87
E01375		Tryptophan-Operon	Matsui, K. et al. "Tryptophan operon, peptide and protein coded thereby, utilization of tryptophan operon gene expression and production of tryptophan," Patent: JP 1987244382-A 1 10/24/87
E01376	trpL; trpE	Leader-Peptid; Anthranilatsynthase	Hatakeyama, K. et al. "DNA fragment containing gene capable of coding biotin synthetase and its utilization," Patent: JP 1992278088-A 1 10/02/92
E01377		Promotor- und Operator-Bereiche des Tryptophan-Operons	Kohama, K. et al. "Gene coding diaminopelargonic acid aminotransferase and desthiobiotin synthetase and its utilization," Patent: JP 1992330284-A 1 11/18/92
E03937		Biotinsynthase	
E04040		Diaminopelargonsäureaminotransferase	

GenBank™ Zugangs-Nr.	Gen-Name	Genfunktion	Literaturstellen
E04041		Desthiobiotinsynthetase	Kohama, K. et al. "Gene coding diaminopelargonic acid aminotransferase and desthiobiotin synthetase and its utilization," Patent: JP 1992330284-A 1 11/18/92
E04307		Flavum aspartase	Kurusu, Y. et al. "Gene DNA coding aspartase and utilization thereof," Patent: JP 1993030977-A 1 02/09/93
E04376		Isocitratlyase	Katsumata, R. et al. "Gene manifestation controlling DNA," Patent: JP 1993056782-A 3 03/09/93
E04377		Isocitratlyase N-terminales Fragment	Katsumata, R. et al. "Gene manifestation controlling DNA," Patent: JP 1993056782-A 3 03/09/93
E04484		Prephenatdehydratase	Sotouchi, N. et al. "Production of L-phenylalanine by fermentation," Patent: JP 1993076352-A 2 03/30/93
E05108		Aspartokinase	Fugono, N. et al. "Gene DNA coding Aspartokinase and its use," Patent: JP 1993184366-A 1 07/27/93
E05112		Dihydro-dipichorinatsynthetase	Hatakeyama, K. et al. "Gene DNA coding dihydrodipicolinic acid synthetase and its use," Patent: JP 1993184371-A 1 07/27/93
E05776		Diaminopimelinsäuredehydrogenase	Kobayashi, M. et al. "Gene DNA coding Diaminopimelic acid dehydrogenase and its use," Patent: JP 1993284970-A 1 11/02/93
E05779		Threoninsynthase	Kohama, K. et al. "Gene DNA coding threonine synthase and its use," Patent: JP 1993284972-A 1 11/02/93
E06110		Prephenatdehydratase	Kikuchi, T. et al. "Production of L-phenylalanine by fermentation method," Patent: JP 1993344881-A 1 12/27/93
E06111		mutierte Prephenatdehydratase	Kikuchi, T. et al. "Production of L-phenylalanine by fermentation method," Patent: JP 1993344881-A 1 12/27/93
E06146		Acetohydroxysäuresynthetase	Inui, M. et al. "Gene capable of coding Acetohydroxy acid synthetase and its use," Patent: JP 1993344893-A 1 12/27/93
E06825		Aspartokinase	Sugimoto, M. et al. "Mutant aspartokinase gene," patent: JP 1994062866-A 1 03/08/94
E06826		mutierte Aspartokinase alpha-Untereinheit	Sugimoto, M. et al. "Mutant aspartokinase gene," patent: JP 1994062866-A 1 03/08/94

GenBank™ Zugangs-Nr.	Gen-Name	Genfunktion	Literaturstellen
E06827		mutierte Aspartokinase alpha-Untereinheit	Suginoto, M. et al. "Mutant aspartokinase gene," patent: JP 1994062866-A 1 03/08/94
E07701	secY		Honno, N. et al. "Gene DNA participating in integration of membraneous protein to membrane," Patent: JP 1994169780-A 1 06/21/94
E08177		Aspartokinase	Sato, Y. et al. "Genetic DNA capable of coding Aspartokinase released from feedback inhibition and its utilization," Patent: JP 1994261766-A 1 09/20/94
E08178, E08179, E08180, E08181, E08182		Durch Rückkopplungshemmung freigesetzte Aspartokinase	Sato, Y. et al. "Genetic DNA capable of coding Aspartokinase released from feedback inhibition and its utilization," Patent: JP 1994261766-A 1 09/20/94
E08232		Acetohydroxysäureisomeroreduktase	Inui, M. et al. "Gene DNA coding acetohydroxy acid isomeroreductase," Patent: JP 1994277067-A 1 10/04/94
E08234	secE		Asai, Y. et al. "Gene DNA coding for translocation machinery of protein," Patent: JP 1994277073-A 1 10/04/94
E08643		FT-Aminotransferase und Desithiobiotin-synthetase-Promotorbereich	Hatakeyama, K. et al. "DNA fragment having promoter function in coryneform bacterium," Patent: JP 1995031476-A 1 02/03/95
E08646		Biotinsynthetase	Hatakeyama, K. et al. "DNA fragment having promoter function in coryneform bacterium," Patent: JP 1995031476-A 1 02/03/95
E08649		Aspartase	Kohama, K. et al. "DNA fragment having promoter function in coryneform bacterium," Patent: JP 1995031478-A 1 02/03/95
E08900		Dihydrodipicolinatreductase	Madori, M. et al. "DNA fragment containing gene coding Dihydrodipicolinate acid reductase and utilization thereof," Patent: JP 1995075578-A 1 03/20/95
E08901		Diaminopimelinsäuredecarboxylase	Madori, M. et al. "DNA fragment containing gene coding Diaminopimelic acid decarboxylase and utilization thereof," Patent: JP 1995075579-A 1 03/20/95
E12594		Serinhydroxymethyltransferase	Hatakeyama, K. et al. "Production of L-tryptophan," Patent: JP 1997028391-A 1 02/04/97
E12760, E12759, E12758		Transposase	Moriya, M. et al. "Amplification of gene using artificial transposon," Patent: JP 1997070291-A 03/18/97

GenBank™ Zugangs-Nr.	Gen-Name	Genfunktion	Literaturstellen
E12764		Arginyl-IRNA synthetase; Diaminopimelin-säuredecarboxylase	Moriya, M. et al. "Amplification of gene using artificial transposon," Patent: JP 1997070291-A 03/18/97
E12767		Dihydrodipicolinsäuresynthetase	Moriya, M. et al. "Amplification of gene using artificial transposon," Patent: JP 1997070291-A 03/18/97
E12770		Aspartokinase	Moriya, M. et al. "Amplification of gene using artificial transposon," Patent: JP 1997070291-A 03/18/97
E12773		Dihydrodipicolinsäurereductase	Moriya, M. et al. "Amplification of gene using artificial transposon," Patent: JP 1997070291-A 03/18/97
E13655		Glucose-6-phosphatedehydrogenase	Hatakeyama, K. et al. "Glucose-6-phosphate dehydrogenase and DNA capable of coding the same," Patent: JP 1997224661-A 1 09/02/97
L01508	IlvA	Threonindehydratase	Moeckel, B. et al. "Functional and structural analysis of the threonine dehydratase of Corynebacterium glutamicum," <i>J. Bacteriol.</i> , 174:8065-8072 (1992)
L07603	EC 4.2.1.15	3-Desoxy-D-arabinoheptulosonat-7-phosphatsynthase	Chen, C. et al. "The cloning and nucleotide sequence of Corynebacterium glutamicum 3-deoxy-D-arabinoheptulosonat-7-phosphate synthase gene," <i>FEMS Microbiol. Lett.</i> , 107:223-230 (1993)
L09232	IlvB; ilvN; ilvC	Acetohydroxysäuresynthase, große Untereinheit; Acetohydroxysäuresynthase kleine Untereinheit; Acetohydroxysäure-isomero-reductase	Keilhauer, C. et al. "Isoleucine synthesis in Corynebacterium glutamicum: molecular analysis of the ilvB-ilvN-ilvC operon," <i>J. Bacteriol.</i> , 175(17):5595-5603 (1993)
L18874	PtsM	Phosphoenolpyruvat-Zuckerphospho-transferase	Fouet, A. et al. "Bacillus subtilis sucrose-specific enzyme II of the phospho-transferase system: expression in Escherichia coli and homology to enzymes II from enteric bacteria," <i>PNAS USA</i> , 84(24):8773-8777 (1987); Lee, J.K. et al. "Nucleotide sequence of the gene encoding the Corynebacterium glutamicum mannose enzyme II and analyses of the deduced protein sequence," <i>FEMS Microbiol. Lett.</i> , 119(1-2):137-145 (1994)
L27123	accB	Malatsynthase	Lee, H.-S. et al. "Molecular characterization of accB, a gene encoding malate synthase in Corynebacterium glutamicum," <i>J. Microbiol. Biotechnol.</i> , 4(4):256-263 (1994)

GenBank™ Zugangs-Nr.	Gen-Name	Genfunktion	Literaturstellen
L27126		Pyruvatkinase	Jetten, M. S. et al. "Structural and functional analysis of pyruvate kinase from <i>Corynebacterium glutamicum</i> ," <i>Appl. Environ. Microbiol.</i> , 60(7):2501-2507 (1994)
L28760	accA	Isocitratlyase	
L35906	dtxR	Diphtherietoxinrepressor	Oguiza, J. A. et al. "Molecular cloning, DNA sequence analysis, and characterization of the <i>Corynebacterium diphtheriae</i> dtxR from <i>Brevibacterium lactofermentum</i> ," <i>J. Bacteriol.</i> , 177(2):465-467 (1995)
M13774		Prephenatdehydratase	Follettie, M. T. et al. "Molecular cloning and nucleotide sequence of the <i>Corynebacterium glutamicum</i> pheA gene," <i>J. Bacteriol.</i> , 167:695-702 (1986)
M16175	5S rRNA		Park, Y.-H. et al. "Phylogenetic analysis of the coryneform bacteria by 5S rRNA sequences," <i>J. Bacteriol.</i> , 169:1801-1806 (1987)
M16663	trpE	Anthrnilatsynthase, 5'-Ende	Sano, K. et al. "Structure and function of the trp operon control regions of <i>Brevibacterium lactofermentum</i> , a glutamic-acid-producing bacterium," <i>Gene</i> , 52:191-200 (1987)
M16664	trpA	Tryptophansynthase, 3'-Ende	Sano, K. et al. "Structure and function of the trp operon control regions of <i>Brevibacterium lactofermentum</i> , a glutamic-acid-producing bacterium," <i>Gene</i> , 52:191-200 (1987)
M25819		Phosphoenolpyruvatcarboxylase	O'Regan, M. et al. "Cloning and nucleotide sequence of the Phosphoenolpyruvate carboxylase-coding gene of <i>Corynebacterium glutamicum</i> ATCC13032," <i>Gene</i> , 77(2):237-251 (1989)
M85106		23S rRNA-Gen-Insertionssequenz	Roller, C. et al. "Gram-positive bacteria with a high DNA G+C content are characterized by a common insertion within their 23S rRNA genes," <i>J. Gen. Microbiol.</i> , 138:1167-1175 (1992)
M85107, M85108		23S rRNA-Gen-Insertionssequenz	Roller, C. et al. "Gram-positive bacteria with a high DNA G+C content are characterized by a common insertion within their 23S rRNA genes," <i>J. Gen. Microbiol.</i> , 138:1167-1175 (1992)

GenBank™ Zugangs-Nr.	Gen-Name	Genfunktion	Literaturstellen
M89931	accD; brnQ; yhbW	Beta C-S lyase; Verzweigketten-Aminosäure-Aufnahme-Carrier; hypothetisches Protein yhbW	Rossol, I. et al. "The Corynebacterium glutamicum accD gene encodes a C-S lyase with alpha, beta-elimination activity that degrades aminoethylcysteine," <i>J. Bacteriol.</i> , 174(9):2968-2977 (1992); Tauch, A. et al. "Isoleucine uptake in Corynebacterium glutamicum ATCC 13032 is directed by the brnQ gene product," <i>Arch. Microbiol.</i> , 169(4):303-312 (1998)
S59299	trp	Leader-Gen (Promotor)	Herry, D.M. et al. "Cloning of the trp gene cluster from a tryptophan-hyper-producing strain of Corynebacterium glutamicum: identification of a mutation in the trp leader sequence," <i>Appl. Environ. Microbiol.</i> , 59(3):791-799 (1993)
U11545	trpD	Anthranilatphosphoribosyltransferase	O'Gara, J.P. and Dunican, L.K. (1994) Complete nucleotide sequence of the Corynebacterium glutamicum ATCC 21850 trpD gene." Thesis, Microbiology Department, University College Galway, Ireland.
U13922	cglIM; cglIR; cglIIR	mutmaßliche Typ II 5-Cytosin-methyltransferase; mutmaßliche Typ II Restriktionsendonuklease; mutmaßliche Typ I- oder Typ III Restriktions-endonuklease	Schafer, A. et al. "Cloning and characterization of a DNA region encoding a stress-sensitive restriction system from Corynebacterium glutamicum ATCC 13032 and analysis of its role in intergeneric conjugation with Escherichia coli," <i>J. Bacteriol.</i> , 176(23):7309-7319 (1994); Schafer, A. et al. "The Corynebacterium glutamicum cglIM gene encoding a 5-cytosine in an McrBC-deficient Escherichia coli strain," <i>Gene</i> , 203(2):95-101 (1997)
U14965	recA		
U31224	ppx		Ankri, S. et al. "Mutations in the Corynebacterium glutamicum proline biosynthetic pathway: A natural bypass of the proA step," <i>J. Bacteriol.</i> , 178(15):4412-4419 (1996)
U31225	proC	L-Prolin: NADP+ 5-Oxidoreduktase	Ankri, S. et al. "Mutations in the Corynebacterium glutamicum proline biosynthetic pathway: A natural bypass of the proA step," <i>J. Bacteriol.</i> , 178(15):4412-4419 (1996)
U31230	obg; proB; unkdh	?; Gamma glutamylkinase; ähnlich den D-isomerspezifischen 2-Hydroxysäuredehydrogenasen	Ankri, S. et al. "Mutations in the Corynebacterium glutamicum proline biosynthetic pathway: A natural bypass of the proA step," <i>J. Bacteriol.</i> , 178(15):4412-4419 (1996)
U31281	bioB	Biotinsynthese	Serebriiskii, I.G. "Two new members of the bio B superfamily: Cloning, sequencing and expression of bio B genes of Methylobacillus flagellatum and Corynebacterium glutamicum," <i>Gene</i> , 175:15-22 (1996)

GenBank™ Zugangs-Nr.	Gen-Name	Genfunktion	Literaturstellen
U35023	thrR; accBC	Thiosulfat Schwefeltransferase; Acyl CoA-Carboxylase	Jager, W. et al. "A Corynebacterium glutamicum gene encoding a two-domain protein similar to biotin carboxylases and biotin-carboxyl-carrier proteins," <i>Arch. Microbiol.</i> , 166(2):76-82 (1996)
U43535	cmr	Multidrug-Resistenzprotein	Jager, W. et al. "A Corynebacterium glutamicum gene conferring multidrug resistance in the heterologous host <i>Escherichia coli</i> ," <i>J. Bacteriol.</i> , 179(7):2449-2451 (1997)
U43536	clpB	Hitzeschock-ATP-Bindungsprotein	
U53587	aphA-3	3'5"-Aminoglycosidphosphotransferase	
U89648		Nicht identifizierte Corynebacterium glutamicum-Sequenz, die an der Histidinbiosynthese beteiligt ist, partielle Sequenz	
X04960	trpA; trpB; trpC; trpD; trpE; trpG; trpL	Tryptophanoperon	Matsui, K. et al. "Complete nucleotide and deduced amino acid sequences of the <i>Brevibacterium lactofermentum</i> tryptophan operon," <i>Nucleic Acids Res.</i> , 14(24):10113-10114 (1986)
X07563	lys A	DAP-Decarboxylase (meso-diaminopimelatdecarboxylase, EC 4.1.1.20)	Yeh, P. et al. "Nucleic sequence of the lysA gene of <i>Corynebacterium glutamicum</i> and possible mechanisms for modulation of its expression," <i>Mol. Gen. Genet.</i> , 212(1):112-119 (1988)
X14234	EC 4.1.1.31	Phosphoenolpyruvatcarboxylase	Eikmanns, B.J. et al. "The Phosphoenolpyruvate carboxylase gene of <i>Corynebacterium glutamicum</i> : Molecular cloning, nucleotide sequence, and expression," <i>Mol. Gen. Genet.</i> , 218(2):330-339 (1989); Lepintec, L. et al. "Sorghum Phosphoenolpyruvate carboxylase gene family: structure, function and molecular evolution," <i>Plant. Mol. Biol.</i> , 21 (3):487-502 (1993)
X17313	fda	Fructose-bisphosphataldolase	Von der Osten, C.H. et al. "Molecular cloning, nucleotide sequence and fine-structural analysis of the <i>Corynebacterium glutamicum</i> fda gene: structural comparison of <i>C. glutamicum</i> fructose-1, 6-bisphosphate aldolase to class I and class II aldolases," <i>Mol. Microbiol.</i>
X53993	dapA	L-2, 3-Dihydrodipicolinatsynthetase (EC 4.2.1.52)	Bonnassie, S. et al. "Nucleic sequence of the dapA gene from <i>Corynebacterium glutamicum</i> ," <i>Nucleic Acids Res.</i> , 18(21):6421 (1990)

GenBank <sup>TM</sup> Zugangs-Nr.	Gen-Name	Genfunktion	Literaturstellen
X54223		AttB-verwandte Stelle	Cianciotto, N. et al. "DNA sequence homology between att B-related sites of Corynebacterium diphtheriae, Corynebacterium ulcerans, Corynebacterium glutamicum, and the attP site of lambda dacorynephage," <i>FEMS. Microbiol. Lett.</i> , 66:299-302 (1990)
X54740	argS; lysA	Arginyl-tRNA-synthetase; Diaminopimelat-decarboxylase	Marcel, T. et al. "Nucleotide sequence and organization of the upstream region of the Corynebacterium glutamicum lysA gene," <i>Mol. Microbiol.</i> , 4(11):1819-1830 (1990)
X55994	trpL; trpE	mutmaßliches Leader-Peptid; Anthranilat-synthase-Komponente 1	Heery, D.M. et al. "Nucleotide sequence of the Corynebacterium glutamicum trpE gene," <i>Nucleic Acids Res.</i> , 18(23):7138 (1990)
X56037	thrC	Threoninsynthase	Han, K.S. et al. "The molecular structure of the Corynebacterium glutamicum threonine synthase gene," <i>Mol. Microbiol.</i> , 4(10):1693-1702 (1990)
X56075	attB-verwandte Stelle	Bindungsstelle	Cianciotto, N. et al. "DNA sequence homology between att B-related sites of Corynebacterium diphtheriae, Corynebacterium ulcerans, Corynebacterium glutamicum, and the attP site of lambda dacorynephage," <i>FEMS. Microbiol. Lett.</i> , 66:299-302 (1990)
X57226	lysC-alpha; lysC-beta; asd	Aspartokinase-alpha-Untereinheit; Aspartokinase-beta-Untereinheit; Aspartat-beta-semialdehyddehydrogenase	Kalinowski, J. et al. "Genetic and biochemical analysis of the Aspartokinase from Corynebacterium glutamicum," <i>Mol. Microbiol.</i> , 5(5):1197-1204 (1991); Kalinowski, J. et al. "Aspartokinase genes lysC alpha and lysC beta overlap and are adjacent to the aspartate beta-semialdehyde dehydrogenase gene asd in Corynebacterium glutamicum," <i>Mol. Gen. Genet.</i> , 224(3):317-324 (1990)
X59403	gap;pgk; tpi	Glyceraldehyde-3-phosphat; Phosphoglyceratkinase; Triosephosphat-isomerase	Eikmanns, B.J. "Identification, sequence analysis, and expression of a Corynebacterium glutamicum gene cluster encoding the three glycolytic enzymes glyceraldehyde-3-phosphate dehydrogenase, 3-phosphoglycerate kinase, and triosephosphate isomerase," <i>J. Bacteriol.</i> , 174(19):6076-6086 (1992)
X59404	gdh	Glutamatdehydrogenase	Bornmann, E.R. et al. "Molecular analysis of the Corynebacterium glutamicum gdh gene encoding glutamate dehydrogenase," <i>Mol. Microbiol.</i> , 6(3):317-326 (1992)
X60312	lysI	L-Lysinpermease	Seep-Feldhaus, A.H. et al. "Molecular analysis of the Corynebacterium glutamicum lysI gene involved in lysine uptake," <i>Mol. Microbiol.</i> , 5(12):2995-3005 (1991)



GenBank™ Zugangs-Nr.	Gen-Name	Genfunktion	Literaturstellen
X66078	cop1	Ps1 protein	Joliff, G. et al. "Cloning and nucleotide sequence of the csp1 gene encoding PSI, one of the two major secreted proteins of <i>Corynebacterium glutamicum</i> : The deduced N-terminal region of PSI is similar to the <i>Mycobacterium</i> antigen 85 complex," <i>Mol. Microbiol.</i> , 6(16):2349-2362 (1992)
X66112	glt	Citratsynthase	Eikmanns, B.J. et al. "Cloning sequence, expression and transcriptional analysis of the <i>Corynebacterium glutamicum</i> gltA gene encoding citrate synthase," <i>Microbiol.</i> , 140:1817-1828 (1994)
X67737	dapB	Dihydrodipicolinatreductase	Peyret, J.L. et al. "Characterization of the cspB gene encoding PS2, an ordered surface-layer protein in <i>Corynebacterium glutamicum</i> ," <i>Mol. Microbiol.</i> , 9(1):97-109 (1993)
X69103	csp2	Oberflächenprotein PS2	Bonamy, C. et al. "Identification of IS1206, a <i>Corynebacterium glutamicum</i> IS3-related insertion sequence and phylogenetic analysis," <i>Mol. Microbiol.</i> , 14(3):571-581 (1994)
X69104		IS3-verwandtes Insertionselement	Patek, M. et al. "Leucine synthesis in <i>Corynebacterium glutamicum</i> : enzyme activities, structure of leuA, and effect of leuA inactivation on lysine synthesis," <i>Appl. Environ. Microbiol.</i> , 60(1):133-140 (1994)
X70959	leuA	Isopropylmalatsynthase	Eikmanns, B.J. et al. "Cloning sequence analysis, expression, and inactivation of the <i>Corynebacterium glutamicum</i> icd gene encoding isocitrate dehydrogenase and biochemical characterization of the enzyme," <i>J. Bacteriol.</i> , 177(3):774-782 (1995)
X71489	icd	Isocitratdehydrogenase (NADP+)	
X72855	GDHA	Glutamatdehydrogenase (NADP+)	Heery, D.M. et al. "A sequence from a tryptophan-hyperproducing strain of <i>Corynebacterium glutamicum</i> encoding resistance to 5-methyltryptophan," <i>Biochem. Biophys. Res. Commun.</i> , 201(3):1255-1262 (1994)
X75083, X70584	mitrA	5-Methyltryptophanresistenz	Fitzpatrick, R. et al. "Construction and characterization of recA mutant strains of <i>Corynebacterium glutamicum</i> and <i>Brevibacterium lactofermentum</i> ," <i>Appl. Microbiol. Biotechnol.</i> , 42(4):575-580 (1994)
X75085	recA		

GenBank™ Zugangs-Nr.	Gen-Name	Genfunktion	Literaturstellen
X75504	accA; thiX	partielle Isocitratlyase; ?	Reinscheid, D.J. et al. "Characterization of the isocitrate lyase gene from <i>Corynebacterium glutamicum</i> and biochemical analysis of the enzyme," <i>J. Bacteriol.</i> , 176(12):3474-3483 (1994)
X76875		ATPase beta-Untereinheit	Ludwig, W. et al. "Phylogenetic relationships of bacteria based on comparative sequence analysis of elongation factor Tu and ATP-synthase beta-subunit genes," <i>Antonie Van Leeuwenhoek</i> , 64:285-305 (1993)
X77034	tuf	Elongationsfaktor Tu	Ludwig, W. et al. "Phylogenetic relationships of bacteria based on comparative sequence analysis of elongation factor Tu and ATP-synthase beta-subunit genes," <i>Antonie Van Leeuwenhoek</i> , 64:285-305 (1993)
X77384	recA		Billman-Jacobe, H. "Nucleotide sequence of a recA gene from <i>Corynebacterium glutamicum</i> ," <i>DNA Seq.</i> , 4(6):403-404 (1994)
X78491	accB	Malatsynthase	Reinscheid, D.J. et al. "Malate synthase from <i>Corynebacterium glutamicum</i> pta-ack operon encoding phosphotransacetylase: sequence analysis," <i>Microbiology</i> , 140:3099-3108 (1994)
X80629	16S rDNA	16S ribosomale RNA	Rainey, F.A. et al. "Phylogenetic analysis of the genera <i>Rhodococcus</i> and <i>Norcardia</i> and evidence for the evolutionary origin of the genus <i>Norcardia</i> from within the radiation of <i>Rhodococcus</i> species," <i>Microbiol.</i> , 141:523-528 (1995)
X81191	gluA; gluB; gluC; gluD	Glutamat-Aufnahmesystem	Kroneneyer, W. et al. "Structure of the gluABCD cluster encoding the glutamate uptake system of <i>Corynebacterium glutamicum</i> ," <i>J. Bacteriol.</i> , 177(5):1152-1158 (1995)
X81379	dapE	Succinyldiaminopimelatesuccinylase	Wehrmann, A. et al. "Analysis of different DNA fragments of <i>Corynebacterium glutamicum</i> complementing dapE of <i>Escherichia coli</i> ," <i>Microbiology</i> , 40:3349-56 (1994)
X82061	16S rDNA	16S ribosomale RNA	Ruiny, R. et al. "Phylogeny of the genus <i>Corynebacterium</i> deduced from analyses of small-subunit ribosomal DNA sequences," <i>Int. J. Syst. Bacteriol.</i> , 45(4):740-746 (1995)
X82928	asd; lysC	Aspartatsenialdehyddehydrogenase; ?	Serebrijski, I. et al. "Multicopy suppression by asd gene and osmotic stress-dependent complementation by heterologous proA in proA mutants," <i>J. Bacteriol.</i> , 177(24):7255-7260 (1995)

GenBank™ Zugangs-Nr.	Gen-Name	Genfunktion	Literaturstellen
X82929	proA	Gamma-glutamylphosphatreduktase	Serebrijski, I. et al. "Multicopy suppression by asd gene and osmotic stress-dependent complementation by heterologous proA in proA mutants," <i>J. Bacteriol.</i> , 177(24):7255-7260 (1995)
X84257	16S rDNA	16S ribosomale RNA	Pascual, C. et al. "Phylogenetic analysis of the genus <i>Corynebacterium</i> based on 16S rRNA gene sequences," <i>Int. J. Syst. Bacteriol.</i> , 45(4):724-728 (1995)
X85965	aroP; dapE	aromatische Aminosäurepermease; ?	Wehrmann, A. et al. "Functional analysis of sequences adjacent to dapE of <i>Corynebacterium glutamicum</i> reveals the presence of aroP, which encodes the aromatic amino acid transporter," <i>J. Bacteriol.</i> , 177(20):5991-5993 (1995)
X86157	argB; argC; argD; argF; argJ	Acetylglutamatkinase; N-acetyl-gamma-glutamyl-phosphatreduktase; Acetylornithinaminotransferase; Ornithin-carbamoyltransferase; Glutamat-N-acetyltransferase	Sakanyan, V. et al. "Genes and enzymes of the acetyl cycle of arginine biosynthesis in <i>Corynebacterium glutamicum</i> : enzyme evolution in the early steps of the arginine pathway," <i>Microbiology</i> , 142:99-108 (1996)
X89084	pta; ackA	Phosphatacyltransferase; Acetatkinase	Reinscheid, D.J. et al. "Cloning, sequence analysis, expression and inactivation of the <i>Corynebacterium glutamicum</i> pta-ack operon encoding phosphotransacylase and acetate kinase," <i>Microbiology</i> , 145:503-513 (1999)
X89850	attB	Bindungsstelle	Le Marrec, C. et al. "Genetic characterization of site-specific integration functions of phi AAU2 infecting "Arthrobacter aureus C70," <i>J. Bacteriol.</i> , 178(7):1996-2004 (1996)
X90356		Promotorfragment F1	Patek, M. et al. "Promoters from <i>Corynebacterium glutamicum</i> : cloning, molecular analysis and search for a consensus motif," <i>Microbiology</i> , 142:1297-1309 (1996)
X90357		Promotorfragment F2	Patek, M. et al. "Promoters from <i>Corynebacterium glutamicum</i> : cloning, molecular analysis and search for a consensus motif," <i>Microbiology</i> , 142:1297-1309 (1996)
X90358		Promotorfragment F10	Patek, M. et al. "Promoters from <i>Corynebacterium glutamicum</i> : cloning, molecular analysis and search for a consensus motif," <i>Microbiology</i> , 142:1297-1309 (1996)

GenBank™ Zugangs-Nr.	Gen-Name	Genfunktion	Literaturstellen
X90359		Promotorfragment F13	Patek, M. et al. "Promoters from <i>Corynebacterium glutamicum</i> : cloning, molecular analysis and search for a consensus motif," <i>Microbiology</i> . 142:1297-1309 (1996)
X90360		Promotorfragment F22	Patek, M. et al. "Promoters from <i>Corynebacterium glutamicum</i> : cloning, molecular analysis and search for a consensus motif," <i>Microbiology</i> . 142:1297-1309 (1996)
X90361		Promotorfragment F34	Patek, M. et al. "Promoters from <i>Corynebacterium glutamicum</i> : cloning, molecular analysis and search for a consensus motif," <i>Microbiology</i> . 142:1297-1309 (1996)
X90362		Promotorfragment F37	Patek, M. et al. "Promoters from <i>Corynebacterium glutamicum</i> : cloning, molecular analysis and search for a consensus motif," <i>Microbiology</i> . 142:1297-1309 (1996)
X90363		Promotorfragment F45	Patek, M. et al. "Promoters from <i>Corynebacterium glutamicum</i> : cloning, molecular analysis and search for a consensus motif," <i>Microbiology</i> . 142:1297-1309 (1996)
X90364		Promotorfragment F64	Patek, M. et al. "Promoters from <i>Corynebacterium glutamicum</i> : cloning, molecular analysis and search for a consensus motif," <i>Microbiology</i> . 142:1297-1309 (1996)
X90365		Promotorfragment F75	Patek, M. et al. "Promoters from <i>Corynebacterium glutamicum</i> : cloning, molecular analysis and search for a consensus motif," <i>Microbiology</i> . 142:1297-1309 (1996)
X90366		Promotorfragment PF101	Patek, M. et al. "Promoters from <i>Corynebacterium glutamicum</i> : cloning, molecular analysis and search for a consensus motif," <i>Microbiology</i> . 142:1297-1309 (1996)
X90367		Promotorfragment PF104	Patek, M. et al. "Promoters from <i>Corynebacterium glutamicum</i> : cloning, molecular analysis and search for a consensus motif," <i>Microbiology</i> . 142:1297-1309 (1996)
X90368		Promotorfragment PF109	Patek, M. et al. "Promoters from <i>Corynebacterium glutamicum</i> : cloning, molecular analysis and search for a consensus motif," <i>Microbiology</i> . 142:1297-1309 (1996)

GenBank™ Zugangs-Nr.	Gen-Name	Genfunktion	Literaturstellen
X93513	amt	Ammonium-Transportsystem	Siewe, R.M. et al. "Functional and genetic characterization of the (methyl) ammonium uptake carrier of <i>Corynebacterium glutamicum</i> ," <i>J. Biol. Chem.</i> , 271(10):5398-5403 (1996)
X93514	betP	Glycin-Betain-Transportsystem	Peter, H. et al. "Isolation, characterization, and expression of the <i>Corynebacterium glutamicum</i> betP gene, encoding the transport system for the compatible solute glycine betaine," <i>J. Bacteriol.</i> , 178(17):5229-5234 (1996)
X95649	orf4		Patek, M. et al. "Identification and transcriptional analysis of the dapB-ORF2-dapA-ORF4 operon of <i>Corynebacterium glutamicum</i> , encoding two enzymes involved in L-lysine synthesis," <i>Biotechnol. Lett.</i> , 19:1113-1117 (1997)
X96471	lysE; lysG	Lysinexporterprotein; Lysinexportregulator-protein	Vrljic, M. et al. "A new type of transporter with a new type of cellular function: L-lysine export from <i>Corynebacterium glutamicum</i> ," <i>Mol. Microbiol.</i> , 22(5):815-826 (1996)
X96580	panB; panC; xyIB	3-Methyl-2-oxobutanoatehydroxymethyl-transferase; Pantoat-beta-alaninligase; Xylulokinase	Sahn, H. et al. "D-pantothenate synthesis in <i>Corynebacterium glutamicum</i> and use of panBC and genes encoding L-valine synthesis for D-pantothenate overproduction," <i>Appl. Environ. Microbiol.</i> , 65(5):1973-1979 (1999)
X96962		Insertionssequenz IS1207 und Transposase	
X99289		Elongationsfaktor P	Ramos, A. et al. "Cloning, sequencing and expression of the gene encoding elongation factor P in the amino-acid producer <i>Brevibacterium lactofermentum</i> ( <i>Corynebacterium glutamicum</i> ATCC 13869)," <i>Gene</i> , 198:217-222 (1997)
Y00140	thrB	Homoserinkinase	Mateos, L.M. et al. "Nucleotide sequence of the homoserine kinase (thrB) gene of the <i>Brevibacterium lactofermentum</i> ," <i>Nucleic Acids Res.</i> , 15(9):3922 (1987)
Y00151	ddh	Meso-diaminopimelat-D-dehydrogenase (EC 1.4.1.16)	Ishino, S. et al. "Nucleotide sequence of the meso-diaminopimelat D-dehydrogenase gene from <i>Corynebacterium glutamicum</i> ," <i>Nucleic Acids Res.</i> , 15(9):3917 (1987)
Y00476	thrA	Homoserindehydrogenase	Mateos, L.M. et al. "Nucleotide sequence of the homoserine dehydrogenase (thrA) gene of the <i>Brevibacterium lactofermentum</i> ," <i>Nucleic Acids Res.</i> , 15(24):10598 (1987)

GenBank™ Zugangs-Nr.	Gen-Name	Genfunktion	Literaturstellen
Y00546	hom; thrB	Homoserindehydrogenase; Homoserin-kinase	Peoples, O.P. et al. "Nucleotide sequence and fine structural analysis of the Corynebacterium glutamicum hom-thrB operon," <i>Mol. Microbiol.</i> , 2(1):63-72 (1988)
Y08964	murC; ftsQ/divD; ftsZ	UDP-N-Acetylmuramalanilase; Teilungsinitiationsprotein oder Zellteilungs- protein; Zellteilungsprotein	Honrubia, M.P. et al. "Identification, characterization, and chromosomal organization of the ftsZ gene from <i>Brevibacterium lactofermentum</i> ," <i>Mol. Gen. Genet.</i> , 259(1):97-104 (1998)
Y09163	putP	High affinity-Prolintransportsystem	Peter, H. et al. "Isolation of the putP gene of <i>Corynebacterium glutamicum</i> -proline and characterization of a low-affinity uptake system for compatible solutes," <i>Arch. Microbiol.</i> , 168(2):143-151 (1997)
Y09548	pyc	Pyruvatcarboxylase	Peters-Wendisch, P.G. et al. "Pyruvate carboxylase from <i>Corynebacterium glutamicum</i> : characterization, expression and inactivation of the pyc gene," <i>Microbiology</i> , 144:915-927 (1998)
Y09578	leuB	3-Isopropylmalatdehydrogenase	Patek, M. et al. "Analysis of the leuB gene from <i>Corynebacterium glutamicum</i> ," <i>Appl. Microbiol. Biotechnol.</i> , 50(1):42-47 (1998)
Y12472		Bindungsstelle Bacteriophage Phi-16	Moreau, S. et al. "Site-specific integration of corynebophage Phi-16: The construction of an integration vector," <i>Microbiol.</i> , 145:539-548 (1999)
Y12537	proP	Prolin/Ectoin-Aufnahmesystemprotein	Peter, H. et al. "Corynebacterium glutamicum is equipped with four secondary carriers for compatible solutes: Identification, sequencing, and characterization of the proline/ectoine uptake system, ProP, and the ectoine/proline/glycine betaine carrier, EctP," <i>J. Bacteriol.</i> , 180(22):6005-6012 (1998)
Y13221	glnA	Glutaminsynthetase I	Jakoby, M. et al. "Isolation of <i>Corynebacterium glutamicum</i> glnA gene encoding glutamine synthetase I," <i>FEMS Microbiol. Lett.</i> , 154(1):81-88 (1997)
Y16642	lpd	Dihydrolipoamiddehydrogenase	
Y18059		Bindungsstelle Corynebophage 304L	Moreau, S. et al. "Analysis of the integration functions of &phi;304L: An integrase module among corynebophages," <i>Virology</i> , 255(1):150-159 (1999)
Z21501	argS; lysA	Arginyl-tRNA-Synthetase; Diaminopimelatdecarboxylase (partiell)	Oguiza, J.A. et al. "A gene encoding arginyl-tRNA synthetase is located in the upstream region of the lysA gene in <i>Brevibacterium lactofermentum</i> : Regulation of argS-lysA cluster expression by arginine," <i>J. Bacteriol.</i> , 175(22):7356-7362 (1993)

GenBank™ Zugangs-Nr.	Gen-Name	Genfunktion	Literaturstellen
Z21502	dapA; dapB	Dihydrodipicolinatsynthase; Dihydrodipicolinatreduktase	Pisabarro, A. et al. "A cluster of three genes (dapA, orf2, and dapB) of Brevibacterium lactofermentum encodes dihydrodipicolinate reductase, and a third polypeptide of unknown function," <i>J. Bacteriol.</i> , 175(9):2743-2749 (1993)
Z29563	thrC	Threoninsynthase	Malumbres, M. et al. "Analysis and expression of the thrC gene of the encoded threonine synthase," <i>Appl. Environ. Microbiol.</i> , 60(7):2209-2219 (1994)
Z46753	16S rDNA	Gene für 16S ribosomale RNA	
Z49822	sigA	SigA-Signalfaktor	Oguiza, J.A. et al. "Multiple sigma factor genes in Brevibacterium lactofermentum: Characterization of sigA and sigB," <i>J. Bacteriol.</i> , 178(2):550-553 (1996)
Z49823	galE; dtxR	Katalytische Aktivität UDP-Galactose 4-epimerase; Diphtherietoxin-regulatorisches Protein	Oguiza, J.A. et al. "The galE gene encoding the UDP-galactose 4-epimerase of Brevibacterium lactofermentum is coupled transcriptionally to the dmdR gene," <i>Gene</i> , 177:103-107 (1996)
Z49824	orf1; sigB	?; SigB-Signalfaktor	Oguiza, J.A. et al. "Multiple sigma factor genes in Brevibacterium lactofermentum: Characterization of sigA and sigB," <i>J. Bacteriol.</i> , 178(2):550-553 (1996)
Z66534		Transposase	Correia, A. et al. "Cloning and characterization of an IS-like element present in the genome of Brevibacterium lactofermentum ATCC 13869," <i>Gene</i> , 170(1):91-94 (1996)

- 1) Eine Sequenz für dieses Gen wurde in den angegebenen Literaturstellen veröffentlicht. Die von den Erfindern der vorliegenden Erfindung erhaltene Sequenz ist jedoch erheblich länger als die veröffentlichte Version. Man nimmt an, daß die veröffentlichte Version auf einem inkorrekten Startcodon beruht und somit nur ein Fragment des tatsächlichen codierenden Bereichs darstellt.

TABELLE 3: Corynebacterium- und Brevibacterium-Stämme, die sich in der erfindungsgemäßen Praxis einsetzen lassen.

Gattung	Art	ATCC	FERM	NRRL	CECT	NCIMB	CBS	NCTC	DSMZ
Brevibacterium	ammoniaenes	21054							
Brevibacterium	ammoniaenes	19350							
Brevibacterium	ammoniaenes	19351							
Brevibacterium	ammoniaenes	19352							
Brevibacterium	ammoniaenes	19353							
Brevibacterium	ammoniaenes	19354							
Brevibacterium	ammoniaenes	19355							
Brevibacterium	ammoniaenes	19356							
Brevibacterium	ammoniaenes	21055							
Brevibacterium	ammoniaenes	21077							
Brevibacterium	ammoniaenes	21553							
Brevibacterium	ammoniaenes	21580							
Brevibacterium	ammoniaenes	39101							
Brevibacterium	butanicum	21196							
Brevibacterium	divaricatum	21792	P928						
Brevibacterium	flavum	21474							
Brevibacterium	flavum	21129							
Brevibacterium	flavum	21518							
Brevibacterium	flavum			B11474					
Brevibacterium	flavum			B11472					
Brevibacterium	flavum	21127							
Brevibacterium	flavum	21128							
Brevibacterium	flavum	21427							
Brevibacterium	flavum	21475							
Brevibacterium	flavum	21517							
Brevibacterium	flavum	21528							
Brevibacterium	flavum	21529							



Gattung	Art	ATCC	FERM	NRRL	CECT	NCIMB	CBS	NCTC	DSMZ
Brevibacterium	flavum			B11477					
Brevibacterium	flavum			B11478					
Brevibacterium	flavum	21127							
Brevibacterium	flavum			B11474					
Brevibacterium	healii	15527							
Brevibacterium	ketoglutamicum	21004							
Brevibacterium	ketoglutamicum	21089							
Brevibacterium	ketosoreductum	21914							
Brevibacterium	lactofermentum				70				
Brevibacterium	lactofermentum				74				
Brevibacterium	lactofermentum				77				
Brevibacterium	lactofermentum	21798							
Brevibacterium	lactofermentum	21799							
Brevibacterium	lactofermentum	21800							
Brevibacterium	lactofermentum	21801							
Brevibacterium	lactofermentum			B11470					
Brevibacterium	lactofermentum			B11471					
Brevibacterium	lactofermentum	21086							
Brevibacterium	lactofermentum	21420							
Brevibacterium	lactofermentum	21086							
Brevibacterium	lactofermentum	31269							
Brevibacterium	linens	9174							
Brevibacterium	linens	19391							
Brevibacterium	linens	8377							
Brevibacterium	paraffinolyticum					11160			
Brevibacterium	spec.						717.73		
Brevibacterium	spec.						717.73		
Brevibacterium	spec.	14604							
Brevibacterium	spec.	21860							
Brevibacterium	spec.	21864							

Gattung	Art	ATCC	FERM	NRRL	CECT	NCIMB	CBS	NCTC	DSMZ
Brevibacterium	spec.	21865							
Brevibacterium	spec.	21866							
Brevibacterium	spec.	19240							
Corynebacterium	acetoacidophilum	21476							
Corynebacterium	acetoacidophilum	13870							
Corynebacterium	acetoglutamicum			B11473					
Corynebacterium	acetoglutamicum			B11475					
Corynebacterium	acetoglutamicum	15806							
Corynebacterium	acetoglutamicum	21491							
Corynebacterium	acetoglutamicum	31270							
Corynebacterium	acetophilum			B3671					
Corynebacterium	ammoniaenes	6872						2399	
Corynebacterium	ammoniaenes	15511							
Corynebacterium	fujikense	21496							
Corynebacterium	glutamicum	14067							
Corynebacterium	glutamicum	39137							
Corynebacterium	glutamicum	21254							
Corynebacterium	glutamicum	21255							
Corynebacterium	glutamicum	31830							
Corynebacterium	glutamicum	13032							
Corynebacterium	glutamicum	14305							
Corynebacterium	glutamicum	15455							
Corynebacterium	glutamicum	13058							
Corynebacterium	glutamicum	13059							
Corynebacterium	glutamicum	13060							
Corynebacterium	glutamicum	21492							
Corynebacterium	glutamicum	21513							
Corynebacterium	glutamicum	21526							
Corynebacterium	glutamicum	21543							
Corynebacterium	glutamicum	13287							

Gattung	Art	ATCC	FERM	NRRL	CECT	NCIMB	CBS	NCTC	DSMZ
Corynebacterium	glutamicum	21851							
Corynebacterium	glutamicum	21253							
Corynebacterium	glutamicum	21514							
Corynebacterium	glutamicum	21516							
Corynebacterium	glutamicum	21299							
Corynebacterium	glutamicum	21300							
Corynebacterium	glutamicum	39684							
Corynebacterium	glutamicum	21488							
Corynebacterium	glutamicum	21649							
Corynebacterium	glutamicum	21650							
Corynebacterium	glutamicum	19223							
Corynebacterium	glutamicum	13869							
Corynebacterium	glutamicum	21157							
Corynebacterium	glutamicum	21158							
Corynebacterium	glutamicum	21159							
Corynebacterium	glutamicum	21355							
Corynebacterium	glutamicum	31808							
Corynebacterium	glutamicum	21674							
Corynebacterium	glutamicum	21562							
Corynebacterium	glutamicum	21563							
Corynebacterium	glutamicum	21564							
Corynebacterium	glutamicum	21565							
Corynebacterium	glutamicum	21566							
Corynebacterium	glutamicum	21567							
Corynebacterium	glutamicum	21568							
Corynebacterium	glutamicum	21569							
Corynebacterium	glutamicum	21570							
Corynebacterium	glutamicum	21571							
Corynebacterium	glutamicum	21572							
Corynebacterium	glutamicum	21573							

Gattung	Art	ATCC	FERM	NRRL	CECT	NCIMB	CBS	NCTC	DSMZ
Corynebacterium	glutamicum	21579							
Corynebacterium	glutamicum	19049							
Corynebacterium	glutamicum	19050							
Corynebacterium	glutamicum	19051							
Corynebacterium	glutamicum	19052							
Corynebacterium	glutamicum	19053							
Corynebacterium	glutamicum	19054							
Corynebacterium	glutamicum	19055							
Corynebacterium	glutamicum	19056							
Corynebacterium	glutamicum	19057							
Corynebacterium	glutamicum	19058							
Corynebacterium	glutamicum	19059							
Corynebacterium	glutamicum	19060							
Corynebacterium	glutamicum	19185							
Corynebacterium	glutamicum	13286							
Corynebacterium	glutamicum	21515							
Corynebacterium	glutamicum	21527							
Corynebacterium	glutamicum	21544							
Corynebacterium	glutamicum	21492							
Corynebacterium	glutamicum			B8183					
Corynebacterium	glutamicum			B8182					
Corynebacterium	glutamicum			B12416					
Corynebacterium	glutamicum			B12417					
Corynebacterium	glutamicum			B12418					
Corynebacterium	glutamicum			B11476					
Corynebacterium	glutamicum	21608							
Corynebacterium	lilium		P973						
Corynebacterium	nitrophilus	21419				11594			
Corynebacterium	spec.		P4445						
Corynebacterium	spec.		P4446						

Gattung	Art	ATCC	FERM	NRRL	CECT	NCIMB	CBS	NCTC	DSMZ
Corynebacterium	spec.	31088							
Corynebacterium	spec.	31089							
Corynebacterium	spec.	31090							
Corynebacterium	spec.	31090							
Corynebacterium	spec.	31090							
Corynebacterium	spec.	15954							20145
Corynebacterium	spec.	21857							
Corynebacterium	spec.	21862							
Corynebacterium	spec.	21863							

ATCC: American Type Culture Collection, Rockville, MD, USA

FERM: Fermentation Research Institute, Chiba, Japan

NRRL: ARS Culture Collection, Northern Regional Research Laboratory, Peoria, IL, USA

CECT: Coleccion Espanola de Cultivos Tipo, Valencia, Spain

NCIMB: National Collection of Industrial and Marine Bacteria Ltd., Aberdeen, UK

CBS: Centraalbureau voor Schimmelcultures, Baarn, NL

NCTC: National Collection of Type Cultures, London, UK

DSMZ: Deutsche Sammlung von Mikroorganismen und Zellkulturen, Braunschweig, Germany

siehe Sugawara, H. et al. (1993) World directory of collections of cultures of microorganisms: Bacteria, fungi and yeasts (4. Aufl.), World federation for culture collections world data center on microorganisms, Saimata, Japan.

RXN01071 translatiert von RXN01071 ( 172 ) von 1 bis 2064

LVVDSSGRYNVTITGLTTTETDSATALNLQMSEAGYLERYTDGATVPSVMLSADGTTTPQELVDALAAELGSNFDVETGEALV  
EQATGMITQALSFVQYFLVAFGLIALLVGTFIIANTFSMIVAQRMREFALLRALGAAPGQITRSVVLEATIVGLFGSALGVLG  
GMGLVAIISAVLNNLGMPPMGSSVGLTPSAVVVALVLGTVVTIVSAWAPARRAGEVKPVEAMRNMETTTMRSMMGRTITGGIVL  
ALGIIFAIAGAMMTDSSTATRSILVGIGALFVIVGTFLFSPALSMPPVVGGLGKVI GAPFGSVGSLAATNSKRNPRTATTAFA  
LTLGIALVTAIGMLSATMKDAVSDMMAEQYTADYILOQPTNGSITMPKESVNDVRDAEGVADVVLVSMNSASVNGQASYSQLG  
QSVTFVADGDL SKVISTESIDGSLDLNPGVVNTQTFADENGWAVGDTLQLESMGQTIGDIELIGTFTGNDAIGNMI ISESSL  
ADTPAADTAVPQMMLLVVGEEGFDKEQLRTNLEDAVADYIVISVKSATEFAGETVAMIDTMMNILYALLALSIVIVAIIGIINTL  
ALNVIERRQEIGMLRAVGVKRQVVRTMITLESVQIAIYGAVIGIAIGLGLGWAFVTVMSGEGLDAAVSI PWGQVGLMLVGS AV  
VGVI AALWPAVKASRTPPLDAITD

RXN01071 - 5'-Region

CACCTGAATTGGCTGAGGGAGAGGCACCGACTGGCACCGAAGAGGTGCTTGCCTCGAAGGCGGGCGCTGAGGCGAATGGCCTG  
GAGTAGGGGACCAGATC

RXN01071 - kodierende Region

TTGGTCGTGGACTCCAGTGGCCGCTACAACGTCACCATCACAGGCCTGACCACCACTGAGACGGATTTCGGCCACCGCGCTGAA  
CCTGCAGATGTCGGAAGCTGGCTACCTGGAGCGTTACACCGACGGGGCTACCGTCCCCAGCGTCATGCTGTGCGCTGCAGATG  
GCACCACGCCTCAAGAGCTTGTGACGCCCCTCGCTGCCGAACCTGGATCGAACTTTGATGTAGAAACCGGCGAAGCGCTAGTC  
GAGCAGGCTACAGGAATGATCACGCAGGCCTTGAGCTTCGTGCAGTACTTCCTCGTTGCCTTCGGTCTCATTGCACTGCTGGT  
TGGTACCTTCATCATCGCGAATACCTTCTCCATGATTGTGGCTCAGCGCATGCGTGAGTTCGCTCTCCTGCGAGCCCTGGGTG  
CGGCGCCAGGACAGATCACTCGCTCTGTGGTGTGCTGGAAGCAACCATCGTTGGCCTCTTCGGCTCTGCTCTTGGTGTGCTGGGT  
GGTATGGGCCCTCGTAGCGATCATTTTCAGCTGTCCCTCAATAACCTGGGCATGCCGATGGGATCCAGCGTTGGCTTGACTCCTTC  
TGCAGTGGTTACCGCGCTCGTATTGGGCACCGTTGTCACCATTGTGAGCGCGTGGGCTCCGGCTCGTCGTGCAGGTGAGGTTA  
AGCCTGTTGAAGCGATGCGCAACATGGAAACCACCACCTATGCGTTCCATGATGGGGCGCACGATCACCGGTGGCATCGTTCTA  
GCACTCGGCATCATCTTTGCGATTGCCGGTGCGATGATGACTGATTCTTCCACCGCTACTCGTTCCATCCTGGTGGGCATTGG  
TGCACTGTTTGTATCGTGGGTACGTTCTCTCTCACCAGCGCTCTCCATGCCTGTGGTGGGTGGCCTGGGCAAGGTTATCG  
GTGCACCGTTTGGCAGCGTTGGAAGCCTTGCTGCGACCAACTCCAAGCGAAACCCTCGCCGTACCGCAACTACAGCGTTGCGA  
CTGACGTTGGGCATTGCCTTAGTGACTGCAATTGGCATGCTTTCTGCAACCATGAAGGACGCAGTCTCCGACATGATGGCGGA  
GCAGTACACCGCAGATTACATCCTGCAGGGACCAACCAACGGTTCCATCACCATGCCGAAGGAATCTGTCAATGATGTTGCGG  
ATGCTGAGGGCGTTGCCGATGTGCTGCTCGTTTCCATGAACTCTGCCTCGGTGAACGGTCAGGCTTCATACAGCCAGCTGGGC  
CAGTCTGTAACCTTTGTGCTGACGGCGACCTGAGCAAGGTCATCAGCACAGAAAGCATTGATGGCTCCCTCGACTTGAGCAA  
CCCAGGTGTTGTGACTAACCAGACGTTTGTGATGAAAACGGCTGGGCAGTAGGCGATACTCTGCAGCTTGAATCAATGGGGC  
AGACCATCGGCGATATCGAGTTGATCGGTACCTTCACCGGAAACGACGCCATCGGAAATATGATCATCTCCGAAAGTTCCCTTG  
GCTGATACACCAGCGGCAGACACTGCTGTTCCCTCAGATGATGCTGGTGGTAGGCGAAGAAGGCTTTGATAAGGAACAACCTGCG  
CACCAACTTGGAAGACGCAGTCGCTGATTACATTGTCATCTCTGTGAAATCAGCAACCGAGTTTCGCTGGTGAACGGTTGCGA  
TGATCGACACCATGATGAACATTCTGTACGCGCTGCTTGTCTGTCTGTCTGTTGCCATCATCGGCATCATCAACACCCTG  
GCACTGAATGTGATCGAGCGTCGCCAGGAGATCGGTATGCTCCGCGCAGTTGGCGTGAAGCGCGGACAGGTCCGCACCATGAT  
CACCTTAGAATCTGTTTCAGATCGCCATCTACGGTGCTGTGATTGGTATCGCGATTGGTCTTGGTCTGGGCTGGGCCTTTGTGA  
CAGTGATGTCAGGCGAAGGACTAGACGCTGCGGTTAGTATCCCGTGGGGTCAGGTGCGGACTGATGCTTGTGGTTCCGCTGTA  
GTCGGTGTTATCGCCGCGCTGTGGCCGGCAGTCAAGGCATCTAGGACACCACCTTTGGATGCGATTACCGAC

RXN01071 - 3'-Region

TAGTTTTAGCGGCAGTTGAATCA

RXN01016 translatiert von RXN01016 ( 586 ) von 1 bis 648

LLPYAIVGLVILLPSSWLPRWAVAVLGEVSLVPAVVFGGGFLLIPSMFLIGSALVRYGVVDRAENAPRAMGVFFAVSAAIAIP  
TLIIQARDITSSGFSIVSTVAGLALGGVYISLVLLALHTPIRGALAAVFAPLGRMALTNYIGATILMLIGGLIVDLPHSTSWT  
ATVLLAAGILIIQELLSALWLRHYTQGPLGYLWRVWTWGSRSPLTRSAS

RXN01016 - 5'-Region

TGCCCCGTCGAGGTGAACGCCCAAGAATAGTTCTCTTTCGTCGACTTCTCACGTTGATACCGCTCGGCATCATCCACCAAATTC  
TCCAGCCGGGTGAAGCA

RXN01016 - kodierende Region

TTGTTGCCGTATGCAATAGTCGGCCTGGTCATTTTGCTGCCATCCTCCTGGTTGCCTCGTTGGGCTGTGCGAGTCCTTGGCGA  
AGTGTCGCTTGTGCCAGCGGTGGTTTTTCGGTGGCGGGTTCCTGCTTATCCCCCTCAATGTTCTTGATCGGTTTCAGCGCTCGTTA  
GGTATGGAGTAGTCGATCGGGCAGAGAACGCACCGCGGGCTATGGGAGTCTTTTTTCGCCGTAAGCGCAGCAATCGCTATACCT  
ACGCTGATCATCCAGGCACGTGACATCACTTCTTCAGGCTTCTCGATCGTTTCCACAGTGGCGGGACTCGCGCTTGGCGGCGT  
CTACATTTCTTTAGTGTTGCTGGCCTTGCATACACCGATTTCGCGGTGCACTCGCTGCAGTTTTTCGCACCTTTAGGGCGTATGG  
CGCTAACCAACTACATTGGTGCAACGATCCTCATGCTCATTGGCGGGCTAATCGTGGATCTTCCACACAGCACATCATGGACA  
GCTACGGTGCTCCTAGCTGCGGGTATTCTCATTATTCAAGAGCTACTTTCTGCTTTATGGTTGCGCCACTACACACAGGGGCC  
ACTTGGGTATCTATGGCGTTGGGTGACTTGGGGAAGCCGTTCCCCCTTCCTTACCCGTTCCGCATCA

RXN01016 - 3'-Region

TGACAGGTACGGAAGTGTCTTAC

RXN01004 translatiert von RXN01004 ( 9066 ) von 1 bis 1062

VSIWATVLLIIVLLSANAFFVAAEFALISSRRDRDLSLVSQKKGAEKVLYATEHLSIMLAGAQFGITVCSLILGKVAEPAIA  
HFIEVPFTSWGVPNDLIHPISFVIALAIITWLHILFGEMVPKNIAIAGPETLGMWLAPVLI AFVKITRPLIEFMNWIARLTLR  
AFGVEQKNELDSTVDPEQLASMISESRSEGLLDAAEHARLSKALRSEQRSIKELVIKDEDVRTLAFGKSGPTLHQLEEAVRET  
GFSRFPVTGRDGSYLGYYIHKDILPRLADPEMDPSETIPRSALRPLSNVDADGLMDDVLD FMHYRSAHMAQVRLKGELLGVIT  
LEDLIEEYVGTVDWTHESDD

RXN01004 - 5'-Region

CCGGACGCTGGATCGCACGAGTAACGGTCATGGAAGATCGACGCATCGACAAAGCCGTTCTCACCCCCATCACCCATGAAGAA  
GCAAAGGAGTACGAAAA

RXN01004 - kodierende Region

GTGAGTATTTGGGCAACTGTCCTTCTAATTATCGTCCTTCTTTCCGCCAACGCCTTCTTCGTGGCCGCGGAGTTCGCACTGAT  
TTCTTCGCGCCGGGACCGCCTGGATTCCCTGGTATCCCAGGGTAAAAAGGGAGCTGAAAAGGTTCTCTACGCAACCGAGCACC  
TCTCCATCATGTTGGCGGGCGCTCAGTTCGGTATTACGGTCTGTCTCTGATTCTGGGTAAAGTCGCAGAACCTGCGATCGCC  
CACTTCATTGAGGTGCCTTTCACCTCCTGGGGTGTTCCAAATGATTTGATCCACCCAATTTCTTCGTATCGCACTGGCGAT  
CATCACCTGGTTGCACATTCTCTTTGGTGAAATGGTGCCAAAGAACATCGCTATTGCTGGCCCTGAAACCTTAGGCATGTGGC  
TTGCTCCAGTGCTCATTGCGTTTGTGAAGATTACCCGCCCGTTGATCGAGTTCATGAACTGGATCGCCCGTCTGACCCTTCGC  
GCCTTTGGTGTGGAGCAAAAAACGAGCTGGATTCCACCGTGGACCCAGAGCAGCTGGCATCAATGATTTCCGAGTCCCGTTC  
CGAAGGCCTCCTTGATGCTGAAGAGCACGCCCGCTGTCCAAGGCGCTGCGCTCTGAGCAGCGTTCATCAAGGAAGTGGTGA  
TTAAGGATGAGGACGTGCGCACGCTGGCGTTTCGGTAAATCTGGCCCCGACCTTGCACCAAGTTGGAGGAAGCAGTCCGCGAGACC  
GGTTTCTCCCGCTTCCCTGTCACCGGCCGCGATGGATCCTACTTGGGTTATATCCACATCAAGGATATTTTGCCTCGTCTGGC  
TGATCCTGAGATGGATCCCTCCGAGACCATTCGCGTTCCTGCACTGCGCCCTTTGAGCAATGTGGATGCCGACGGCCTCATGG  
ATGACGTCTTGGATTTTATGCACTACCGCTCCGCGCACATGGCTCAGGTTGCGCTCAAAGGTGAGCTTCTCGGCGTGATTACG  
CTGGAGGATCTCATCGAAGAATACGTGGGCACCGTCAACGATTGGACTCACGAAAGCTCCGACGAC

RXN01004 - 3'-Region

TAGAAATAGTAACTGTGTTGGAC



RXN00991 translatiert von RXN00991 ( 2362 ) von 1 bis 1380

MDILISILSLLGFVLLTASTGLFVAIEFALTGLEKSTVETHVKQKGDSSARAVQRDHQNLFSVLGAQLGITITTLATGFLAE  
PVLAKFFTPALELVGLNESASSAVALIIALLVATTLMSVFGELVPKNWAITNPLGVARFVVHPVNWFMVLKPFINGMNKSAN  
FIVRKLGIPEAEELASARSSQELTALVRSSAESGGLDQNTAAVINRSLQFGDATADEFMTPRSTIESLRATDTVNDLIELALE  
TGHSRFPVTEGDLDETIGMVHIKDAFSVVQAERATTMVRDLARKIPVVPASLDGDSVLNAVRSAGSQVILVADEYGGTAGMVT  
IEDVVEEILGEIHDEHDDSDAERDFQQFGASWEVSGLVRIDELEKRVGYVSPDGPYETLGGGLIMYTVGAI PRVGDVALLPLTD  
TPTMDEFESGFSGRWIARVTVMEDRRIDKAVLTPITHEEAKEYEK

RXN00991 - 5'-Region

ACTTCAAGGAAAAGACGGTCCCAAGAGCTAAAACTCCCCACGGCACGCGAAGCTGAACAGGCTTTCACCGCTTCTAAGGGCAA  
CAGCTTAAACCACGCTA

RXN00991 - kodierende Region

ATGGACATACTCATAAGCATCCTCTCACTGCTAGGCTTCGTGCTTCTTACCGCGAGCACCGGACTATTTCGTGGCCATTGAGTT  
CGCACTCACCGGCTTAGAAAAATCCACTGTAGAAACACATGTGAAGCAAAAAGGCGACAGCAGCGCCCGCGCAGTGCAGAGGG  
ATCATCAAAAATCTGTCGTTTCGTGCTCTCTGGTGCCCGAGCTGGGCATCACGATCACGACACTTGCCACAGGCTTCCTCGCAGAG  
CCGGTTTTTGCCCAAATTCCTCACCCAGCACTTGAGCTGGTGGGATTAAATGAATCAGCAAGCTCCGCAGTAGCCCTCATCAT  
CGCACTGTTGGTGGCAACTACCCCTCTCCATGGTTTTTGGTGAGTTGGTTCCCAAAAACCTGGGCGATCACCAACCCGTTGGGCG  
TGGCACGTTTTGTTGTCCACCCTGTCAATTGGTTCAACATGGTTCTCAAGCCGTTTATTAACGGCATGAACAAGTCTGCAAAC  
TTTATTGTCCGCAAACCTGGTATTGAACCAGCCGAAGAGCTTGCCCTCTGCCCGTTTCTCCCAAGAGCTCACCGCCTTGGTACG  
CAGCTCCGCGGAAAGCGGCGGACTGGATCAAAACACCGCAGCGGTGATCAACCGATCCCTGCAGTTCGGTGACGCCACCGCTG  
ATGAATTCATGACACCTCGCTCCACCATTGAATCATTGCGTGCCACAGACACCGTCAATGATTTGATCGAGCTTGCCCTGGAA  
ACGGGTCACTCCCGCTTCCCAGTCACCGAAGGCGACTTGGATGAAACCATCGGCATGGTCCACATCAAGGACGCATTCTCTGT  
AGTGACAGGCAGAACGCGCCACCACCATGGTGCGCGATCTAGCCCGCAAATTCCTGTGGTACCAGCCAGCCTTGACGGCGACT  
CTGTCTCAACGCTGTCCGCTCCGCCGGCTCCCAAGTTATTTGGTTGCCGATGAATACGGCGGAACCGCAGGCATGGTCACC  
ATCGAAGACGTCGTGGAGGAAATCCTCGGCGAAATCCACGATGAGCACGACGACTCCGACGCCGAACGCGATTTCACAACAATT  
CGGCGCCAGCTGGGAAGTCTCCGGCCTGGTCCGCATCGATGAACTCGAAAAACGCGTCGGGTACGTCTCCCCCTGACGGCCCCCT  
ACGAAACCCCTCGGCGGCTTGATCATGTACACAGTCGGCGCCATTCTCGCGTCGGCGATGTGCCCCACTCCCACTGACCGAT  
ACCCCAACCATGGATGAATTCGAATCCGGCTTCTCCGGACGCTGGATCGCACGAGTAACGGTCATGGAAGATCGACGCATCGA  
CAAAGCCGTTCTCACCCCCATCACCCATGAAGAAGCAAAGGAGTACGAAAAG

RXN00991 - 3'-Region

TGAGTATTTGGGCAACTGTCCTT

RXN00959 translatiert von RXN00959 ( 3462 ) von 1 bis 456

MTVIGIILGSLFGVLAVLLIVVGALGWAAKLPGNPVVGIRVPEVRKSQELWDMHRVAGPLWVLSGVSFVIASLVAFVASGWM  
WLVVALGVEAAIAFIGMGAGMAAHTVAMVDAKRIRETPQAPVSAEIEEAGGVTTITSADYQQDSAEC PQD

RXN00959 - 5'-Region

TTTGGAGGCGGAGCATCATACCTTTTAATGTCAGGATCGTGCAGTGAAGAATTCAGGATGAATTACTCGCTGGAATATTGGTG  
GGGATAGAGTTGTTGTT

RXN00959 - kodierende Region

ATGACGGTGATCGGAATTATTCTTGGCAGCCTTTTGGCGTTCCTGCAGTCCTTCTCATCGTGGTTGGTGCTTTGGGGTGGGC  
GGCTAAGCTCCCTGGCAACCCGGTTGTGGGCATTCGTGTCCCTGAGGTGCGTAAATCCCAAGAATTGTGGGATATGGCGCACC  
GTGTCGCTGGCCCGTTGTGGGTGCTGTCGGGAGTTTCCTTTGTTATTGCATCGCTAGTTGCGTTTGTGCTTCTGGTTGGATG  
TGGCTTGTGTGGCGTTGGGTGTTGAGGCTGCCATCGCGTTCATTGGTATGGGTGCGGGTATGGCTGCACATACTGTTGCGAT  
GGTTGACGCGAAGCGCATTCGCGAAACCCGCGAGGCGCCTGTTTCCGCTGAAATTGAAGAGGCCGGTGGTGTGACTATTACCT  
CTGCCGATTATCAACAAGACTCCGCTGAATGCCCCCAAGAT

RXN00959 - 3'-Region

TGACTTGGATGCAGTGCGTAGAG

RXN00953 translatiert von RXN00953 ( 8687 ) von 1 bis 753

MAPPTVGNYIMQSFTQGLQFGVAVAVILFGVRTILGELVPAFQGIAAKVVPGAIPALDAPIVFPYAQNAVLIGFLSSFVGGGLV  
GLTVLASWLNPAFGVALILPGLVPHFFTGGAAGVYGNATGGRRGAVFGAFANGLLITFLPAFLLGLVLSFGSENTTFGDADFG  
WFGIVVGSAAKVEGAGGLILLIIAAVLLGGAMVVFQKRVVNGHWD PAPNRERVEKAEADATPTAGARTYPKIAPPAGAPTPPA  
RS

RXN00953 - 5'-Region

CTTGCAATCCCCA

RXN00953 - kodierende Region

ATGGCGCCACCAACGGTAGGCAACTACATCATGCAGTCCTTCACTCAAGGTCTGCAGTTCGGCGTTGCAGTTGCCGTGATTCT  
CTTTGGTGTC CGCACCATTCCTTGGTGAAGTGGTCCCCGCATTCCAAGGTATTGCTGCGAAGGTGTTCCCGGAGCTATCCCCG  
CATTGGATGCACCGATCGTGTTCCCCTACGCGCAGAACGCCGTTCTCATTTGGTTTCTTGTCTTCTTTCGTCGGTGGCTTGGTT  
GGCTGACTGTTCTTGCATCGTGGCTGAACCCAGCTTTTGGTGTGCGGTTGATTCTGCCTGGTTTGGTCCCCCACTTCTTCAC  
TGGTGGCGCGGCGGGCGTTTACGGTAATGCCACGGGTGGTCTGAGGAGCAGTATTTGGCGCCTTTGCCAACGGTCTTCTGA  
TTACCTTCCTCCCTGCTTTCCCTGCTTGGTGTGCTTGGTTCCTTCGGGTCAGAGAACACCACTTTCCGGTGATGCGGACTTTGGT  
TGGTTCGGAATCGTTGTTGGTTCTGCAGCCAAGGTGGAAGGTGCTGGCGGGCTCATCTTGTGCTCATCATCGCAGCGGTTCT  
TCTGGGTGGCGCGATGGTCTTCCAGAAGCGCGTCTGAATGGGCACTGGGATCCAGCTCCCAACCGTGAGCGCGTGGAGAAGG  
CGGAAGCTGATGCCACTCCAACGGCTGGGGCTCGGACCTACCTAAGATTGCTCCTCCGGCGGGCGCTCTACCCACCGGCT  
CGAAGC

RXN00953 - 3'-Region

TAAGATCTCCAAAACCCTGAGAT

RXN00945 translatiert von RXN00945 ( 2895 ) von 1 bis 972

MLERLKRLDPLIVLIVLAVIVAVIIIPVRGVAADWFDVAVKIAIALLFLLYGARLSTQEALNGLKHWRLHLTILAITFGIFPLI  
GIGLEPMTAFVSEDIYRGILFLTLVPSTVQSSVAFTSIAGNVAGAIVSASLSNLAGVFLTPLLVMLIMSAGGGVHVDSQVFL  
DIAIQLLLPLFILGQVCRRWVKNFANAKATKIVDRGSIAMVVYSAFSAGMVAGIWSVSVLEIIVLIVFAILLVMAMLWFTLFM  
ATRLGFNRADSIQFCGKTKSLATGLEPMAAVIFGGANIGLLILPLMIFHQVQLMICAWLAARYGRDAQEQKANA

RXN00945 - 5'-Region

TCACAGTACCACCCACAAGCCACAAGGAGGGTATGGAGGTGGGCGTCTAAAGCCAAATTTTTCCCGGTGTTTGAGGCGATTGC  
ACCGTACACTAATGTGC

RXN00945 - kodierende Region

ATGCTTGAACGCCTCAAACGCCTAGATCCGCTCATTGTCCTCATTGTGCTGGCTGTCATTGTGGCGATCATCATTCCAGTTCCG  
CGGGGTTGCTGCGGATTGGTTTGATGTGCGCCGTCAAGATTGCCATTGCGCTGCTGTTTTTCTTTATGGTGCCCGCTATCCA  
CCCAAGAGGCGCTGAATGGTCTGAAGCACTGGAGGCTTCACCTGACTATTTTGGCGATCACTTTCGGAATATCCCACTTATC  
GGCATTGGGCTCGAGCCGATGACTGCATTTGTGTGCGGAAGATATTTATCGGGGAATTTTGTTCCTCACGCTCGTTCCGTCCAC  
CGTGCAGTCATCGGTGGCGTTTACCTCGATCGCTAAAGGCAACGTAGCTGGTGCGATTGTGTGCGCATCGCTCTCCAACCTTG  
CGGGTGTTCCTCACTCCGCTGCTGGTCATGCTCATGTCTGCGGGCGGGGAGTTCACGTGGATTCCCAGGTCTTCCTC  
GACATTGCGATTACAGCTTCTGCTGCCGTTTCATCCTCGGCCAGGTATGTAGGCGTTGGGTGAAGAATTTTTCGGGCCAACAAAGC  
AACAAAAATCGTGACCGCGGCTCGATCGCGATGGTCGTGTACTCCGCGTTTTCTGCCGGCATGGTGGCTGGCATTGGTCCA  
CTGTGAGCGTTCTAGAGATTATCTACCTCATTGTTTTCGCTATTCTGCTGGTGATGGCCATGCTGTGGTTACGCTGTTCATG  
GCTACACGCCTTGGATTTAACCAGGCGAGATTCCATCGCTATTAGTTCTGCGGAACCAAGAAATCCCTGGCCACAGGCTCCC  
AATGGCGGCAGTCATCTTCGGTGGCGCCAATATCGGCCTGCTCATCTTGCCGTTGATGATCTTCCACCAAGTCCAGCTGATGA  
TTTGTGCATGGCTTGAGCTCGTTATGGTTCGTGATGCGCAGGAACAGAAAGCCAACGCC

RXN00945 - 3'-Region

TAAAAGTCCTCAGTAGCTAGCCA

RXN00835 translatiert von RXN00835 ( 6529 ) von 1 bis 954

MAGGLAALLDDVAAITRAAAASLDDVTAMAGKTSVKAAGVVDDTAVTPQYVQGVKPARELPMIWRIAKGSLVNKIIIIILPIA  
LLLSAFAPWALTPILMLGGSYLCFEGAELIWHSLHRRRIKGEQHSTEPKSEQSPKSEDQLVKSAITTDLILSAEIMVISLNQIA  
DQTIWMQAAVLFFVVGIGITALVYGVVGVLVKMDDVGLTLSKRDSAGIQKFGRGLVKAMPIVLQVISVVGVFAMLVVGGHIMVV  
GTEELGWELPYHLVHGLESWANGIGGSALGWVGNTFGSLVFGLIWGAIIITVVVSVIKKFIPQRAQNSSH

RXN00835 - 5'-Region

ACTGCACCAGCGCCAACGATCGCAATTTTCATACCTGCTATCTTGCCTGAGCACAGATAAGATTTGTAAGCACTACCCCTTCT  
CTACAAAGGAGTCATCA

RXN00835 - kodierende Region

ATGGCCGGTGGATTGGCAGCACTATTAGACGATGTTCGCAGCAATTACTCGAGCGGCTGCAGCCAGCCTCGATGATGTCACGGC  
GATGGCTGGAAAAACCAGCGTTAAAGCCGCAGGCGTGGTTGTAGATGACACGGCAGTTACCCCGCAATATGTTCAAGGTGTCA  
AACCTGCACGCGAACTGCCCATGATTTGGCGGATCGCTAAGGGCTCTTTGGTAAACAAGATCATCATATTTGCCCATCGCG  
TTGCTTCTTTCCGCGTTTGCTCCGTGGGCTCTCACACCAATTTTGATGCTGGGCGGCTCCTACCTGTGCTTCGAAGGTGCAGA  
AAAGATCTGGCACTCCCTCCACAGGCGCATCAAAGGTGAACAGCACAGCACCGAACCCAAGTCGCAGGAAAGCCCAAAGTCAG  
AGGATCAGCTGGTCAAAAGTGCCATCACAACGACCTCATCCTTTCCGCAGAGATCATGGTTATTTCACTCAATCAGATTGCA  
GATCAAACTATCTGGATGCAGGCTGCGGTTCTTTTCGTCGTAGGTATTGGCATCACCGCGCTCGTGTACGGCGTAGTCGGTGT  
TCTTGTGAAAATGGATGACGTCGGACTTACACTTTCAAAGCGTGACTCCGCAGGTATCCAGAAATTTGGCCGCGGCTTGGTCA  
AAGCGATGCCCATCGTTCTTCAAGTTATTTCTGTTGTCGGCGTTTTTGGCATGCTGTGGGTTGGTGGCCACATCATGGTCGTT  
GGAAGTGAAGAGTTAGGATGGGAACCTCCCTACCACCTTGTTACGGACTAGAGTCCTGGGCTAACGGTATCGGAGGCAGTGC  
TCTGGGATGGGTTGGCAATACTTTCCGGTCACTTGTGTTCCGGCTCATTGGGGCGCGATTATCACCGTTGTGGTCAGTGTGA  
TCAAGAAGTTCATTCCACAGCGTGCGCAAAACTCGTCTCAT

RXN00835 - 3'-Region

TAGTGGAGAGTTGTTTCGCTGTAA

RXN00731 translatiert von RXN00731 ( 8578 ) von 1 bis 2496

MKDAQSYLLFGLRWLGRSLRFAPLSLLMIVVMRGLREVFGAEDPANSSSLVDNLGLTLPWLSLNDPHFLTAGFSASTTTAALMS  
TLWIIIVFAVPSEIRILGSLKFAITAALIHITSIPLGIGIAHLIEEADLNRWGNMMLADVLLTPDFWVFGVAAFASASMPPLWRR  
RTRLFLFTITLTLLLYTGTLADVTMLTATIIGTVAGELNRHRKTPGGRWLPGLSLTVREARIMTAILVTAVAAGPVLAALNPLT  
HGPFSATKLIWQPLVTEEHMHLCHTDSTSDACQGALDQLQHQHGVGPSVANLIPLILTIVVLAMGLSRGRRLLAWILAVLAQLI  
SIAVLMFQLTKLSADSTDLLWSVNAFVSVIPWLVALAVLVFSRRAFQVKIDTTRISKSLGALMVTWLATAALWILATLFLPHA  
FHPHPTLGLAFKELPFRYLPPTIETVLSHQLFPRSPAGWAVFEWGTGLFWLVVAATLYHLLMGVPSNKAHEDQENAATLLRSG  
SGDHLWSMTIWGGNTYWWAPENAGYVAYRVKRGIAITLGEPIILGPDSSVSKAELAAQFEFASNQGWIVAWYSVCEEFSKERI  
NAGHHTLRVAEEAVLSSANADFKGKHFNQVNRARNRAAKEGVSSIWTTWADLSAEMQHKIITLSEEWVSDKALPEMGFTLTGT  
NELSDPDYLLLAIDEEHLHGVTSWLPVYEKGRIVGYTLDVMRRDPQGFKSVEFLISEAVVIARDHDLWMSMSGAPLSTP  
PGVADDGTIGQILELLGRAMPEFYGFRSLAASKNKFHPEHHGWYLCYRDELSLPSIGLAVAACYLNEFPLPNWLKKTATSAPS  
HS

RXN00731 - 5'-Region

TTGATACCGTGGCCGGTGGACATTCTCTCCAGGTGTGGCGCGTGGCTTTAGCGAATACTTTTGATTGGGTTGCCAAGCGCGGC  
GGATTGCAGGTTTAAACA

RXN00731 - kodierende Region

ATGAAAGACGCTTCACAGTCCTACTTATTATTCGGTCTGAGATGGCTGGGCAGGTCCCTGCGTTTCGCACCGTTAAGCCTGCT  
CATGATCGTTGTCATGCGGGGTTTGAGGGAAGTGTTCGGCGCCGAAGATCCCGCAAATAGCTCTTTGGTAGACAACCTTGGGC  
TCACCTGCGCGTGGTCTCTTAATGATCCGCATTTCTCACCAGCGGTTTAGCGCTCCACCACCACAGCAGCGCTCATGTCC  
ACGTTGTGGATCATCGTGTTCGGGTGCCCTCTGAACGGATTCTGGGCAGCCTCAAATTCGCGATCACAGCAGCGCTTATCCA  
CATCACTTCCATTCGCGTGGGCATCGGCATCGCCACCTCATCGAAGAAGCCGATCTCAACCGCTGGGGCAACAACATGTTGG  
CCGATGTGCTGCTCACCCAGATTTCTGGGTCTTCGGCGTCGCGCTTTCCGATCCGCCTCCATGCCACTGCTCTGGCGACGG  
CGCACCCGATTGTTCTCTTTACTATCACCTGACGCTGCTGCTTTATACGGGCACGCTTGCCGACGTCACCATGCTCACCGC  
GACCATCATCGGCACCGTTGCCGGCGAGTTGAACAGGCATCGGAAAACCCAGGTGGCCGCTGGCTTCCCGGTTCCCTCACCG  
TGCGTGAAGCGCGCATATTAGACGGCCATTTTGGTCACTGCGGTAGCAGCAGGTCCAGTGCTTGCTGCGCTTAATCCACTCAC  
CACGGCCCTTTTTCCAGTGCAACGAAATTGATCTGGCAGCCCTTGTCACTGAAGAACACATGCATCACCTCTGCCACACAGA  
CAGCACCTCTGATGCATGCCAAGGTGCGCTTGATCAGCTCCAACAGCAGGTGTTGGCCCTTCCGTTGCCAACCTGATTCCAC  
TGATCCTCACCGTGGTCTTGCGATGGGGCTTAGCCGCGGACGTCGACTTGATGGATTTTGGCGGTTTGGCCAGCTCATT  
TCCATCGCAGTGTTGATGTTCCAGCTGACCAAACTATCGGCTGATTCACCGATCTTCTATGGTCACTCAATGCCTTTAGCGT  
GATCGTTCTTGGCTGGTGGCGCTCGCCGCTTGGTGTTTTCCCGCGGTGCATTCCAGGTGAAGATTGATACCACCGGATTT  
CTAAATCCTTAGGCGCTCTCATGGTTACATGGTTGGCAACGGCAGCATTGTGGATCCTTGCCACATTGTTCTGCCACACGCA  
TTCCACCCACATCCAACATTGGGGCTGGCTTTCAAAGAACTCCCTTCCGCTATCTCCCACTAATCGAAACGGTGTTAAG  
CCATCAACTCTTCCCCAGAAGCCCTGCTGGGTGGGCAGTGTTTGAATGGAAGTGAACGCTATTCTGGCTGGTCTGAGCAGCA  
CTCTTTATCATCTGCTCATGGGTGTGCCAGCAACAAAGCGCACGAGGACCAAGAAAACGACGACTCTCCTGCGCTCTGGC  
AGCGGCGATCACTTGTCTTGATGACCATTTGGGGTGGCAATACGTATTGGTGGGCACCAAGAAATGCAGGATATGTGGCCTA  
CCGCGTGAAAAGGGGCATCGCAATTACATTGGGTGAGCCTATTCTGGGTCCGATTTCATCCGCTCTAAAGCAGAGCTGGCCG  
CACAGTTTGAAGAATTTGCCAGCAACCAAGGCTGGATTGTTGCGTGGTATTCCGTTTGTGAAGAATTTCTCAAAGGAACGCATC  
AACGCTGGCCACCACACTTCGTGTGGCTGAGGAAGCAGTCTTAAGCTCAGCTAATGCGGATTTCAAAGGTAAGCACTTCCA  
AAATGTCCGCACCGCCCGAAACCGCGCGGCCAAAGAGGGCGTAAGTTCCATCTGGACAACCTGGGCTGATTTGAGTGCCGAA  
TGCAGCACAAGATCATCACGCTGTCCGAAGAATGGGTCTCTGATAAAGCTCTGCCGAGATGGGCTTCACGCTTGGCACTGTC  
AACGAGCTCTCAGATCCAGATACCTATCTTCTCTCGGATTGATGAGGAAGAGCATCTGCACCGGTGTGACCAGTTGGTTGCC  
GGTCTATGAAAAAGGACGCATCGTCGGCTACACACTTGATGTGATGCGCCGTGATCCGCAAGGCTTTAAATCTGTATCGAGT  
TTCTCATTTCCGAGGCGCTCGTTATCGCAAGGGATCACGATCTGGAATGGATGTGATGTCCGGCGCTCCTTTGAGTACGCCC  
CCAGGTGTGGCCGACGACGGCACCATCGGACAAATTTTGGAGCTTTTGGGCCGAGCAATGGAGCCGTTCTACGGTTTCCGTTT  
CCTCGCTGCGTCCAAGAACAATTCACCCAGAACCACGGTTGGTACTTGTGTTACCGCGATGAATTATCGTTACCAAGCA  
TTGGCCTTGCCGTTGCTGCCTGCTACCTCAACGAGTTTCCGCTGCCGAATTGGCTGAAAAAGACCGCCACTTCCGCCCAAGC  
CACAGC

RXN00731 - 3'-Region

TAGAAAAACGCGTAACCTTGGTG

RXN00729 translatiert von RXN00729 ( 9733 ) von 1 bis 978

MSATNPDALDVQHVPYPIKTKKTPLAVIFNIISGGLIGMAELVPGISGGTVALVLGIYERALHNGDLLIDLIKVLIKDRSKVKE  
AAAKIDWWFLGAIGVGMVVMVFSMSSILHTVVEDYPEITRGLFLGMVAVSILVPLGMMMDMRDAKKRLAIVIPLFIIICAMLGFF  
GTSFTSAPRTDPSLIFVFICAAIAVCALVLPVSGSFLLAVGMYAPIMESLSNRDLSVIGVFLLGALTGVILFVKVLSYVLE  
HHRITITLTIMAGMLGSLRALWPWQDGDANLLAPGDNAVMIFSIIILGGAIVAALMFAERVSSKNIDSETVAEEHPR

RXN00729 - 5'-Region

TTCAGCACAGATCACCCCTTTGCCAGCTACCGACTTAGTTTCGTAACACGTATAGTGGGAGGCGTTTTGCCAGACGCCAAAGAA  
AGATAATTGGATTACCT

RXN00729 - kodierende Region

ATGAGCGCCACCAACCCTGATGCCCTAGACGTGCAGCACGTCTATCCCATCAAGACGAAAAAGACTCCACTTGCGGTGATTTT  
CAACATCATTAGCGGTGGTTTTGATTGGAATGGCGGAGTTGGTGCCAGGAATTTCCGGCGGAACTGTCGCTTTGGTTCTTGAA  
TTTATGAGCGCGCACTGCACAACGGTGATCTCCTCATTGATCTGATCAAGGTGTTGATCAAGGACCGCTCGAAGGTTAAGGAA  
GCTGCGGCGAAAATCGACTGGTGGTTCTCGGCGCTATCGGCGTTGGCATGGTCGTGATGGTCTTCTCGATGTCATCGATTTT  
GCATACAGTTGTTGAGGACTACCCAGAGATCACTCGCGGTCTGTTCTTGGAAATGGTTGCCGTGTCTATCCTTGTTCCGTTGG  
GAATGATGGATATGCGGGATGCCAAGAAGCGCCTCGCAATCGTCATCCCGCTATTTATAATCTGCGCCATGCTGGGATTCTTT  
GGAACATCCTTCACTAGTGCGCCTCGCACCGATCCTTCACTGATCTTTGTCTTCATCTGTGCTGCGATCGCTGTGTGTGCTCT  
TGTTCTTCTTGGTGTTCAGGATCATTCTTCTTGCTGGCGGTGCGGTATGTACGCGCAATCATGGAATCTCTGTCCAACCGTG  
ACTTGTCGGTCATCGGCGTGTTCTTGCTTGCGCGCTCACCGGTGTGATCTTGTTGTGAAGGTTTTGTCTTATGTTCTCGAG  
CACCACCGCACCATCACGCTGACCATCATGGCTGGTCTCATGCTGGGTTCACTTCGTGCGCTGTGGCCTTGGCAGGACGGTGA  
CGCTAATCTACTTGCTCCTGGCGATAACGCCGTGATGATTTTCAGCATCATCATTCTTGGTGGCGCGATTGTCGCTGCTTTGA  
TGTTTGCTGAGCGTGTGTCTTCCAAGAACATTGATTCTGAGACCGTGGCAGAAGAGCACCCGCGC

RXN00729 - 3'-Region

TAAATAAGAACTCCACAAAGAAA

RXN00662 translatiert von RXN00662 ( 7679 ) von 1 bis 1269

VSTIPLNRLAVIAAIIIGVGTGLFVAALNWSAIGVERLVYGADHLHNYPVANVSPLRLSITVIVLSVVASWAWFFVHRTGPKE  
VSIVGAIRGEKMPILETIASAFLQVTTVAAGAPVGAENAPRIAGALVGERFSRWLQLDIDAKRILVASAAGAGLGASFHLPLA  
GVLFALEVLLVEASTRTVVIATTTAAVATTGFFVQTPDVFSTVPLTESPWMLLAAMVTGVVAGMCGHWFSAAAHKMAQASP  
KGVKILWQMPLGFVVIAAVIYFFPETLANPRWLADSMGLDGLILSTILLVLRLTAMFLLAFRVGMVGGNLIAPAFALGSMVGG  
VVGAVLEPITNVPIAAAFALLGAAAFLLSTMAAPLFGLIAAVEFTDMEAQGYLPFLAVASAVLAVRVWSVIAKHELRAIPITY  
ASWTGELK

RXN00662 - 5'-Region

CCCTCATCATAGTTTTAAATCTGGGGCAGAGGCGGGAATTTAAACACCTCTGATACAGCGTTTACTGGCTATAGTGTGCGCG  
TGCCAAATCGAGTTCCT

RXN00662 - kodierende Region

GTGTCAACCATTCGCTGAATCGTCTAGCCGTTATCGCTGCCATCATTGGTGTCCGTACCGGGCTGTTTGTGCTGCACTGAA  
CTGGTCTGCCATTGGCGTGGAGCGTTTAGTTTATGGCGCTGACCATTTCATAATTACAATCCGGTGGCCAATGTGTGCGCCAC  
TTCGCCTGTCCATCACGGTGATTGTGCTTAGCGTGGTGGCCTCCTGGGCGTGTTTGTGCACCGCACGGGGCCGAAAGAG  
GTTTCGATTGTGGGTGCGATCCGGGGCGAGAAGATGCCGATTTTGGAGACCATAGCGTCCGCATTTTGCAGGTCACCACGGT  
TGCTGCGGGTGCGCCGGTGGGTGCAGAGAACGCTCCACGTATTGCTGGAGCCTTGGTGGGAGAGCGGTTTAGTCGGTGGTTGC  
AGCTCGATATTGATGCAAAGCGCATCTGGTGGCCTCTGCCGCGGGAGCTGGTTTGGGAGCAAGCTTCCACCTTCCCCTAGCA  
GGCGTGCTGTTTGGCCTTGAGGTCTACTGGTTGAGGCCTCCACTCGGACCGTGTTATCGCAATTATCACCACGACCGCCGC  
CGTTGCCACCACCTGGATTTTTTCGTGCAAACCCAGATGTGTTTCAGCACTGTCCCGCTGACGGAAGCCCATGGATGCTGCTTG  
CCGCGATGGTCACCGGAGTAGTCGCCGGCATGTGCGGGCACTGGTTTTTCAGCGGCGGCGCACAAAATGGCGCAGGCCTCGCCC  
AAGGGTGTGAAGATTTTGTGGCAGATGCCGTTGGGTTTCGTGGTGTATCGCTGCGGTGATTTATTTCTTCCCCGAAACCCTGGC  
GAATCCCCGTTGGCTTGCCGATTCCATGCTCGGCGATGGCCTGATCCTCAGCACCATTTTATGGTACTTGTTCTGCGCACCG  
CCATGTTTTTGCTCGCCTTCCGCGTGGGCATGGTCGGCGGTAACCTGATCCCCGCATTGCACTCGGATCCATGGTCGGTGGG  
GTAGTGGGTGCTGTATTGGAACCCATCACTAACGTCCCAGTCGCCGCTTTTTCGCTGCTTGGCGCCGCGCATTTTTGTCCAC  
CACCATGGCAGCGCCACTGTTCTGGGCTCATCGCCGAGTGGAATTCACCGACATGGAAGCCCAAGGCTACCTTCCGATTTTCC  
TCGAGTAGCCTCCGCGGTCTCGCCGTGCGCGTGTGGTCTGTATCGCCAAGCACGAGCTCCGCGCCATCCCAGTACGTTAC  
GCGAGCTGGACGGGCGAGCTTAA

RXN00662 - 3'-Region

TAAGCTTGTGACGCCTCCCTCC



RXN00515 translatiert von RXN00515 ( 5675 ) von 1 bis 702

MRFSRVLPALLITTAVSIPTASAATLTADTDKELCIASNTDDSAVVTFWNSIEDSVREQRLDELDAQDPGIKAAIESYIAQDD  
NAPTAAELQVRLDAIESGEGLAMLLPDDPTLADPNAAEESFKTEYTYDEAKDIIISGFSSDPASDVLSQLQQAATTGTRTAEIRA  
EVFADRTDDYNESQTALKEDFQNCIDAIDDARPIPLQYILIGGAIALAVIVLGIRAWTNSRKQSKHSQ

RXN00515 - 5'-Region

GTTGACGCACTGAAGAAGTAAAGTCTCTTCACAAAAAGCGCTGTGCTTCCTCACATGGAAGCACAGCGCTTTTTCATATTTTT  
ATTGCCATAATGGGCAC

RXN00515 - kodierende Region

ATGCGTTTTTCTCGAGTTCTTCCCGCACTTCTTATCACCACCGCCGTGAGCATCCCAACAGCATCTGCTGCCACACTCACCGC  
CGACACCGACAAGGAATTGTGCATCGCCAGCAACACCGACGATTCCGCGGTGGTTACCTTCTGGAACTCCATTGAAGACTCCG  
TGCGCGAACAACGCCTCGACGAACTAGACGCCCAAGATCCAGGAATCAAAGCGGCGATTGAAAGCTACATCGCCCAAGATGAC  
AACGCCCCAACTGCTGCTGAACTGCAAGTACGCCTCGATGCCATCGAATCCGGCGAAGGCCTAGCCATGCTCCTCCAGACGA  
TCCCACGCTGGCAGACCCCAACGCCGAGGAAAGTTTCAAACGGAGTACACATACGACGAAGCCAAAGACATCATCAGCGGAT  
TCTCCAGCGATCCAGCCAGCGATGTACTCAGCCAACTTCAACAAGCCGCCACCACCGGCACCCGCACCGCAGAAATCCGCGCC  
GAAGTATTCGCCGACCGCACCGATGATTACAACGAATCCCAAACCGCTCTTAAAGAGGATTTCCAAAACATGCATCGATGCCAT  
CGATGACGCCCCGCCAATCCCCTGCAGTACATCCTGATTGGAGGCGCCATCGCTTTGGCGGTCATCGTCCTCGGGATCAGGG  
CGTGGACTAACTCAAGGAAGCAGTCCAAGCACAGCCAG

RXN00515 - 3'-Region

TAATACGCCAAGCAAAAAATTGC

RXN00485 translatiert von RXN00485 ( 6436 ) von 1 bis 2295

VSSVNDLFAKPYENADLVVTVSAKNEDSFAAFEQQLATTPGVEALAFDQNFASVKQSDGIYASTSVQSISEGPLQWRPILEG  
RLPQGPGEIAVTTAPGAPEVGEHVSIRLSQNTEDTEVLVVGVEPAAQETLGGAPFVVASPDALMEWNSSGVRGEFRVATSDP  
ASLEAASFSDATVVVVASAEGHVDKLADSYLGQRDRYFLLLAAFVAVAAVAFLVVFSAYSVLTGERVREFGLIRSVGASTPQI  
LGSVIFEAGILGVVAAGFGAPAGLMAARLLADNAAARFGIRVPIDVIDLPSSTMWLIAGVGVVMSVIAALPAVFSVCRKSAVES  
LSTPAISRTPSPWFGALWLLLAGIVGAGGMWAYEATSDYRGMRSVALSIAGSGALVCALLIATAVLVPWLLHVFSRIVGGTVPT  
LQLGLAFAAKQKRSAAALIAVILAGSALSSAVLHGQAHIGTHLVAVAKGMMGGTDMMVTAALDGEIPAGMLEEISSIDGVKTAIA  
PATTAVELED SGNF SVLMLAEEDGASVMRAGDTGAPAGGLVLGRNSPDQDAYPAGQAANIIVADTPTQAEIFHSDNYFSMIDP  
ALATGPSTTRNVLILLDGSNQAPDNATAQAVRKTI SLFDGRYSITEGFSARQNTFELVSRITMTSTLLAIVALAIAAVGLIN  
TVALTISERARDRYLLRTIGLTSTGQILVMAIEMIALSLPAAIVGAVSGGFLGRFVASSATNTAATAPLQVDILGGTVLAMVA  
GSVLCALIVLANKRRRVV

RXN00485 - 5'-Region

TCAACTTCGGCGACGAGGTGGGCGCTATTTTTCATTGTTTTTCGCGATTTTCGCTTCGGTTGCATTGACTGTTAGCGCCACTG  
CGTTGACAAATCTTTG

RXN00485 - kodierende Region

GTGTCCAGTGTTAATGATCTTTTTGCCAAGCCGATGAAAACGCTGATCTTGTGGTCACGGTGTCTGCGAAAAACGAAGATTC  
CTTTGCAGCTTTTGTAGCAACAATTAGCTACGACACCTGGTGTGAAGCTCTGGCTTTTGATCAAAATTTGCAGCCTCTGTAA  
AGCAATCAGACGGGATTTACGCCAGTACTTCAGTCCAGTCAATTTCCGAAGGCCACTGCAGTGGCGGCCAATCTAGAAAGGC  
CGATTGCCCAAGGACCTGGTGAGATTGCAGTAACAACGGCCCCGGGTGCGCCTGAAGTTGGTGAGCACGTATCCATTGCGCT  
GTCCCAAAACACTGAGGACACTGAGGTTCTTGTGGTTGGCGTGGTGAGCCAGCGGCGCAGGAAACTTTAGGTGGCGCACCGT  
TCGTTGTGGCGTCTCCTGATGCGCTGATGGAGTGGAATCTTCCGGTGTGCGGGGTGAATTCGAGTGGCAACTTCCGATCCT  
GCCTCGCTAGAGGCTGCAAGCTTTAGCGACGCTACGGTGGTGGTTGCTTCGGCGGAGGGGCGACGTCGATAAGCTTGCTGATTC  
TTATTTGGGCCAGCGAGATCGCTATTTCTTGCTGCTCGCAGCGTTTGTGGCAGTGGCTGCTGCCGTGGCGTTTTTGGTGGTCT  
TTTCTGCATATTCCGTGCTCACTGGTGAGCGAGTTCCGCGAGTTCCGGCTGATTCGTTTCAGTGGGCGCATCGACGCCCGCAGATT  
TTGGGGTCAGTGATTTTTGAAGCCGGCATCCTCGGTGTGGTGGCTGCTGGTTTTGGTGCGCCCGCGGATTGATGGCGGCGCG  
TTTGTGGCGGATAATGCCGCACGTTTTGGCATTCTGTGTGCCATTGATGTGATTGATCTGCCAAGTAGCACGATGTGGCTCA  
TCGCTGGCGTGGCGTGGTGATGTCCGTGATTGCGGCATTACCGGCAGTGTTCAGTGTGTGCAGAAAATCCGCAGTGGAATCA  
CTGAGTACGCCTGCTATTTTCGAGGACTTCCCCCTGGTTCGGTGCATTATGTTGCTGCTCGCGGGCATTGTGGGCGCCGGCGG  
AATGTGGGCGTATGAGGCAACCTCGGACTACCGCGGCATGCGTTTCAGTGGCTTTATCCATCGCCGGTTTCAGGCGCTTTGGTGT  
GTGCGTTGTTGATTGCCACGGCGGTGCTCGTGCCCTGGTTATTGCACGTATTCTCCAGGATTGTGGGCGGCACCGTCCCAACA  
CTTCAGTTGGGATTGGCGTTTTGCAGCAAAGCAGAAATCTCGTTCCGGCGGCGCTGATCGCTGTGATTCTTGCTGGTTCTGCATT  
AAGCTCCGCTGTTCTGCATGGCCAGGCACATATCGGCACGCATTTGGTGGCCGTGGCTAAAGGCATGGGCGGCACAGACATGA  
TGGTTACAGCGCTTGATGGGGAAATCCCCCGCGGAATGCTGGAGGAAATCTCTAGCATCGACGGCGTGAAAAC TGCCATCGCG  
CCAGCCACCACCGCTGTGGAATTGGAAGATTCCGGCAATTTCTCTGTGCTCATGCTCGCTGAAGAAGACGGAGCCTCCGTGAT  
GCGCGCAGGCGATACTGGTGCACCAGCTGGTGGCCTTGTTTTGGGCAGAACTCTCCTGACCAGGATGCTTACCGGCGCGGCC  
AGGCTGCAAACATCATTGTGCGGGATACCCCAACGCAGGCGGAAATCTTCCACAGCGACAAC TACTTCTCCATGATCGACCCA  
GCACTCGCCACCGGCCCCAGCACCAACGCAACGTACTGATCCTGCTCGACGGCGACTCCAACCAGGCCCCCGACAACGCCAC  
GGCGCAGGCGGTACGCAAGACCATTTGCTTTTTCGACGGACGATACTCCATCACCGAGGGTTTCTCCGCCCGCCAAAACACTT  
TTGAACTGGTTTTCCCGCATCACCACCATGTCCACACTGCTTGCCATCGTGGCCTTAGCGATCGCTGCGGTTGGCCTGATCAAC  
ACAGTGGCACTCACCATTTCTGAGCGTGCCCGCGATCGTTATTTGCTGCGCACCATTTGGACTGACCTCAACTGGTCAGATTCT  
GGTGATGGCTATTGAAATGATCGCGCTCTCATTGCCGGCTGCCATTGTTGGTGCAGTTTCGGGAGGATTCTTAGGCAGATTCTG  
TTGCCAGTTCTGCCACCAACACCGCTGCGACGGCACCACTTCAAGTAGACATTCTCGCGGAACGGTTCTCGCGATGGTCGCA  
GGATCTGTACTGTGCGCGCTCATCGTGCTGGCGAACAACGACGTCGGGTGGTT

RXN00485 - 3'-Region

TGATTATAAAATCCAAAATCGA

RXN00455 translatiert von RXN00455 ( 9756 ) von 1 bis 750

MVVDVQNQSHTPETQPQPGQGAAKKTPVASGNSTFIHIQPSLYPILLALFVAVFLISNITATKGVEIGPLVTDGAFFLPISY  
VLGDVLAECYGFKSTRRAILTGFGITMLAALSFYISIWLPGASFWEGQEAFEATLGLVPQIIVASLAGYIVGQLLNAKVLVAI  
KKRTGEKSLWARLIGSTVVGEFVDTLFCAIAAPVIGIATAPDFINYVVVGFWWKTLLLEVILMPITYAVIRWVKRREGYETFD  
A

RXN00455 - 5'-Region

GAAGTGTCTGGCCGATTGGCTAACAATCTCTAGTTAAATCCCGCCTCATGAAACCACGATGAAACCAACATGAGAGTTTTTTC  
ATCCACGTTTTCTGGCT

RXN00455 - kodierende Region

ATGGTTGTGGACGTGCAAAATCAATCACACACCCCAGAAACCCAGCCTCAACCTGGGCAGGGCGCAGCCAAGAAAACCCCGT  
TGCGTCCGGAAACTCCACGTTTCATTCACATTCAGCCAAGCTTGTACCCCATTTTGCTGGCGCTGTTTGTGTCAGTCTTTCTAA  
TTTCAAATATCACCGCAACCAAGGGCGTAGAAATCGGCCCGTTGGTGACAGACGGTGCGTTCTTCTCTTCCCCATCTCATAT  
GTGTTGGGCGATGTTCTAGCCGAATGTTACGGCTTCAAATCCACTCGTCGTGCCATTCTTACTGGTTTTGGCATCACGATGCT  
CGCGGCGCTGTCTTTCTACATTTCCATCTGGCTGCCTGGCGCAAGTTTCTGGGAAGGCCAAGAAGCTTTCGAAGCAACGCTCG  
GCCTTGTTCCACAGATCATCGTGGCATCACTGGCGGGCTATATTGTGGGTCAGTGCTCAACGCCAAAGTTCTGGTGGCTATC  
AAAAAGCGCACGGGTGAAAAGTCCCTGTGGGCGCGCCTGATTGGTTCCACCGTTGTGCGGAGAATTTGTCGATACCCTGCTGTT  
TTGCGCCATCGCAGCGCCAGTGATCGGTATTGCCACCGCCCCGGATTTTCATCAACTACGTTGTGGTGGGCTTCGTGTGGAAAA  
CCCTTCTAGAGGTCATCCTCATGCCCATCACCTACGCAGTCATTAGGTGGGTGAAACGCCCGCAAGGTTATGAAACCTTCGAC  
GCG

RXN00455 - 3'-Region

TAGTACCGGCCTAAGAATTCTTC

RXN00447 translatiert von RXN00447 ( 3535 ) von 1 bis 420

MLGSLWRFAVRTAAGAVLWVVIKIDGISLSFPTTPLYQDQHDNLLTFLAVAAIIVVLNATVKPVLKLLGLPLTIITLGLF  
SLVINAVIMLLAEYVSDLIGFGLRIETFGAAFWGAIVLALVNWVLGPITGLLGAKKD

RXN00447 - 5'-Region

GAGCACGGCATCGTGATTTCGCGCGTTCCCCGAGGGTGCGCGCATTTTCGGTGACCAACGCCGAGGAACTGACAAGCTGCTGCG  
CGCGTGGGAGGCCATCA

RXN00447 - kodierende Region

ATGCTGGGTAGTCTTTGGCGTTTTGCGGTGCGCACCGCAGCAGGCGCGGTGGCGTTGTGGGTGGTTATTAAGCTTATCGACGG  
CATCTCCCTGAGTTTTCCCACCACACCTCTCTATCAGGACGGTCAGCACGACAATCTGCTGACATTCCTGGCGGTGGCAGCAA  
TCATTGTCGTGTTGAATGCCACGGTGAAACCCGTCTTGAAGCTGCTTGGTTTGCCGTTGACAATCATCACCTTGGGTCTGTTC  
TCGCTGGTCATCAACGCGGTAATCATGCTGCTGGCGGAGTATGTGTCAGATTTGATCGGTTTCGGTCTACGCATTGAAACCTT  
CGGTGCGGCCTTCTGGGGTGCGATTGTGCTGGCGTTAGTGAAGTGGGTTCTTGGCCCCATTACCGGCCTCCTCGGTGCAAAAA  
AGGAC

RXN00447 - 3'-Region

TAACCATGGCGGATCTGAGCATT

RXN00416 translatiert von RXN00416 ( 8529 ) von 1 bis 1650

LASYLSPTALVVAVLAIPLSATRLYLDGISVDQGFRTQFLTRMADDIGLSDMNYIDMPTFYFAGWFWLGGRLANLLGLPG  
WEAFQPWAIIVSMAVAASVLPVWQORITGSLPVATGIALVTTCTIILAMNSEEPYAAIVAMGIPAMLVLASRIAKGDKFALA  
GGIILGVSATFYTLFTGAIALSAVAVCIIVAAIVQRSIKPLLWLAVLGGGSIVIALISWGPYLLASINGAERSGDSATH  
YLPLEGTQFPVPFLASSVVGLLCLVGLIYLVVRFHNNEVRAMWVGIAVFYAWMGMSMAITLLGNTLLGFRLDTVLVLIFA  
TAGVLGIADFRLASVYQLYPTQITERTATHLTNLI VVLVLLGGLYYAQDLPQKNARAIDLAYTDTDGYGERADLYPAGAA  
RYYKDINDHLLDQGFEPSETVVLTDELDFMSYYPYRGYQAF TSHYANPLGEFGNRNFI EDLAIRSWDELADPQQFSDAL  
NTSPWTIPEVFIFRGSIDDPDAGWKYDVAEDLYPNNPNVRFRGVYFNPESFDQMWQTKQVGPVVFVTHNE

RXN00416 - kodierende Region

CTGGCGTCTTACTTAAGCCCAACTGCGCTGGTGGTTCGCGGTGTTGGCTATTCCGCTGTCTGCGACCCGCCTGTATTTGGA  
CGGAATCAGCGTTGACCAGGGCTTTAGAACTCAGTTTTTTAACCCGCATGGCTGACGATATCGGCTTGTCGGACATGAACT  
ACATCGATATGCCTACCTTCTACCCCTGCTGGATGGTTCCTGGCTCGGTGGTTCGCTTGGCCAATCTTTTGGGGCTGCCCCGGT  
TGGGAAGCTTTCCAGCCATGGGCAATTGTGTCCATGGCAGTTGCTGCTTCTGTGTTAGTTCCAGTGTGGCAGCGCATCAC  
CGGTTCCCTGCCGGTGGCAACAGGCATTGCGTTGGTGACAACCTGCATTATCTTGGCGATGAATTCCGAAGAGCCCTACG  
CTGCAATCGTTGCGATGGGTATTCCAGCGATGCTCGTGCTGGCTTCCCGCATTTGCCAAGGGCGATAAGTTTGCGCTTGCC  
GGCGGCATTATTTACTTGGGTGTTTCGGCTACTTCTATACCTTTGTTTACCGGTGCTATCGCGCTTCTGCGGTGCGGGT  
GTGCATCGTGGTGGCGGCTATTGTGCAGCGCTCCATCAAACCACTGCTGTGGCTTGCAAGTGCTGGGTGGTGGATCCATTG  
TCATTGCGTTGATTTCTTGGGGTCCTTACCTTCTGGCCTCCATCAACGGAGCGGAGCGCTCTGGCGATTCCGCAACACAC  
TACCTGCCTCTTGAAGGCACCCAATTCCCGGTTCCTTTCTTGGCATCAAGCGTTGTGGGACTGTTGTGTCTTGTGGCCT  
GATCTATTTGGTGGTGCCTTTCCACAACAATGAGGTGCGCGCGATGTGGGTGCGCATCGCAGTGTATTTATGCCTGGATGG  
GCATGTCCATGGCGATCACGCTTTTGGGCAACACGTTGCTTGGAATCCGTCCTTGATACGGTGCTGGTGCTTATTTTGGC  
ACGGCTGGAGTGTTGGGCATTGCAGATTTCCGCCCTTGCCAGTGTGTATCAGCTCTACCCACCCAAATCACAGAGCGCAC  
GGCCACCCATCTGACCAATCTAATTGTGGTCCCTCGTGCTGCTTGGCGGCCTCTACTACGCGCAAGATCTGCCGCAGAAGA  
ACGCACGAGCTATCGATCTGGCCTATACCGATACTGATGGCTACGGCGAGCGCGCGGATCTGTATCCGGCCGGAGCTGCA  
CGTTATTACAAGGACATCAACGATCATCTGCTTGATCAAGGATTGAGCCTTCCGAAACTGTGCTGCTGACAGACGAACT  
CGATTTTCATGTCCTACTACCCTTATCGCGGATACCAAGCTTTTACTTCCCACTACGCCAACCCGCTTGGTGAGTTCGGAA  
ACAGGAACGCATTTCATCGAAGATCTCGCGATCCGAAGCTGGGATGAGTTGGCTGATCCTCAACAATTCAGCGACGCCTTG  
AACACCTCTCCATGGACGATCCCTGAGGTGTTTCATCTTCCGTGGCTCCATCGATGATCCTGACGCCGGTTGGAAATACGA  
CGTGGCTGAAGATCTGTACCCGAACAATCCAAACGTGCGCTTCCGCGGCGTGTACTTTAACCCGGAGTCATTTGATCAGA  
TGTGGCAGACCAAGCAAGTGGGACCTTTCGTGGTGGTAACGCACAATGAG

RXN00416 - 3'-Region

TAATTCCTCACCAAACGACCCAA

RXN00390 translatiert von RXN00390 ( 7582 ) von 1 bis 405

MSTTREIAFLIARILLGVILIAHGWDKFAITGLEGVGTGFFDSLGI PAAGIAAIAAAVVELLGGILIILGVFTRIVAAFVAIDM  
LFAALFAHVSSGIFVTNNGWELTGAIGAGALLLI AVGASAWSIDGVLAKRKA

RXN00390 - 5'-Region

GGAAATAGACCGTTAATAGCTGGTCTTTACATTTGCCAGAAAGCTCCGACGAAACCCCAATAGTTGACACGGAAACTAATTCA  
TTCTAGCTTTAGTGACC

RXN00390 - kodierende Region

ATGTCAACTACCAGGGAAATTGCATTCCTCATCGCACGTATCCTCTTGGGCGTCATCCTCATCGCCACGGCTGGGACAAGTT  
CGCCATCACAGGACTTGAAGGCGTCACCGGCTTCTTCGATTCACTCGGCATCCCAGCAGCCGGCATCGCCGCAATAGCTGCTG  
CAGTCGTGAGCTCCTAGGAGGAATCCTTATCATCCTAGGAGTATTTACCCGCATCGTTGCCGCCTTCGTTGCCATAGACATG  
CTCTTCGCAGCACTGTTTGCGCACGTCTCCTCCGGCATCTTTGTACCAACAATGGTTGGGAACTACCCGGCGCAATCGGCGC  
TGGCGCGCTGCTTCTCATCGCAGTTGGCGCAAGTGCATGGAGCATCGACGGGGTTCTGGCAAAACGCAAGGCC

RXN00390 - 3'-Region

TAAATCTAGCGCCACAACCTCCGA

RXN00362 translatiert von RXN00362 ( 1707 ) von 1 bis 1347

MGIIALLVFIAIAVILNVFLKRDISEALLVGLVGTALVGGVNAPTLLIDAVVDAAQSEVTFAGMAFVFMGIVVQSTGLIDRLI  
AILNSIFGRLRGGAGYVSTLGSALIGLIAGSTAGNSATVGSVTIPWMKKTGWTAERSATLVAGNSGLGVALPPNSTMFIIILAL  
PAAAASSASQVYIALACGGAYAVLYRLAVVFWTRKDKIPATPDDQRVSFGEAMKTGWRSPLIFLGILIPVILTIGPLSEWLK  
THGVGESGVKSMIIIVWPILITAIALIEGRKRIANNMAHFRVQISKDLPQFATVGISLFSALAAANIMEELGVGPQLSNWLD  
SMDLPKSVMVIIIVCIMCIVVATPLSSTATAAAIGAPAVAALAAVGIDPTVAIVVILLCTSTEGASPPVGAPIYLSAAIADANP  
TKMFVPLITYFVVPIMILLAWLVGMGFLPVIVPTG

RXN00362 - 5'-Region

CACTTTTTGGGTGAAAATTCCACGAAGTTAATGCCGCTTTAAGTCAATTCAATCACATGTAACATGCTACGGTTTTTTTCGGTC  
ACTTAAAGGAGGCGCTT

RXN00362 - kodierende Region

ATGGGAATCATTGCTCTGCTCGTTTTTATCGCAATTGCCGTGATATTGAATGTGTTTTTGAAACGAGATATTCAGAAGCATT  
GCTAGTTGGATTAGTAGGAAGTGCCTTGTTCGGCGGTGTAAATGCACCGACATTACTGATTGATGCTGTAGTGGATGCTGCTC  
AGTCGGAAGTTACTTTTCGCAGGTATGGCCTTTGTTTTTCATGGGCATCGTTGTGCAATCAACTGGATTGATTGATCGATTAAATC  
GCAATCCTTAACTCGATTTTTGGTCGGCTTCGAGGTGGCGCAGGTTATGTTTCCACTCTTGGATCTGCGCTCATTGGACTCAT  
CGCTGGATCAACGGCTGGAAACTCCGCGACGGTTGGCTCAGTGACGATCCCTTGGATGAAAAAGACGGGATGGACTGCTGAAA  
GGTCCGCAACGTTAGTCGCGGGCAACTCTGGCCTTGGTGTGCGTTGCCTCCCAATTCAACAATGTTTCATCATTTTTGGCATTG  
CCAGCTGCAGCAGCTTCTTCGGCCTCTCAGGTGTACATTGCTTTGGCTTGTGGTGGTGCCTATGCAGTGCTCTACCGCTTAGC  
GGTCGTCTTTTACTGGACACGTAAAGATAAAATTCCTGCCACCCCTGATGATCAACGGGTGTCATTCCGTGAGGCAATGAAGA  
CTGGATGGCGTTACCGTTGATCTTCCTTGGAAATTTTATGATCCCCGTAATCCTCACAATCGGCCCATTTGTCTGAATGGTTAAAG  
ACACATGGAGTTGGGGAGTCTGGTGTAAATCGATGTGCGATCATCGTGTGGGTGCCAATTCTGATTACGGCAATTGCTCTGAT  
TGAAGGGCGTAAACGAATTGCTAACAACATGGCACACTTTAGGGTTCAGATCTCCAAGGACTTGCCACAATTTGCCACCGTAG  
GAATTTCTGTTGTTTTCTGCGCTTGCAGCAGCGAACATCATGGAAGAACTGGGTGTTGGCCCGCAGTTGTCTAACTGGCTTGAT  
TCCATGGACCTACCTAAGTCTGTTCATGGTGATCATTGTCTGCATCATGTGCATTGTGGTGGCAACGCCACTGTCTGTCACACAGC  
AACC CGCGCTGCGATTGGTGTCTCCCGCTGTCGCTGCGTTGGCTGCGGTAGGTATTGATCCAACTGTGGCGATCGTAGTGATCT  
TGCTGTGCACTTCCACTGAAGGTGCATCCCCGCCGGTGGGCGCGCCGATTTACCTTTCTGCTGCGATCGCCGATGCAAACCCA  
ACGAAAATGTTCTGTAACCTGATTACGTACTTTGTTGTCCCATGATTCTGCTTGCTTGCTTAGTTGGAATGGGATTCTTACC  
AGTGATTGTTCTACGGGT

RXN00362 - 3'-Region

TAAAGGGGTAAAAATGAACTCAA

RXN00344 translatiert von RXN00344 ( 1354 ) von 1 bis 879

VDLSTWLSDTQYLISVDFVQHALLIASALLGLLSGVIAPLIVVRQQSFVHGTAEALALMGAAAALLFGLNVGGGAVIGSVVAAI  
LLALLGMKQQDSAVGAVMSFGLGLSVLFHLYPGRSSTAFSLLTGQIVGVSSSSLWILVAVTVIVVSAVVIFWRPLLAFASADP  
IMAQASGVNVRFIAVAFVLVGLTTSQSVQIVGALLVMALLITPGAAAVAVTANPVKAVVLAVIFAEVSAVGGLLLSLAPGLP  
VSVFVTTISFVIYLVLCRLIGWLRGRGAQRDEDAYRRRQHDHHPH

RXN00344 - 5'-Region

CGGCACGGTTGGCGATGTCATGCAGTCCGAAAACTCAGCGAACTCTACAACGCACCCGTCACGGTGGCTCGCATCAACGACA  
GAATCGTGGTGGTTTAA

RXN00344 - kodierende Region

GTGGATCTATCCACCTGGCTTTCCGACACCCAATATCTCATCAGCGTCGATTTTCGTCCAGCACGCACTCATCGCCTCCGCGCT  
GTTGGGCCTGCTCTCCGGTGTGATCGCGCCGCTCATCGTGGTGCGCCAACAGTCCTTCGCAGTCCACGGCACCGCCGAACCTCG  
CCCTCATGGGAGCCGCCGCCGCGCTGCTCTTCGGATTGAATGTAGGCGGCGGTGCAGTGATCGGTTCCGTGGTCGCCGCGATC  
CTACTGGCATTACTCGGCATGAAACAACAAGATTCCGCCGTCGGTGCCGTGATGAGTTTCGGACTCGGTCTGTCCGTGCTGTT  
CATTACCTCTACCCCGCCGAAGCTCCACCGGTTCTCCCTGCTCACAGGGCAAATCGTTGGTGTTTCCTCATCATCGCTGT  
GGATCCTTGTGGCAGTCACCGTGATCGTGGTTAGCGCCGTGGTGATTTTCTGGCGCCCGCTGCTTTTCGCCAGCGCCGATCCG  
ATCATGGCGCAGGCCCTCCGGAGTAAACGTCCGATTTCATCGCCGTTGCCTTCGCAGTTCTGGTTGGCCTCACCACGTCCCAGTC  
CGTGCAGATTGTCCGTGCGCTGCTGGTCATGGCATTGCTGATCACTCCCGGCGCGGCCGCTGTGGCGGTGACCGCCAATCCAG  
TGAAAGCCGTGGTGTGTCAGTCATCTTCGCGGAAGTATCGGCTGTCCGTGGCCTGCTATTGTGCTAGCGCCTGGTTTGCCG  
GTGAGTGTTTTTGTACCAACCATCTCTTTTGTGATTTACCTGGTCTGCCGCCTGATCGGTTGGCTCCGCGGCCGTGGAGCTCA  
GCGTGACGAAGATGCTTATCGACGCCGCCAGCACGATCACCACCCTCAC

RXN00344 - 3'-Region

TAGGCGTTTCGAAGTCCTATTTTC



RXN00247 translatiert von RXN00247 ( 2491 ) von 1 bis 927

MQTLIFIAIAGVAAQLVDGGLGMFGVTSTTILIMLAGLGAQASAVVHTAEVGTTLVSGLSHWKFGNVDWKVVVRLGIPGAI  
GAFAGATFLSNISTEAAAPITSLILALIGMNLVWRFSKGRIRRDYSDRPHSRGFLGGLGIVGGFVDASGGGGWGPVTTSTLLS  
LGRTEPRKVVGTVNTAEFLVSLAATLGFVVGLWDDLVANLSAVLALLIGGAIAAPIGAWMISRVNATVLGGFVGTLIVTLNLP  
KVLNVVGLDFIPTGLIQVTVLLIGLPLTYLGFRYRKNLLNETISSEVVSEPKGQKIKST

RXN00247 - 5'-Region

AACCCCTAACTACTGACCTCGCACCACTTGTTGCAGCCCGTTACCACGCTGCATTGAGCGCACTGCTGGCACATATCTAAGAC  
CGCTAAGGAAATCAGCT

RXN00247 - kodierende Region

ATGCAGACATTAATCTTTATCGCCATTGCAGGCGTCGCAGCACAGCTTGTTGATGGCGGCCTCGGCATGGGGTTCGGCGTCAC  
CTCAACCACCATCCTCATCATGCTCGCAGGTTTAGGCCCTGCGCAGGCATCCGCCGTCGTGCACACCGCAGAGGTTGGAACCA  
CCTTAGTTTCTGGTTTAAGCCACTGGAAATTTGGCAACGTGGATTGGAAAGTAGTTGTCCGGCTCGGTATCCCCGGCGCTATC  
GGCGCATTTGCTGGCGCTACCTTCTTGTCGAATATTTCCACCGAAGCAGCAGCACCGATCACCTCCCTGATTCTTGCCCTGAT  
CGGCATGAACCTAGTCTGGCGATTTCAGCAAGGGACGCATCCGCCGCGACTATTCCGATCGCCCGCACAGCAGGGGATTCCCTCG  
GCGGACTCGGTATTGTTCGGTGGTTTCGTTGACGCATCCGGTGGCGGCGGATGGGGTCCAGTGACCACCTCTACGCTGCTGTCT  
TTGGGACGCACCGAACCCCGCAAAGTAGTCGGCACCGTCAACACCGCAGAATTCTTAGTCTCCCTAGCCGCAACATTGGGCTT  
CGTCGTGGGACTGTGGGATGACCTAGTAGCTAACCTCTCTGCAGTTCTCGCGTTGCTCATCGGCGGCGCAATCGCAGACCAA  
TCGGCGCCTGGATGATCTCTCGCGTTAATGCAACCGTCCTCGGTGGCTTCGTGGGCACCCTGATTGTCACACTGAACCTGCCA  
AAGGTGCTCAACGTGGTTGGCCTTGATTTTCATCCCCACCGGCCTCATCCAGGTCACCGTCCTCCTCATCGGCCTGCCGCTGAC  
GTACCTCGGCTTCCGCCGCTACCGCAAAAATCTCCTCAACGAGACCATCTCCAGCGAAGTTGTCTCCGAACCAAAGGGCCAAA  
AGATTAAAAGCACT

RXN00247 - 3'-Region

TAAAACACGCTTTTCGACGCCCA

RXN00242 translatiert von RXN00242 ( 7148 ) von 1 bis 1278

VNEWRTVSLVDSTALTVIISVAVFTSAVALLGVVKKRSRWRVLGALISSAVLTSGAWVVIEKLWKPFDPNPWTIYLSAGLAV  
FPLLSILFRTGRTRILMATLTVIALVNTAAVINVIYQPYPTLGSFNPVPTAVSMSYADFESQTTAPTMDREV GALVQVPLAG  
TTDDSTSGFDARDAYAYIPPAYWDNPSLQLPVLVLMPGNPGQPDQWFSSGNADQTADNFQATHDGISPIVISVDGTGSFSGNP  
ACVDSDAQSVMTYLSHDVPMLIKQKFRVNQDQRTWTIGGLSYGGTCALQIMTNHPEAYGSFLDFSGQEEPTLGTRQQTVDQLF  
GGDEDAFKAVNPEDLLNQAISGAHTYSGISGRFIAGSNDKSAVSALSHLDNLSNQAGMSTTFDTVAGGHSFQVWRVALANTF  
DWVAKRGGGLQV

RXN00242 - 5'-Region

GGATCACTATCGCTTTAAACACCGAAACCTTCCTGCTAGTTCACCAAGATTTTAAAGTTTACCGCAATTTCTTGAGAGCTTT  
GGGAGGATAATGGCGGT

RXN00242 - kodierende Region

GTGAATGAATGGCGAACAGTCTCGCTTG TAGATTCCACGGCGCTGACCGTGATCATCAGTGTGGCCGTGTTTACTTCTGCTGT  
GGCTCTGCTCGGAGTTGTGAAAAAGCGCTCTCGGTGGCGGGTTCTCGGAGCTCTCATCTCCTCAGCAGTTCTCACCAGTGGCG  
CATGGGTGGTTATTGAAAAGCTGTGGAAGCCTTTCCCGGACCCCAATCCGTGGACCATCTATCTTTCCGCTGGTTTGGCGGTT  
TTTCTCTGTTGAGCATCTTGTTCGCACTGGTCGTACAAGAATACTGATGGCTACACTCACCGTGATTGCACTGGTTAATAC  
GGCCGCAGTCATCAATGTCATCTACCAGCCATACCCGACGTTGGGTTCTTTCAATCCCGTGCCAACGGCTGTGTCCATGTCGT  
ATGCAGATTTTGAATCTCAGACCACTGCCCCGACGATGGATGACCGTGAAGTCGGTGCCCTTGTGCAGGTGCCGCTAGCTGGA  
ACAACAGATGATTCCACCTCCGGCTTTGATGCGCGCGATGCCTACGCCTATATTCCGCCTGCGTATTGGGATAATCCTTCCCT  
ACAACAGTCCAGTTTTTGGTTCTCATGCCCCGAAACCCCGGCCAGCCAGATCAGTGGTTTAGCAGTGGAATGCCGATCAAACAG  
CAGATAATTTCCAAGCAACCCACGATGGCATCAGCCCCATTGTCATCAGCGTGGATGGCACAGGATCATTACGCGGAAACCTT  
GCTTGCGTGGATTCTGATGCCCCAAAGCGTGATGACATATCTATCCCACGATGTCCCCATGTTGATCAAACAGAAATTCCGAGT  
CAATCAGGATCAGCGCACCTGGACAATTGGTGGTTTAAAGTTACGGCGGCACCTGTGCTTTGCAGATCATGACCAATCACCCCG  
AAGCGTATGGTTCTTTTCTTGACTTCTCGGGCCAGGAAGAACAACACTTGCCACACGCCAGCAAACCTGTTGATCAGCTTTTC  
GGCGGCGATGAAGACGCATTCAAAGCCGTTAATCCGGAAGATCTGCTCAATCAAGCAATCAGCTCAGGAGCGCATACCTACAG  
CGGGATTTCCGGCAGGTTTATTGCTGGTAGCAACGATAAAAGTGCAGTGAGCGCGCTGTCTCATCTTGATAATTTGAGCAATC  
AGGCGGGCATGTCCACCACCTTTGATACCGTGGCCGGTGGACATTCCTTCCAGGTGTGGCGCGTGGCTTTAGCGAATACTTTT  
GATTGGGTTGCCAAGCGCGCGGATTGCAGGTT

RXN00242 - 3'-Region

TAACAATGAAAGACGCTTCACAG

RXN00194 translatiert von RXN00194 ( 2468 ) von 1 bis 441

VAGSSHTIEPEIYRGVSTLDEPSAAWGWHLKRNTIQLAGWISVLFMLGYNFGNHKGHVETIWLLVITALLVIGLLIHLFEPK  
LFQVRTITSRNKPVGHVEPDWTDQATLTGTWGNLTDSQLRSVNIEPSRVAHLRAADSAKELDN

RXN00194 - 5'-Region

AAATATGAGAACATAGTGAGAGTTAAACCAAGTTCTGTAGGTGCTTGTTGCAGCGGGCGCGAAGGCGTACCACTGCAACTTGC  
GAATAAAGGAGTAAAC

RXN00194 - kodierende Region

GTGGCTGGTTCCTCCACACGATTGAGCCTGAGATCTACCGCGGTGTATCCACCCTTGATGAGCCTTCGGCTGCATGGGGATG  
GCACGGTCTCAAGCGCAACACCATCCAACCTCGCTGGCTGGATTTCGGTTCATGCTTGGATACAACCTCGGTAACCACA  
AGGGCCACGTTGAAACCATCTGGCTTCTCGTCATCACCGCCCTTCTGGTCATCGGCCTGCTGATCCACCTGTTGAGCCAAAG  
CTCTTCCAGGTTTCGCACCATCACTTCCCGCAACAAGCCTGTCGGCCACGTCGAGCCAGACTGGACCTACGACCAGGCAACCCT  
CACCGGCACCTGGGGTAACCTCACTGACTCCAGCTTCGCTCCGTCAACATCGAGCCAAGCCGTGTCGCTCACCTGCGTGCTG  
CAGATTCTGCGAAAGAACTAGACAAC

RXN00194 - 3'-Region

TAGTTTTTTAAAAAGAAAATGCG

RXN00162 translatiert von RXN00162 ( 4822 ) von 1 bis 354

VSTTTPIHPERKKRVRQALTMFSIAAWVTGVFLLALVAEMIMKYIIGMDLPEWARFVPIAHGWVYIVFLMTTLNLGLKARWNP  
TRWVTTAIAGVVPLLSFFVEHNRRKEVTQTFQLNS

RXN00162 - 5'-Region

GGAGACGTCGAAAAGCATAAACCTGGAACCTTTCCGGGCGCGCCCGACTGCTTTGCTGAAGCCCTATCCCGCTATTTTATT  
TTTGAAGGAAGAGTTGC

RXN00162 - kodierende Region

GTGTCTACCACCACCCCAATCCACCCTGAGCGCAAGAAACGCGTTCGTCAGGCCCTCACCATGTTCTCCATCGCTGCGTGGGT  
GACTGGTGTGTTTTTGCTGGCGCTGGTGGCGGAGATGATCATGAAGTACATAATTGGCATGGATCTTCCTGAGTGGGCACGAT  
TCGTTCCGATTGCACATGGATGGGTTTACATTGTTTTCTTGATGACCACCCTGAACCTGGGTCTGAAGGCGCGTTGGAATCCG  
ACTCGTTGGGTGACCACCGCTATCGCAGGTGTGGTTCGCTGCTGTCGTTTTTTGTTGAGCACAACCGCCGCAAGGAAGTTAC  
TCAGACATTCCAGCTGAACTCA

RXN00162 - 3'-Region

TAGTTAAATACACAAAACCTCC

RXN00087 translatiert von RXN00087 ( 6949 ) von 1 bis 528

MIGGIIGLILSVIIMAEKLAILEDPGHITSCDFNAVLACGDVMRSGQANAFGIPNPLIGIAGFAAVAIIGAGILAGGGFRGWF  
WFGAQAGLTFAMMFCHWLAYQSM SVIRALCPYCMGVWTVSIIIMFVLVTAWN VKTFSGSDSTFVNALYKYKWVIAIVWLLLLIAA  
AAVWSFRYMF

RXN00087 - 5'-Region

TCGTCAGTCAACAAACGTTTTCCACCCGGAGGTCTCCCGTGTCTACCGAAATCCACAACGCCCCACCCAAGGCCCCAACTT  
GGCTTGGCTGGGTGCTC

RXN00087 - kodierende Region

ATGATCGGCGGAATAATCGGCCTCATTTTGTGGTGATCATCATGGCCGAAAACTTGCCATCCTCGAGGATCCCGGTCACAT  
CACCAGCTGCGATTTCAATGCAGTCCTAGCTTGTGGCGATGTCATGCGTTCCGGCCAAGCTAACGCGTTCGGCATCCCGAATC  
CGCTCATCGGCATCGCCGGTTTCGCCGCTGTGCGCCATCATCGGCGCCGGCATCCTCGCGGGCGGCGGGTTCCGCGGTTGGTTC  
TGGTTCGGCGCCCAGGCCGGACTCACTTTTGCCATGATGTTCTGCCACTGGCTCGCCTACCAATCCATGTCCGTCATCCGCGC  
GCTCTGCCCTTACTGCATGGGCGTGTGGACCGTATCGATCATCATGTTTCGTGCTGGTCACTGCATGGAATGTGAAAACTTTCA  
GCGGCTCCGACAGCACGTTTCGTCAACGCACGTGTACAAATACAAGTGGGTCATCGCGATCGTCTGGCTGCTGCTCATCGCAGCC  
GCAGCTGTGTGGTCATTCCGCTACATGTTC

RXN00087 - 3'-Region

TAGGCATTTAAGGCTTTCAGGCC

RXN00080 translatiert von RXN00080 ( 4040 ) von 1 bis 1530

MDILSLLMEGFAGALTTPMNLWVIVGCLLGTAVGVMPLGSSMAVALLLPMTFALDPTAAFIMFSGVYFGGLFGDSTMAILMN  
TPGQASAIASTFEGHRMALNDRAPQALATAAIGAFIGGIVSSFIVVFLAPTLAELSTAFGPAEYFALALFAFVATSSVSDSV  
FKGLASLIFGLGIATIGIDSVTGIERFTLGAPQLFDGISLVTVTVAILALGEVFYIAARARRDKANLETRSAGRPLWTGTEFK  
EAAPAWARGTIIGLPFGVIPVGGSEVPTFLAYSTERALDKRRKDPQFGDKGAIRGLAAPEAAGNATTMAMGALLALGLPVSA  
TAAIMLAAFRQYGIQPGPLLFDRNPPELVWALLASFFIAMIVLLFINLPFAQLWAKLLIPNHYLYSGIALFCGLGIYATSGAV  
FDLLMLLGIGVVALIMRRYGYPLAPLMIGMVLGPLAETSLRDALLSSVGDFSILVSSPITWSLYAVLAIFIAVSVITAIRGR  
KHLTSQLETTIDA

RXN00080 - 5'-Region

ATGTTCTTGTTTCCCTCATGATGAGCTCCGTGGTCTACCTCGCATTCGATGTGGGCTTGGGACTTAATCTTCCTTCCGGACTT  
TTGGGTGGTGGCTTTTA

RXN00080 - kodierende Region

ATGGATATTTTGTCCTCTTGATGGAAGGTTTCGCCGGCGCGCTAACGCCGATGAACCTCCTCTGGGTGATTGTGGCTGTTT  
GCTCGGCACCGCGGTGGCGTCATGCCTGGTCTTGATCCTCCATGGCTGTGGCGCTGCTGCTGCCAATGACCTTCGCGCTTG  
ATCCAATGCCGCGTTCATTATGTTCTCTGGCGTATATTTCCGGTGGTCTCTTCGGTGACTCCACGATGGCAATTTTGATGAAC  
ACCCAGGTCAGGCATCGGCAATCGCCTCAACATTCGAGGGCCACCGCATGGCTCTTAACGGCCGTGCGCCACAGGCTCTGGC  
TACCGCAGCGATCGGTGCCTTCATCGGCGGTATCGTCTCCTCCTTCATCGTGGTCTTCCTCGCACCAACCTGGCGGAAGTGT  
CCACCGCATTCGGCCCCGCCGAGTACTTCGCACTGGCACTCTTCGCGTTTCGTGCGCACCTCCTCCGTGGTGTCCGACTCCGTG  
TTTAAGGGACTTGCGTCCCTCATTTTCGGCCTCGGCATTGCGACCATCGGCATCGATTCCGGTCACCGGCATCGAGCGCTTCAC  
GCTCGGGGACCGCAGCTTTTCGACGGAATTTCCCTCGTTACTGTTACCGTCGCGATTTTGGCACTGGGAGAAGTGTTTTACA  
TTGCAGCCCGCGCACGCCGTGACAAAGCAAATCTGGAGACGCGCTCTGCAGGCCGTCCGTGGCTTACCGGAACGGAATTTAAA  
GAAGCCGCTCCAGCCTGGGCACGCGGAACCATCATTTGGTCTGCCCTTCGGTGTGATCCCTGTTGGTGGATCTGAAGTTCAAAC  
CTTCTTGGCTTACTCCACCGAGCGCGCATTTGGATAAACGACGCAAAGATCCGCAGTTCGGCGATAAAGGTGCAATCCGAGGAC  
TCGCTGCTCCTGAAGCTGCAGGTAACGCCACCAACAGGCATGGCGATGGGCGCTCTTCTTGCCCTGGGTCTCCCAGTCTCTGCA  
ACTGCGGCCATCATGTTGGCAGCGTTCCGCCAGTACGGAATCCAGCCCGGACCACTACTCTTCGATCGCAACCTGAACTTGT  
CTGGGCACTTCTTGCCAGCTTCTTCATCGCGATGATCGTCCGTGTTTCATCAACCTGCCGTTCGCACAGCTGTGGGCAAAGC  
TCCTGCTCATTTCAAACCACTACCTCTACTCCGGCATCGCATTTGTTCTGTGGCCTGGGCATTTACGCCACCTCCGGCGCAGTG  
TTCGACCTGCTCATGCTGCTCGGCATCGGTGTCGTGGCTTTGATCATGCGTCGCTACGGTTACCCGCTGGCACCGCTGATGAT  
CGGTATGGTTCTTGGACCTTTGGCTGAAACCTCCCTCCGCGACGCACTACTGTCCTCGGTTGGCGATTTCTCCATCCTCGTCT  
CCAGCCCCATCACCTGGTCTCTCTACGCAGTGCTCGCCATCTTCATCGCGGTCAAGTGTCACTGCAATCCGCGGTGTCGCG  
AAGCACCTGACTTCTCAGCTCGAAACCATCGACGCT

RXN00080 - 3'-Region

TAAAGTCCCCGTATAGAAACAGG

CODIERENDE GENE NEUER PROTEINE VON *CORYNEBACTERIUM GLUTAMICUM*

## Zusammenfassung der Offenbarung

5

Isolierte Nukleinsäuremoleküle, die als MCP-Nukleinsäuremoleküle bezeichnet werden und neue MCP-Proteine aus *Corynebacterium glutamicum* codieren, werden beschrieben. Die Erfindung stellt zudem Antisense-Nukleinsäuremoleküle, rekombinante Expressionsvektoren,

- 10 die MCP-Nukleinsäuremoleküle enthalten, und Wirtszellen, in die die Expressionsvektoren eingebracht worden sind, bereit. Sie stellt weiterhin isolierte MCP-Proteine, mutierte MCP-Proteine, Fusionsproteine, antigene Peptide und Verfahren zur Verbesserung der Produktion einer gewünschten Verbindung aus *C. glutamicum* be-
- 15 reit, die auf der genetischen Manipulation von MCP-Genen in diesem Organismus beruhen.

20

25

30

35

40

45